

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

İmida Damlatma Çözeltisi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 ml'deki içeriği:

Aktif madde:

İmidacloprid 100 mg

Yardımcı Maddeler:

Koruyucu olarak BHT 10 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Damlatma Çözeltisi

Çok açık sarı, yağlı görünümlü homojen çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Kedi, köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

İMİDA Damlatma Çözeltisi köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Hayvanın üzerinde barınan pireler ilaç uygulamasından bir gün sonra tamamen ölür ve dört haftalık bir koruma süresi sağlanır.

4.3 Kontrendikasyonlar

İmida Damlatma Çözeltisi 0,4 ml: 8 haftadan küçük köpek yavrularında ve 10 haftadan küçük kedi yavrularında,

İmida Damlatma Çözeltisi 1,0 ml: 4 kg'dan hafif köpeklerde,

Ayrıca zayıf ve güçsüz, yaşlı, hamile ve emziren hayvanlarda kullanmadan önce veteriner hekime danışılmalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Bakınız "Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar".

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

İmida Damlatma Çözeltisi köpek ve kedilerdeki güvenlik endeksi 2-10'dur. Önerilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir yan etki riski oluşturmaz. **Gebelikte kullanım:** Gebe köpek ve kedilerde kullanılmasında sakınca yoktur.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Cilt ile temas halinde hassasiyet oluşturabilir, cilt ve göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız. Cilt ve gözde tahriş hali devam ederse prospektüsle birlikte doktora başvurunuz.

Uygulama sırasında koruyucu eldiven kullanınız.

Yutulduğunda zararlıdır, kaza ile yutulduğunda prospektüsle birlikte hemen doktora başvurunuz.

Uygulamadan sonra 30 dakika süre veya uygulama bölgesi kuruyuncaya kadar, hayvan ile doğrudan temas etmeyiniz ve çocuklardan uzak tutunuz.
Uygulama sırasında yemekten, içmekten ve sigara kullanmaktan sakınınız.

(iii) Diğer uyarılar

-

4.6 İstenmeyen etkiler

Kediler uygulamanın ardından uygulama noktasını yalarsa ilacın acılığından dolayı salya salgısı artabilir. Bu durumun zehirlenme ile ilgisi olmayıp birkaç dakika sonra kendiliğinden geçtiği görülür.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebe köpek ve kedilerde kullanılmasında sakınca yoktur.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Önerilen dozun iki katının kullanıldığı durumlarda bile fentiyon, luferunon, milbemis, febantel, pirantel pamoat ve prazikuantel gibi ilaçlarla birlikte kullanılmasında herhangi bir geçimsizlik gözlenmemiştir. Aşılama gibi rutin tedavi durumlarında **İmida Damlatma Çözeltisi** kullanılmasında hiçbir zararlı etki görülmemiştir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

İmida Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

Canlı Ağırlık/Hayvan	Mikro tüp	mg/kg Canlı Ağırlık
0-4 kg/kedi-köpek	1 adet 0,4 ml mikro tüp	> 10 mg
4 kg'dan fazla/kedi	2 adet 0,4 ml mikro tüp	< 20 mg
4-10 kg/köpek	1 adet 1,0 ml mikro tüp	10-25 mg



İmida Damlatma Çözeltisi uygulandıktan sonra 24 saat içinde köpek ve kedilerdeki pireleri yok eder. Tek bir uygulama ile yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Pirelere karşı en ideal korunma ve mücadele için **İmida Damlatma Çözeltisi** ayda bir kez uygulanmalıdır.

İmida Damlatma Çözeltisi hayvanın yıkanması, yağmur veya güneş ışığında kalması halinde bile etkinliğini devam ettirir. Eğer 4 haftadan daha önce bir uygulama gerekirse haftada bir defadan fazla uygulanmamalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

İnsan ve hayvanlarda yanlılıkla ağız yolu ile alınırsa nadir olarak hareketlerde dengesizlik, konvülsiyon, titreme veya solunum güçlüğü gibi zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Semptomatik olarak tedavi edilebilecek olan bu belirtiler aktif kömür kullanılarak hafifletilebilir. Spesifik bir antidotu yoktur.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

ATCvet kodu: QP53AX17

Farmakoterapotik grup: Topikal kullanım için diğer ektoparazitler

5.1 Farmakodinamik özellikler

İmidacloprid, kloronikotillerin yeni grubunda yer alan ektoparazitler bir maddedir. Farmakodinamik özellikleri bakımından diğer insektisitlerden farklıdır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Yağlı çözeltiler halinde köpek ve kedilerin derilerine damlatıldığında vücut yüzeyine hızla dağılarak uzun bir süre deri yüzeyinde kalır. Pirelere geçerek postsinaptik sinir bölgesindeki nikotinik tipteki asetilkolin reseptörlerine sıkı bir şekilde bağlanır. Memelilerin nikotinik reseptörleri farklı yapıda olduklarından aynı ilaca daha az ilgi gösterir. Ayrıca, İmidacloprid memelilerin beyin zarlarından güçlükle geçebildiğinden memelilerde sinir sistemine geçme oranı oldukça düşük düzeyde kalır. Bu nedenle, aktif maddenin kolinerjik transmisyon üzerindeki bloke edici etkisi seçici olarak hedef parazitler üzerinde gerçekleşir. Yapılan son çalışmalar, bu maddenin ergin pirelerin yanında larva formlarında da larvasit olarak etki ettiğini (etki ettiğini) göstermiştir. İMİDA Damlatma Çözeltisi altı haftadan sonra bozunarak İmidacloprid'in hayvanın üzerindeki etkinliği kaybolur.

Toksikolojik Bilgiler: Yapılan klinik denemelerde İmidacloprid'in embriyotoksik, teratojenik veya toksik etkiler meydana getirmediği görülmüştür. İmidacloprid sadece harici kullanımlar içindir. LD50 sıçanlarda 450 mg/kg, farelerde 131 mg/kg canlı ağırlık, 24 saat dermal LD50 Sıçanlarda > 5000 mg/kg canlı ağırlık, NOEL değeri sıçanlarda erkekler 1943 mg/kg (Spot-On Formül), dişilerde 1732 mg/kg'dır (Spot-On Formül).

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

BHT

İzo propil palmitat

Benzil alkol

6.2 Geçimsizlikler

Önerilen dozun iki katının kullanıldığı durumlarda bile fentiyon, luferunon, milbemisin, febantel, pirantel pamoat ve prazikuantel gibi ilaçlarla birlikte kullanılmasında herhangi bir geçimsizlik gözlenmemiştir. Aşılama gibi rutin tedavi durumlarında **İmida Damlatma Çözeltisi** kullanılmasında hiçbir zararlı etki görülmemiştir.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıl

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında ve güneş ışığından koruyarak saklayınız.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

0,4 ml ve 1 ml'lik mikro tüpler içinde 3, 4, 5'li karton kutular da satışa sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Ürün suda yaşayan canlılar için (balıklar vb.) zararlı olabileceğinden, göletler, havuzlar ve su kanallarının ürün ya da atık materyalleri ile kontamine olmasından kaçınılmalıdır. Boşalan ambalajlar ateş ve yanıcı maddeler içerisine atılmamalıdır. Herhangi bir kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu tür ürünlerin atık materyalleri, yerel yasalara uygun şekilde imha edilmelidir. Ürün, tavşanlarda zehirlenmeye neden olabileceğinden kullanılmaz.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

018/0093

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

11.09.2007

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

31.12.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
İmida
Damlatma Çözeltisi
Kediler ve Köpekler için Ektoparaziter
(İnsektisit)

BİLEŞİMİ

Her ml 100 mg İmidacloprid içerir. Çok açık sarı renkli, yağlı görünümlü homojen bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

İmidacloprid, kloronikotillerin yeni grubunda yer alan ektoparaziter bir maddedir. Farmakodinamik özellikleri bakımından diğer insektisitlerden farklıdır.

Yağlı çözeltiler halinde köpek ve kedilerin derilerine damlatıldığında vücut yüzeyine hızla dağılarak uzun bir süre deri yüzeyinde kalır. Pirelere geçerek postsinaptik sinir bölgesindeki nikotinik tipteki asetilkolin reseptörlerine sıkı bir şekilde bağlanır. Memelilerin nikotinik reseptörleri farklı yapıda olduklarından aynı ilaca daha az ilgi gösterir. Ayrıca, İmidacloprid memelilerin beyin zarlarından güçlükle geçebildiğinden memelilerde sinir sistemine geçme oranı oldukça düşük düzeyde kalır. Bu nedenle, aktif maddenin kolinerjik transmisyon üzerindeki bloke edici etkisi seçici olarak hedef parazitler üzerinde gerçekleşir. Yapılan son çalışmalar, bu maddenin ergin pirelerin yanında larva formlarında da larvasit olarak etki ettiğini göstermiştir. İMİDA Damlatma Çözeltisi altı haftadan sonra bozunarak İmidacloprid'in hayvanın üzerindeki etkinliği kaybolur.

Toksikolojik Bilgiler: Yapılan klinik denemelerde İmidacloprid'in embriyotoksik, teratojenik veya toksik etkiler meydana getirmedeği görülmüştür. İmidacloprid sadece harici kullanımlar içindir. LD₅₀ sıçanlarda 450 mg/kg, farelerde 131 mg/kg canlı ağırlık, 24 saat dermal LD₅₀ Sıçanlarda > 5000 mg/kg canlı ağırlık, NOEL değeri sıçanlarda erkekler 1943 mg/kg (Spot-On Formül), dişilerde 1732 mg/kg'dır (Spot-On Formül)

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

İMİDA Damlatma Çözeltisi köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Hayvanın üzerinde barınan pireler ilaç uygulamasından bir gün sonra tamamen ölür ve dört haftalık bir koruma süresi sağlanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

İmida Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

İmida Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

Canlı Ağırlık/Hayvan	Mikro tüp	mg/kg Canlı Ağırlık
0-4 kg/kedi-köpek	1 adet 0,4 ml mikro tüp	> 10 mg
4 kg'dan fazla/kedi	2 adet 0,4 ml mikro tüp	< 20 mg
4-10 kg/köpek	1 adet 1,0 ml mikro tüp	10-25 mg



İmida Damlatma Çözeltisi uygulandıktan sonra 24 saat içinde köpek ve kedilerdeki pireleri yok eder. Tek bir uygulama ile yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Pirelere karşı en ideal korunma ve mücadele için **İMİDA Damlatma Çözeltisi** ayda bir kez uygulanmalıdır.

İmida Damlatma Çözeltisi hayvanın yıkanması, yağmur veya güneş ışığında kalması halinde bile etkinliğini devam ettirir. Eğer 4 haftadan daha önce bir uygulama gerekirse haftada bir defadan fazla uygulanmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

İmida Damlatma Çözeltisi köpek ve kedilerdeki güvenlik endeksi 2-10'dur. Önerilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir yan etki riski oluşturmaz.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebe köpek ve kedilerde kullanılmasında sakınca yoktur.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kediler uygulamanın ardından uygulama noktasını yalarsa ilacın acılığından dolayı salya salgısı artabilir. Bu durumun zehirlenme ile ilgisi olmayıp birkaç dakika sonra kendiliğinden geçtiği görülür.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Önerilen dozun iki katının kullanıldığı durumlarda bile fentiyon, luferunon, milbemis, febantel, pirantel pamoat ve prazikuantel gibi ilaçlarla birlikte kullanılmasında herhangi bir geçimsizlik gözlenmemiştir. Aşılama gibi rutin tedavi durumlarında **İmida Damlatma Çözeltisi** kullanılmasında hiçbir zararlı etki görülmemiştir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İnsan ve hayvanlarda yanlışlıkla ağız yolu ile alınırsa nadir olarak hareketlerde dengesizlik, konvülsiyon, titreme veya solunum güçlüğü gibi zehirlenme belirtileri ortaya çıkar. Semptomatik olarak tedavi edilebilecek olan bu belirtiler aktif kömür kullanılarak hafifletilebilir. Spesifik bir antidotu yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

İmida Damlatma Çözeltisi 0,4 ml: 8 haftadan küçük köpek yavrularında ve 10 haftadan küçük kedi yavrularında,

İmida Damlatma Çözeltisi 1,0 ml: 4 kg'dan hafif köpeklerde,

Ayrıca zayıf ve güçsüz, yaşlı, hamile ve emziren hayvanlarda kullanmadan önce veteriner hekime danışılmalıdır.

GENEL UYARILAR

“Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.”

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.”

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Cilt ile temas halinde hassasiyet oluşturabilir, cilt ve göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız. Cilt ve gözde tahriş hali devam ederse prospektüsle birlikte doktora başvurunuz. Uygulama sırasında koruyucu eldiven kullanınız. Yutulduğunda zararlıdır, kaza ile yutulduğunda prospektüsle birlikte hemen doktora başvurunuz. Uygulamadan sonra 30 dakika süre veya uygulama bölgesi kuruyuncaya kadar, hayvan ile doğrudan temas etmeyiniz ve çocuklardan uzak tutunuz. Uygulama sırasında yemekten, içmekten ve sigara kullanmaktan sakınınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında ve güneş ışığından koruyarak saklayınız.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıl

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Ürün suda yaşayan canlılar için (balıklar vb.) zararlı olabileceğinden, göletler, havuzlar ve su kanallarının ürün ya da atık materyalleri ile kontamine olmasından kaçınılmalıdır. Boşalan ambalajlar ateş ve yanıcı maddeler içerisine atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

0,4 ml ve 1 ml'lik mikro tüpler içinde 3, 4, 5'li karton kutular da satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:31.12.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.

11.09.2007-18/093

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İstanbul

Dış Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
İmida
Damlatma Çözeltisi
Kediler ve Köpekler için Ektoparaziter
(İnsektisit)

BİLEŞİM: Her ml 100 mg İmidacloprid içerir. Çok açık sarı renkli, yağlı görünümlü homojen bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR

İmida Damlatma Çözeltisi köpeklerin ve kedilerin pire enfestasyonlarını tek uygulamada yok eder ve yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Hayvanın üzerinde barınan pireler ilaç uygulamasından bir gün sonra tamamen ölür ve dört haftalık bir koruma süresi sağlanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: İMİDA Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

İmida Damlatma Çözeltisi, mikro tüp şeklinde olup uygulanması çok kolaydır. Dik şekilde duran kedi veya köpeğin omuzlarının arasındaki tüyler, derisi görülecek şekilde açılır. Mikro tüpün ağzı deriye temas edecek şekilde, omuzlarının arasına 2 farklı noktaya eşit miktarda ya da çizgi halinde boşaltılır. Yalnızca sağlıklı deri kısmına boşaltınız. Hayvanların canlı ağırlıklarına karşılık gelen doz uygulamaları için aşağıdaki tablodan yararlanılır.

Canlı Ağırlık/Hayvan	Mikro tüp	mg/kg Canlı Ağırlık
0-4 kg/kedi-köpek	1 adet 0,4 ml mikro tüp	> 10 mg
4 kg'dan fazla/kedi	2 adet 0,4 ml mikro tüp	< 20 mg
4-10 kg/köpek	1 adet 1,0 ml mikro tüp	10-25 mg



İmida Damlatma Çözeltisi uygulandıktan sonra 24 saat içinde köpek ve kedilerdeki pireleri yok eder. Tek bir uygulama ile yeni pire enfestasyonlarını en az 4 hafta boyunca önler. Pirelere karşı en ideal korunma ve mücadele için **İmida Damlatma Çözeltisi** ayda bir kez uygulanmalıdır.

İmida Damlatma Çözeltisi hayvanın yıkanması, yağmur veya güneş ışığında kalması halinde bile etkinliğini devam ettirir. Eğer 4 haftadan daha önce bir uygulama gerekirse haftada bir defadan fazla uygulanmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

“Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.”

“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.”

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.”

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında ve güneş ışığından koruyarak saklayınız.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıl

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

0,4 ml ve 1 ml'lik mikro tüpler içinde 3, 4, 5'li karton kutular da satışa sunulmaktadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Ürün suda yaşayan canlılar için (balıklar vb.) zararlı olabileceğinden, göletler, havuzlar ve su kanallarının ürün ya da atık materyalleri ile kontamine olmasından kaçınılmalıdır. Boşalan ambalajlar ateş ve yanıcı maddeler içerisine atılmamalıdır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.

11.09.2007-018/0093

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İstanbul

Seri No:

Üretim Tarihi

Son Kullanma Tarihi

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:

İç Ambalaj Etiketi

0,4 ml'lik mikro tüp için;

**Sadece Hayvan Sağlığında
Kullanılır İMİDA Kedi ve Köpek 0-
4 kg Damlatma Çözeltisi 0,4 ml**
100 ml'si 10 g İmidacloprid içerir.
Seri No: Üretim
Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

1 ml'lik mikro tüp için;

**Sadece Hayvan Sağlığında
Kullanılır İMİDA Köpek 0-4 kg
Damlatma Çözeltisi 1,0 ml**
100 ml'si 10 g İmidacloprid içerir.
Seri No: Üretim
Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:

Uygulama Etiketi

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
İmida
Damlatma Çözeltisi
Kediler ve Köpekler için Ektoparaziter
(İnsektisit)**

İmida Damlatma Çözeltisi uygulama tarihlerinizit akip etmek için etiketleri kutu üzerine, ajandanıza ya da aşı karnesine yapıştırabilirsiniz.