

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

İNSELVİT Oral Emülsiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her gram:

Aktif madde:

Vitamin E 150 IU

Na-Selenit 2,2 mg (1 mg Selenyum baza eşdeğer)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1. 'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Oral Emülsiyon

Beyaz-kremi renkte bir emülsiyondur

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Tavuk, hindi, balık (sazan, levrek, çipura, kalkan, somon, alabalık)

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

İnselvit, oral yolla kullanıma mahsus bir emülsiyon olup, kanatlılarda oluşan ensefalomalasi, kas distrofisi, eksudatif diatez gibi hastalıkların sağaltımı ve korunmasında, Vitamin E ve Selenyumdan yoksun ve doymamış yağ asid miktarı yüksek yemlerle beslenen hayvanlarda destekleyici olarak kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

-.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Selenyumun toksisitesinden dolayı, "Dozaj ve uygulama yolu" bölümünde belirtilen dozlara ve son tarihlere uyulması önemlidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Ürünün hazırlanması sırasında ürünü solumamaya özen gösteriniz. İyi havalandırılmış ve hava akımı olmayan alanda hazırlık işlemlerini gerçekleştiriniz. Ürünü uygulama/hazırlama sırasında sigara dahil hiçbir şey tüketmeyiniz.

(iii) Diğer uyarılar

-

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Bazı hayvanlarda selenyum hassasiyeti olabilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

-

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinmemektedir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Kanatlılarda içme suyuna karıştırılarak, balıklarda yemleme öncesi yem karışımı sırasında yeme püskürtülerek kullanılır.

İnselvit, kanatlılar ve balıklar için hazırlanmış bir ilaç olup, genel dozu 0,04 mcg Se + 44 IU Vit E hesabı ile ayarlanır.

Genel olarak balık ve kanatlılar için farmakolojik dozu;

100 kg canlı ağırlık için 4 mg Selenyum

100 kg canlı ağırlık için 4.400 IU Vitamin E

Not: Kanatlılar, iklim koşullarına göre önceden 1-3 saat susuz bırakılmalıdır. İçme suyu miktarı ise 3-5 saat içinde tüketilecek miktarda olmalıdır.

Kanatlı çiftliklerinde uygulanabilecek pratik dozaj:

İçme suyu (Litre)	İnselvit (ml)
100	50
250	125
500	250
1000	500

Balıklar için yemleme yapılmadan önce yem karıştırılırken 1 ton yeme 1 L İnselvit püskürtülerek karıştırılır

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Selenyum zehirli bir madde olup, terapötik dozlar aşılmamalıdır. Yüksek dozlarda, solunum sayısında artış ve solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve kollaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır. Spesifik bir antidotu yoktur.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

Sıfır “0” gün.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Beslenme sistemi ve metabolizma, mineral takviyeleri, selenyum, selenyum kombinasyonlar

ATCvet kodu: QA12CE99

İNSELVİT Oral Emülsiyon, E vitamini ve selenyumun uygun yoğunluk ve kombinasyonlarında hazırlanmış bir emülsiyonudur.

Selenyum: Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz elementlerden biridir. Selenyum normal gelişme ve döllenme için gereklidir ve evcil hayvanlardaki birçok dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve sağaltımında etkilidir. Selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Emilen selenyumun fazlası, çoğunlukla idrarla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum yoluyla vücudu terk eder.

E vitamini: E vitamininin en önemli biyolojik görevi yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını etkisizleştirme temeline dayanır. Aynı zamanda vücut bağışıklık sistemini (hücrel ve sıvısal) güçlendirici ve fertilitate fonksiyonlarını düzenleyici etkilere sahiptir. Emildikten sonra geniş ölçüde bütün vücut dokularına dağılır ve burada birikir. Gereksinimden fazla olarak emilen veya depolama sırasında fazla olan E vitamini başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Tween 80 (Polisorbat)

Benzil alkol

Saf su

6.2 Geçimsizlikler

Diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 1 ay

İlaçlı içme suyunun raf ömrü: 24 saat

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajı içinde, güneş ışığından koruyarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. İlk açıldıktan sonra da orijinal ambalajı içinde, güneş ışığından koruyarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

1L ürün 1LT'lik beyaz HDPE şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

AGROVET İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi 67132 Sokak No: 4/A Seyhan / ADANA

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

011/1092

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

21.10.2002

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

10.06.2026

PROSPEKTÜS-ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

İNSELVİT

Oral Emülsiyon

Veteriner Vitamin-Mineral

BİLEŞİMİ

İnselvit Oral Emülsiyon, beyaz-kremsi renkte oral kullanıma uygun bir emülsiyondur. 1 ml 'de 150 IU Vitamin E ve 1 mg Selenyum baza eşdeğer 2,2 mg Na-Selenit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

İNSELVİT Oral Emülsiyon, E vitamini ve selenyumun uygun yoğunluk ve kombinasyonlarında hazırlanmış bir emülsiyonudur.

Selenyum: Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz elementlerden biridir. Selenyum normal gelişme ve döllenme için gereklidir ve evcil hayvanlardaki birçok dejeneratif bozuklukların önlenmesi ve sağaltımında etkilidir. Selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Emilen selenyumun fazlası, çoğunlukla idrarla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum yoluyla vücudu terk eder.

E vitamini: E vitamininin en önemli biyolojik görevi yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını etkisizleştirme temeline dayanır. Aynı zamanda vücut bağışıklık sistemini (hücrel ve sıvısal) güçlendirici ve fertilite fonksiyonlarını düzenleyici etkilere sahiptir. Emildikten sonra geniş ölçüde bütün vücut dokularına dağılır ve burada birikir. Gereksinimden fazla olarak emilen veya depolama sırasında fazla olan E vitamini başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Hedef türler arasında tavuk, hindi, balık (sazan, levrek, çipura, kalkan, somon, alabalık) bulunmaktadır.

İnselvit, oral yolla kullanıma mahsus bir emülsiyon olup, kanatlılarda oluşan ensefalomalasi, kas distrofisi, eksudatif diatez gibi hastalıkların sağaltımı ve korunmasında, Vitamin E ve Selenyumdan yoksun ve doymamış yağ asid miktarı yüksek yemlerle beslenen hayvanlarda destekleyici olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kanatlılarda içme suyuna karıştırılarak, balıklarda yemleme öncesi yem karışımı sırasında yeme püskürtülerek kullanılır.

İnselvit, kanatlılar ve balıklar için hazırlanmış bir ilaç olup, genel dozu 0,04 mcg Se + 44 IU Vit E hesabı ile ayarlanır.

Genel olarak balık ve kanatlılar için farmakolojik dozu;

100 kg canlı ağırlık için 4 mg Selenyum

100 kg canlı ağırlık için 4.400 IU Vitamin E

Not: Kanatlılar, iklim koşullarına göre önceden 1-3 saat susuz bırakılmalıdır. içme suyu miktarı ise 3-5 saat içinde tüketilecek miktarda olmalıdır.

Kanatlı çiftliklerinde uygulanabilecek pratik dozaj:

İçme suyu (Litre)	İnselvit (ml)
100	50
250	125
500	250
1000	500

Balıklar için yemleme yapılmadan önce yem karıştırılırken 1 ton yeme 1 L İnselvit püskürtülerek karıştırılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Selenyumun toksisitesinden dolayı, "Dozaj ve uygulama yolu" bölümünde belirtilen dozlara ve son tarihlere uyulması önemlidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bazı hayvanlarda selenyum hassasiyeti olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinmemektedir.

Diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Selenyum zehirli bir madde olup, terapötik dozlar aşılmamalıdır. Yüksek dozlarda, solunum sayısında artış ve solunum güçlüğü, taşikard i, ishal, davranış bozuklukları ve kolaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır. Spesifik bir antidotu yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır "0" gün

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Ürünün hazırlanması sırasında ürünü solumamaya özen gösteriniz. İyi havalandırılmış ve hava akımı olmayan alanda hazırlık işlemlerini gerçekleştiriniz. Ürünü uygulama/hazırlama sırasında sigara dahil hiçbir şey tüketmeyiniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde, güneş ışığından koruyarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. İlk açıldıktan sonra da orijinal ambalajı içinde, güneş ışığından koruyarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Ürünün satışa sunulmuş haliyle raf ömrü 2 yıl, iç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü 1 ay ve ilaçlı içme suyunun raf ömrü 24 saattir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMA YAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ve artık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

1L ürün 1LT'lik beyaz HDPE şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 10.06.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
21.10.2002 -011/1092

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

AGROVET İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi 67132 Sokak No: 4/A Seyhan / ADANA

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DAMLA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİC. L TD. ŞTİ.

Aydınlı-Orhanlı Mevkii Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Sama Caddesi No: 9 (L3-1 Parsel)
Tuzla/ İSTANBUL

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

KDV DAHİL P.S.F.: