

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

### 1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Albenova Oral Tablet

### 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir tablette

Aktif madde:

Albendazol.....: 300 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

### 3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Oral Tablet

Beyaz veya beyaza yakın renkte ortasından çentikli tablet

### 4. KLİNİK ÖZELLİKLER

#### 4.1 Hedef tür

Sığır, Koyun, Keçi

#### 4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Albendazol sığır, keçi ve koyunlarda gastrointestinal yuvarlak kurtlar, akciğer kurtları, şeritler ve erişkin karaciğer keleklerine etkili geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Aynı zamanda kelek ve yuvarlak kurtlarda ovisidal etki gösterir, bu sayede çayır/mera kontaminasyonunun azaltılmasını sağlar.

##### Sığır:

Yuvarlak kurt: *Teladorsagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Nematodirus*, *Oesophagostomum*, *Bunostomum*, *Cooperia* ve *Strongyloides* spp. Genellikle *Cooperia* ve *Ostertagia* inhibe larvalarına da etkilidir.

Akciğer kurdu: *Dictyocaulus viviparus*

Şerit: *Moniezia* spp.

Erişkin karaciğer kelebeği: *Fasciola hepatica*

##### Koyun-keçi:

Aşağıdaki türlerin benzimidazollere duyarlı suşlarına karşı etkilidir.

Yuvarlak kurtlar: *Teladorsagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia curticei*, *Nematodirus*, (*N.battus* dâhil), *Chabertia*, *Bunostomum* ve *Oesophagostomum*. Genellikle inhibe *Ostertagia* larvalarına da etkilidir.

Akciğer kurdu: *Dictyocaulus filaria*

Şerit: *Moniezia* spp.,

Erişkin karaciğer kelebeği: *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium lanceolatum* (dentriticum)

#### 4.3 Kontrendikasyonlar

Ürün bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmaz.

Benzimidazollere direncin söz konusu olabileceği durumlarda kullanılmaz.

#### 4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Akciğer kurtları nedeniyle ciddi akciğer hasarı olan sığırlarda tedaviden sonra öksürük birkaç hafta daha devam edebilir.

Direnç gelişimi riskini artırma ve tedavinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

- Aynı sınıf antihelmintikler uzun süre boyunca, sıklıkla ve tekrarlayan şekilde kullanılmamalıdır.

- Antihelmintiklere direnç geliştiğine dair şüphe var ise uygun testler ile daha ileri araştırma gereklidir. Test (ler)in sonuçlarının kuvvetli bir şekilde başka bir farmakolojik sınıfa ait olan ve farklı bir etki tarzına sahip olan belirli bir antelmintiğe direnç gösterdiği durumlarda kullanılmalıdır.

Avrupa Birliği ülkelerinde küçük ruminantlarda enfestasyona neden olan *Teladorsagia*, *Haemonchus*, *Cooperia* ve *Trichostrongylus* türlerinin albendazol de dâhil benzimidazollere direnç geliştirdiği rapor edilmiştir. Yeni Zelanda'da sığırlarda *Cooperia* ve *Teladorsagia* türlerinde albendazole direnç tespit edilmiştir. Bu nedenle bu ürünün kullanımı bölgesel/ülkesel edipemiyolojik duyarlılık verilerine ve tavsiyelere göre kullanılmalıdır.

Direnç ile ilgili hususların yönetimi için veteriner hekiminize danışınız.

#### 4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

##### (i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

##### (ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

##### (iii) Diğer uyarılar

#### 4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Bilinmemektedir.

#### 4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Koyun, fare, rat ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda albendazolün teratojenik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle gebeliğin ilk 1/3'ünde kullanımı kontrendikedir. Gebeliğin daha sonraki dönemlerinde veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

#### 4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinmemektedir.

#### 4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Ağız yolu ile uygulanır. Tabletlerin hayvan tarafından yutulduğundan emin olunmalıdır.

**Sığır:** Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları için 7.5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Erişkin karaciğer kelebeği (F. hepatica) için ise 10 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

| Pratik doz tablosu                                                                         | 120 kg<br>vücut ağırlığı | 240 kg<br>vücut ağırlığı |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları | 3 tablet                 | 6 tablet                 |
| Erişkin karaciğer kelebeği (F. hepatica)                                                   | 4 tablet                 | 8 tablet                 |

**Koyun:** Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları için 5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

Erişkin karaciğer kelebeği (F. hepatica) için 7.5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

Dicrocelium lanceolatum (dentriticum) için 15 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

| Pratik doz tablosu                                                                          | 60 kg<br>vücut ağırlığı | 120 kg<br>vücut ağırlığı |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer keleşbeęi ve yuvarlak kurt yumurtaları | 1 tablet                | 2 tablet                 |
| Erişkin karaciğer keleşbeęi (F. hepatica)                                                   | 1,5 tablet              | 3 tablet                 |
| Dicrocelium lanceolatum (dentriticum)                                                       | 3 tablet                | 6 tablet                 |

**Keçi:** Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile Erişkin karaciğer keleşbeęi (F. hepatica) için 7,5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda, Dicrocelium lanceolatum (dentriticum) için 15 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

| Pratik doz tablosu                                                                   | 60 kg<br>vücut ağırlığı | 120 kg<br>vücut ağırlığı |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile Erişkin karaciğer keleşbeęi (F. hepatica) | 1,5 tablet              | 3 tablet                 |
| Dicrocelium lanceolatum (dentriticum)                                                | 3 tablet                | 6 tablet                 |

#### 4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Tavsiye dozlarında genellikle iyi tolere edilir. 3-5 kat uygulamada önemli bir yan etki görülmemiştir. Doz aşımı halinde depresyon ve anoreksi oluşabilir.

#### 4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

İlaç uygulamasından sonra sığırlar 14, koyun ve keçiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, ineklerde 72 saat (6 saęım), koyun ve keçilerde 6 gün (144 saat-12 saęım) geçmeden elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

### 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

**Farmakoterapotik grup:** Antihelmintikler, benzimidazoller ve türevleri, albendazol  
**ATC-vet kodu:** QP52AC11.

#### 5.1 Farmakodinamik özellikler

Albendazol duyarlı parazitlerde yapısal bir protein olan tubuline bağlanarak mikrotubullerin polimerizasyonunu engeller. Nematodların intestinal hücreleri bundan özellikle etkilenir ve absorpsiyon yeteneklerinin kaybolmasına dolayısıyla beslenememelerine ve hücre bütünlüğünü bozarak parazitin ölümüne yol açar.

Ayrıca tüm benzimidazollerde olduğu gibi albendazol parazitlerin glikoz metabolizmasında bulunan fumarat redüktazın etkinliğini engelleyerek ve parazitlerin enerji metabolizmasını bozarak etki gösterir. Bu bozulma sonunda glikojenin kullanılması artar ve parazit ölür. Memelilerin ve helmintlerin tubulinleri arasında yapısal farklılıklar bulunması, albendazolün helmintlere karşı seçici toksisite göstermesini sağlar.

Nematodlarda belirlenen iki direnç mekanizması “duyarlı” beta tubulin gen izotipinin progresif kaybını ve fenilalanin yerine tirozin kodlanmasından kaynaklanan bir nokta mutasyon ile “dirençli” bir beta-tubulin gen izotipinin ortaya çıkmasını kapsar.

## 5.2 Farmakokinetik özellikler

Albendazol zayıf suda çözünürlüğe ve gastrointestinal sistemden sınırlı emilime sahiptir (oral dozun yaklaşık %50'si sığırlarda emilmektedir). Emilimi takiben karaciğerde hızlı bir şekilde ilk geçiş metabolizması vardır ve albendazolün sülfür kısmı, farmakolojik olarak aktif sülfoksite, ardından sülfona oksitlenir, ardından 2-aminosülfonu oluşturmak için karbamat grubunun deasetilasyonu yapılır.

Oksidasyon ve hidroliz sonucu çözünürlüğü ana metabolitten daha yüksek olan metabolitler kanda, dokularda, safırda ve idrarda bulunur.

Atılım; safra, dışkı ve idrar yoluyla olur. Ruminantlarda, uygulanan dozun %60-70'i idrar yoluyla çeşitli metabolitler şeklinde atılır ve bunların büyük bir kısmı sülfoksittir.

## 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

### 6.1 Yardımcı maddeler

Sodyum starch glikolat (Primojel)

Magnezyum stearat

Avicel (Mikrokristalin selüloz)

Deiyonize su

### 6.2 Geçimsizlikler

-

### 6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 7 gün

### 6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Bölünmüş tablet aynı muhafaza şartlarında saklanır.

### 6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

10 tablet içeren, üst şeffaf PVC ve alt alüminyum folyodan oluşan blisterlerde, 1 (10 tablet), 2 (20 tablet) ve 3 (30 tablet) adet blister veya 50 adet ve 100 adet tablet içeren beyaz renkli PE şişeler karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

### 6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

BALIK VE SUCUL YAŞAM İÇİN TEHLİKELİDİR. Su kaynakları (akarsular, göl, hendek vb.) ürün veya kullanılmış ürün kapları ile kirletilmemelidir.

## 7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Denova İlaç San.ve Tic. Ltd.Şti.

Gürselpaşa Mah. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Cad. Aygül Apt. No:53 A

Seyhan/Adana

## 8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 019/0081

## 9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ: 05.03.2008

## 10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 25.07.2025

## **Prospektüs**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

### **ALBENOVA**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

## **BİLEŞİMİ**

Albenova Oral Tablet; her bir tablette 300 mg albendazol içeren beyaz veya beyaza yakın renkte ortasından çentikli tablettir.

## **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER**

### **Farmakodinamik özellikler**

Albendazol duyarlı parazitlerde yapısal bir protein olan tubuline bağlanarak mikrotubullerin polimerizasyonunu engeller. Nematodların intestinal hücreleri bundan özellikle etkilenir ve absorpsiyon yeteneklerinin kaybolmasına dolayısıyla beslenememelerine ve hücre bütünlüğünü bozarak parazitin ölümüne yol açar.

Ayrıca tüm benzimidazollerde olduğu gibi albendazol parazitlerin glikoz metabolizmasında bulunan fumarat redüktazın etkinliğini engelleyerek ve parazitlerin enerji metabolizmasını bozarak etki gösterir. Bu bozulma sonunda glikojenin kullanılması artar ve parazit ölür. Memelilerin ve helmintlerin tubulinleri arasında yapısal farklılıklar bulunması, albendazolün helmintlere karşı seçici toksisite göstermesini sağlar.

Nematodlarda belirlenen iki direnç mekanizması “duyarlı” beta tubulin gen izotipinin progresif kaybını ve fenilalanin yerine tirozin kodlanmasından kaynaklanan bir nokta mutasyon ile “dirençli” bir beta-tubulin gen izotipinin ortaya çıkmasını kapsar.

### **Farmakokinetik özellikler**

Albendazol zayıf suda çözünürlüğe ve gastrointestinal sistemden sınırlı emilime sahiptir (oral dozun yaklaşık %50'si sıgırlarda emilmektedir). Emilimi takiben karaciğerde hızlı bir şekilde ilk geçiş metabolizması vardır ve albendazolün sülfür kısmı, farmakolojik olarak aktif sülfoksite, ardından sülfona oksitlenir, ardından 2-aminosülfonu oluşturmak için karbamat grubunun deasetilasyonu yapılır.

Oksidasyon ve hidroliz sonucu çözünürlüğü ana metabolitten daha yüksek olan metabolitler kanda, dokularda, safırda ve idrarda bulunur.

Atılım; safra, dışkı ve idrar yoluyla olur. Ruminantlarda, uygulanan dozun %60-70'i idrar yoluyla çeşitli metabolitler şeklinde atılır ve bunların büyük bir kısmı sülfoksittir.

## **KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR**

Albendazol sığır, keçi ve koyunlarda gastrointestinal yuvarlak kurtlar, akciğer kurtları, şeritler ve erişkin karaciğer keleklerine etkili geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Aynı zamanda kelek ve yuvarlak kurtlarda ovisidal etki gösterir, bu sayede çayır/mera kontaminasyonunun azaltılmasını sağlar.

### **Sığır:**

Yuvarlak kurt: Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia ve Strongyloides spp. Genellikle Cooperia ve Ostertagia inhibe larvalarına da etkilidir.

Akciğer kurdu: Dictyocaulus viviparus

Şerit: Moniezia spp.

Erişkin karaciğer kelebeği: Fasciola hepatica

### **Koyun-keçi:**

Aşağıdaki türlerin benzimidazollere duyarlı suşlarına karşı etkilidir.

Yuvarlak kurtlar: *Teladorsagia*, *Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia curticei*, *Nematodirus*, (*N.battus* dâhil), *Chabertia*, *Bunostomum* ve *Oesophagostomum*. Genellikle inhibe *Ostertagia* larvalarına da etkilidir.

Akciğer kurdu: *Dictyocaulus filaria*

Şerit: *Moniezia* spp.,

Erişkin karaciğer kelebeği: *Fasciola hepatica*, *Dicrocoelium lanceolatum* (*dentriticum*)

### KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Ağız yolu ile uygulanır. Tabletlerin hayvan tarafından yutulduğundan emin olunmalıdır.

**Sığır:** Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları için 7.5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

Erişkin karaciğer kelebeği (*F. hepatica*) için ise 10 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

| Pratik doz tablosu                                                                         | 120 kg<br>vücut ağırlığı | 240 kg<br>vücut ağırlığı |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları | 3 tablet                 | 6 tablet                 |
| Erişkin karaciğer kelebeği ( <i>F. hepatica</i> )                                          | 4 tablet                 | 8 tablet                 |

**Koyun:** Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları için 5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

Erişkin karaciğer kelebeği (*F. hepatica*) için 7.5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

*Dicrocoelium lanceolatum* (*dentriticum*) için 15 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

| Pratik doz tablosu                                                                         | 60 kg<br>vücut ağırlığı | 120 kg<br>vücut ağırlığı |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile karaciğer kelebeği ve yuvarlak kurt yumurtaları | 1 tablet                | 2 tablet                 |
| Erişkin karaciğer kelebeği ( <i>F. hepatica</i> )                                          | 1,5 tablet              | 3 tablet                 |
| <i>Dicrocoelium lanceolatum</i> ( <i>dentriticum</i> )                                     | 3 tablet                | 6 tablet                 |

**Keçi:** Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile Erişkin karaciğer kelebeği (*F. hepatica*) için 7,5 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda,

*Dicrocoelium lanceolatum* (*dentriticum*) için 15 mg albendazol/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır.

| Pratik doz tablosu                                                                           | 60 kg<br>vücut ağırlığı | 120 kg<br>vücut ağırlığı |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Yuvarlak kurt, akciğer kurdu, şeritler ile Erişkin karaciğer kelebeği ( <i>F. hepatica</i> ) | 1,5 tablet              | 3 tablet                 |
| <i>Dicrocoelium lanceolatum</i> ( <i>dentriticum</i> )                                       | 3 tablet                | 6 tablet                 |

### ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Akciğer kurtları nedeniyle ciddi akciğer hasarı olan sığırlarda tedaviden sonra öksürük birkaç hafta daha devam edebilir.

Direnç gelişimi riskini artırma ve tedavinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

- Aynı sınıf antihelmintikler uzun süre boyunca, sıklıkla ve tekrarlayan şekilde kullanılmamalıdır.
- Antihelmintiklere direnç geliştiğine dair şüphe var ise uygun testler ile daha ileri araştırma gereklidir. Test (ler)in sonuçlarının kuvvetli bir şekilde başka bir farmakolojik sınıfa ait olan ve farklı bir etki tarzına sahip olan belirli bir antelmintiğe direnç gösterdiği durumlarda kullanılmalıdır.

Avrupa Birliği ülkelerinde küçük ruminantlarda enfestasyona neden olan *Teladorsagia*, *Haemonchus*, *Cooperia* ve *Trichostrongylus* türlerinin albendazol de dâhil benzimidazollere direnç geliştirdiği rapor edilmiştir. Yeni Zelanda’da sığırlarda *Cooperia* ve *Teladorsagia* türlerinde albendazole direnç tespit edilmiştir. Bu nedenle bu ürünün kullanımı bölgesel/ülkesel edipemiyolojik duyarlılık verilerine ve tavsiyelere göre kullanılmalıdır.

Direnç ile ilgili hususların yönetimi için veteriner hekiminize danışınız.

**Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı:** Koyun, fare, rat ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda albendazolün teratojenik etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle gebeliğin ilk 1/3’ünde kullanımı kontrendikedir. Gebeliğin daha sonraki dönemlerinde veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

## **İSTENMEYEN ETKİLER**

Bilinmemektedir.

## **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ**

Bilinmemektedir.

## **DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT**

Tavsiye dozlarında genellikle iyi tolere edilir. 3-5 kat uygulamada önemli bir yan etki görülmemiştir. Doz aşımı halinde depresyon ve anoreksi oluşabilir.

## **GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI**

İlaç uygulamasından sonra sığırlar 14, koyun ve keçiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, ineklerde 72 saat (6 sağıım), koyun ve keçilerde 6 gün (144 saat-12 sağıım) geçmeden elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

## **KONTRENDİKASYONLAR**

Ürün bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmaz.

Benzimidazollere direncin söz konusu olabileceği durumlarda kullanılmaz.

## **GENEL UYARILAR**

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

## **UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER**

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

### **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C’nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Bölünmüş tabletin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 7 gündür.

## **KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR**

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

BALIK VE SUCUL YAŞAM İÇİN TEHLİKELİDİR. Su kaynakları (akarsular, göl, hendek vb.) ürün veya kullanılmış ürün kapları ile kirletilmemelidir.

#### **TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ**

10 tablet içeren, üst şeffaf PVC ve alt alüminyum folyodan oluşan blisterlerde, 1 (10 tablet), 2 (20 tablet) ve 3 (30 tablet) adet blister veya 50 adet ve 100 adet tablet içeren beyaz renkli PE şişeler karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

#### **SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

**PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 25.07.2025**

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:  
05.03.2008 – 019/0081**

#### **PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

Denova İlaç San.ve Tic. Ltd.Şti.

Gürselpaşa Mah. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Cad. Aygöl Apt. No:53 A  
Seyhan/Adana

#### **ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:**

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

## **Dış Ambalaj Etiketi**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**ALBENOVA**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

### **BİLEŞİMİ**

Albenova Oral Tablet; her bir tablette 300 mg albendazol içeren beyaz veya beyaza yakın renkte ortasından çentikli tablettir.

**Ürünün kullanım amacı, şekli ve dozu hedef türler için farklılık göstermesi nedeni ile detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.**

### **GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI**

**İlaç uygulamasından sonra sığırlar 14, koyun ve keçiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, ineklerde 72 saat (6 sağım), koyun ve keçilerde 6 gün (144 saat-12 sağım) geçmeden elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.**

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

### **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Bölünmüş tabletin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 7 gündür.

### **T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:**

05.03.2008 – 019/0081

### **PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

Denova İlaç San.ve Tic. Ltd.Şti.

Gürselpaşa Mah. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Cad. Aygöl Apt. No:53 A

Seyhan/Adana

### **ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:**

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

### **SERİ NO:**

### **ÜRETİM TARİHİ:**

### **SON KULLANMA TARİHİ:**

### **KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI:**

**İç Ambalaj Etiketi (BLİSTER)**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**ALBENOVA**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

Albendazol 300 mg

DENOVA LOGO

**SERİ NO:**

**SON KULLANMA TARİHİ:**

**İç Ambalaj Etiketi (PE ŞİŞE)**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**ALBENOVA**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

**BİLEŞİMİ**

Albenova Oral Tablet; her bir tablette 300 mg albendazol içeren beyaz veya beyaza yakın renkte ortasından çentikli tablettir.

**Ürünün kullanım amacı, şekli ve dozu hedef türler için farklılık göstermesi nedeni ile detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.**

**GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI**

**İlaç uygulamasından sonra sığırlar 14, koyun ve keçiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, ineklerde 72 saat (6 sağımlık), koyun ve keçilerde 6 gün (144 saat-12 sağımlık) geçmeden elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.**

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Bölünmüş tabletin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 7 gündür.

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:**

05.03.2008 – 019/0081

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ:** Denova İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Seyhan/Adana

**ÜRETİCİ FİRMA:** Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tuzla / İstanbul

**SERİ NO:**

**ÜRETİM TARİHİ:**

**SON KULLANMA TARİHİ:**