

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Alivira Vitamin-C Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml;

Aktif madde:

Sodyum Askorbat250 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum Metabisülfid (E223) 2 mg Antioksidan Koruyucu Madde

Benzil Alkol (E1519) 15 mg Antimikrobiyal Koruyucu Madde

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Açık sarı renkli, berrak çözelti,

Enjeksiyonluk çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedi

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde:

- Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
- Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
- Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalat kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Bulunmamaktadır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Etken maddelere ve/veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla temas etmemelidir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ile iyice yıkayınız. İlacı uygulayan kişinin uygulama bitiminde ellerini ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkamalıdır. Uygulama sırasında bir şey yiyip içilmemelidir. Tütün ve tütün mamulleri içilmemelidir.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Önerilen dozlarda kullanıldığında bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

İdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Antikoagülan ilaçların mide-bağırsaklardan emilimi azaltır. Ağır metal tuzlarını içeren ilaçlarla geçimsizdir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Kas içi, deri altı veya ven içi kullanılır.

C vitamini farmakolojik dozu 10 ila 250 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz 0.04 ila 1 ml Alivira

Vitamin C/kg vücut ağırlığıdır.

Hedef tür başına ortalama:

Yetişkin sığırlar, atlar: 20 ml

Buzağılar, taylor, koyunlar, keçiler: 10 ml

Köpekler, kediler: 5 ml

Veteriner hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde tekrarlanır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Yüksek dozlarda verildiğinde diyare ve ürolitiazise neden olabilir. Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Et ve süt için (0) gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Vitaminler, askorbik asit

ATC Vet Kodu: QA11GA01

5.1 Farmakodinamik özellikler

Sodyum askorbat, hücresel seviyede oksidasyon – redüksiyon işlemlerinde hidrojen taşıyıcısı olarak görev alır. Organizmanın etkilendiği enfeksiyonlar, intoksikasyonlar, yorgunluk ve bitkinlik gibi çeşitli stres faktörlerinde direncin artırılması, bağışıklık mekanizmasının desteklenmesi ve adaptasyonun sağlanmasında önem taşır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Parenteral uygulamadan sonra hücre içi de dahil tüm vücuda yayılır. Lökosit ve trombositlerde plazma ve alyuvarlara oranla daha yoğundur. Bezli yapılarda yüksek kas ve yağ dokuda daha düşük oranda bulunur. Sodyum askorbat şeklinde vücuda giren madde dehidroaskorbik asit üzerinden oksalata çevrilir. İdrarla birlikte okzalate halinde atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Sodyum Metabisülfite (E223)

Benzil Alkol (E1519)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3 Raf ömrü

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk kullanımdan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Açılan şişeler en fazla 40 defa enjektörle delinebilir.

6.4 Muhafaza şartları

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobutil tıpalı, 100 ml amber renkli tip II cam flakonlarda, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok

No:66A İç Kapı No:8 Kartal/İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

011/1076

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

29.07.2002

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 02.01.2026

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Alivira Vitamin-C
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ:

Açık sarı renkli, berrak, steril çözeltinin her ml'si 250 mg Sodyum askorbat (Vitamin C) içerir. Antioksidan koruyucu madde olarak 2 mg Sodyum Metabisülfıt (E223), antimikrobiyal koruyucu madde olarak 15 mg Benzil Alkol (E1519) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakodinamik özellikler: Sodyum askorbat, hücresel seviyede oksidasyon – redüksiyon işlemlerinde hidrojen taşıyıcısı olarak görev alır. Organizmanın etkilendiği enfeksiyonlar, intoksikasyonlar, yorgunluk ve bitkinlik gibi çeşitli stres faktörlerinde direncin artırılması, bağışıklık mekanizmasının desteklenmesi ve adaptasyonun sağlanmasında önem taşır.

Farmakokinetik özellikler: Parenteral uygulamadan sonra hücre içi de dahil tüm vücuda yayılır. Lökosit ve trombositlerde plazma ve alyuvarlara oranla daha yoğundur. Bezli yapılarda yüksek kas ve yağ dokuda daha düşük oranda bulunur. Sodyum askorbat şeklinde vücuda giren madde dehidroaskorbik asit üzerinden oksalata çevrilir. İdrarla birlikte okzalata halinde atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde:

- Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
- Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
- Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya ven içi kullanılır.

C vitamini farmakolojik dozu 10 ila 250 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz 0.04 ila 1 ml Alivira Vitamin C/kg vücut ağırlığıdır.

Hedef tür başına ortalama:

Yetişkin Sığırlar, atlar: 20 ml

Buzağılar, taylor, koyunlar, keçiler: 10 ml

Köpekler, kediler: 5 ml

Veteriner hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde tekrarlanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalata kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Önerilen dozlarda kullanıldığında bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

İdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Antikoagülan ilaçların mide-bağırsaklardan emilimi azaltır. Ağır metal tuzlarını içeren ilaçlarla geçimsizdir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Yüksek dozlarda verildiğinde diyare ve ürolitiazise neden olabilir. Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Et ve süt için (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Etken maddelere ve/veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaçla temas etmemelidir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ile iyice yıkayınız. İlacı uygulayan kişinin uygulama bitiminde ellerini ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımlarını sabunlu su ile yıkamalıdır. Uygulama sırasında bir şey yiyip içilmemelidir. Tütün ve tütün mamulleri içilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk kullanımdan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Açılan şişeler en fazla 40 defa enjektörle delinebilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobutil tıpalı, 100 ml amber renkli tip II cam flakonlarda, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 02.01.2026**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.**

29.07.2002-011/1076

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok

No:66A İç Kapı No:8 Kartal/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Alivira Vitamin-C
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ:

Steril çözeltinin her ml'si 250 mg Sodyum askorbat (Vitamin C) içerir. Antioksidan koruyucu madde olarak 2 mg Sodyum Metabisülfid (E223), antimikrobiyal koruyucu madde olarak 15 mg Benzil Alkol (E1519) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde:

- Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
- Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
- Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya ven içi kullanılır.

C vitamini farmakolojik dozu 10 ila 250 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz 0.04 ila 1 ml Alivira Vitamin C/kg vücut ağırlığıdır.

Hedef tür başına ortalama:

Yetişkin Sığırlar, atlar: 20 ml

Buzağılar, taylor, koyunlar, keçiler: 10 ml

Köpekler, kediler: 5 ml

Veteriner hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde tekrarlanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Et ve süt için (0) gündür.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk kullanımdan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Açılan şişeler en fazla 40 defa enjektörle delinebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobutil tıpalı, 100 ml amber renkli tip II cam flakonlarda, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIđI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO.
29.07.2002–011/1076

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok
No:66A İç Kapı No:8 Kartal/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

Seri No.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Alivira Vitamin-C
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ:

Steril çözeltinin her ml'si 250 mg Sodyum askorbat (Vitamin C) içerir. Antioksidan koruyucu madde olarak 2 mg Sodyum Metabisülfid (E223), antimikrobiyal koruyucu madde olarak 15 mg Benzil Alkol (E1519) içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

At, sığır, koyun, keçi, köpek ve kedilerde:

- Solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında metabolik direncin artırılmasında,
- Ortam sıcaklığına veya diğer unsurlara bağlı stres hallerinde,
- Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi, deri altı veya ven içi kullanılır.

C vitamini farmakolojik dozu 10 ila 250 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz 0.04 ila 1 ml Alivira Vitamin C/kg vücut ağırlığıdır.

Hedef tür başına ortalama:

Yetişkin Sığırlar, atlar: 20 ml

Buzağılar, taylar, koyunlar, keçiler: 10 ml

Köpekler, kediler: 5 ml

Veteriner hekim tarafından tavsiye edildiği şekilde tekrarlanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Et ve süt için (0) gündür.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, güneş ışığından korunarak 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk kullanımdan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. Açılan şişeler en fazla 40 defa enjektörle delinebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Şeffaf flip-off kapak ve gri bromobutil tıpalı, 100 ml amber renkli tip II cam flakonlarda, karton kutu içinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

29.07.2002–011/1076

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok
No:66A İç Kapı No:8 Kartal/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

Seri No.

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi:

Fiyatı: