

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
AMPROVİD
Oral Çözelti
Veteriner Antikoksidiyal-Vitamin

BİLEŞİMİ:

AMPROVİD Oral Çözelti, koyu sarı-açık kahverengi renkli berrak çözeltinin her ml'si 240 mg Amprolyum'a eşdeğer 271,1 mg Amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

AMPROVİD Oral Çözelti'nin etkin maddesini teşkil eden Amprolyum; başlıca birinci nesil şizontlar üzerinde etkilidir, böylece merozoitlerin gelişmesini engeller. İlacın gametositler (eşeyli dönem) ve sporozoitler üzerinde kısmen etkisi vardır.

Yüksek yoğunluklarda Tiamin'in varlığında, Amprolyum'un koksidiler üzerindeki etkisi ortadan kalkar. Bu nedenle kanatlı rasyonlarında bulunan Tiamin'in, Amprolyum ile antagonizması söz konusu olur. Amprolyum, oral yolla verildikten sonra özellikle bağırsak sisteminin enfekte bölümlerinde hızlı ve tam bir emilim gösterir. Emilen Amprolyum'un hemen hemen tamamı aktif şekilde başlıca idrar ve safra yoluyla atılır.

K3 vitamini, karaciğerde protrombin sentezinin gerçekleştirilmesi ve kanın pıhtılaşması ile ilgili fonksiyonlardan sorumludur. Kanın pıhtılaşması ile ilgili yakın ilişkisi nedeniyle, koagülasyon vitamini, antihemorajik vitamin ve protrombin faktör adlarıyla da tanımlanmaktadır. Oral uygulamayı takiben sindirim kanalından emilen K3 vitamini direkt kan dolaşımına geçerek geniş ölçüde vücuda dağılır. Vücuttan idrar ve safra yoluyla atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

AMPROVİD Oral Çözelti; broiler ve yumurtacı tavuklarda Eimeria türlerinden E. tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. maxima ve E. mivati'nin neden olduğu Koksidiyosis'in sağaltılması ve korunması amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

AMPROVİD Oral Çözelti hayvanların içme sularına 120-240 mg/litre dozunda katılarak, ağız yoluyla uygulanır.

Pratik doz: 1 litre AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak, 5-7 gün süreyle uygulanır. Takip eden 7-14 gün boyunca 500 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak tedavinin devamı sağlanır.

Tekrar eden enfeksiyonları önlemek için doz 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 250 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak 1-2 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı su verilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

AMPROVİD Oral Çözelti, içme suyuna katılmadan önce su sisteminin temizce yıkanması ve suyun her türlü katkı maddesi ve kontaminasyondan arınması sağlanmalıdır.

AMPROVİD Oral Çözelti, hayvanların günlük su tüketimleri göz önünde bulundurulacak şekilde, günlük doz 2'ye bölünerek, 12 saat arayla uygulanmalıdır. Uygulama süresi önerilen süreden fazla olmamalıdır.

AMPROVİD Oral Çözelti verilen tavuklardan elde edilen yumurtalardan çıkan civcivlerin bir kısmında zayıflık görülebilir.

Damızlıklarda kuluçka randımanı olumsuz etkilenebilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Parazitlerde olduğu gibi, konakçıda da Vitamin B1 etkisini ters çevirerek Vitamin B1 yetersizliğine neden olabilir.

Önerilen dozlarda kullanıldığında yem tüketimi, ağırlık artışı ve fertilité üzerinde olumsuz etkisi yoktur.

Uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı Vitamin B1 eksikliği yapabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

- Amprolyum, vitamin B1 antagonisti olduğu için vitamin B1 içeren preparatlarla aynı anda kullanılmamalıdır.
- Amprolyum etopabat ile sinerjistikdir. Özellikle E. maxima'ya karşı etkinlik artar.
- Sülfadiazin ile sinerjistikdir. Bütün koksidia türlerine karşı etkinliği artırır.
- Amprolyum, Tiaminle (Vitamin B1) yarışmalı şekilde koksidilerin gelişmesini engelleyen veya durduran bir maddedir. Bu sebeple, yemde fazla miktarda Tiamin bulunması ilacın etkisini zayıflatır ve hatta tümüyle engelleyebilir. Etkisi, parazit metabolizmasındaki Tiamin'in taklit edilmesi esasına dayanır. Bu iki bileşik arasında yapısal yönden çok yakın bir benzerlik bulunduğundan, yüksek yoğunluklarda bulunan Amprolyum; Tiamin'in, parazit koksidilerce kullanılmasını engeller. Böylece konakçıdan daha yüksek boyutlarda Tiamin gereksinmesi olan parazit koksidilerde şiddetli bir yetersizlik baş gösterir. Sonuçta gelişme ve çoğalmaları inhibe edilen parazitler, konakçı vücudunun savunma mekanizmaları tarafından yok edilirler.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Önerilenden daha yüksek uygulanan dozlarda (500 mg/kg vücut ağırlığı ve üzerinde), polinöritislerin oluşumuna sebep olabilir.

Önerilen dozun 2 - 4 katı ve daha yüksek dozların birkaç hafta uygulanması sonucunda zayıflama, vitamin B1 noksanlığı ile bağlantılı olarak ayakta duramama, ataksi, opistotonus gibi polinöritis belirtileri görülebilir.

Farmakolojik antidotu vitamin B1'dir. 1 kg vücut ağırlığı için 1 - 10 mg dozunda yemlere veya içme sularına vitamin B1 ilavesi tavsiye olunur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Uygulama sırasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

İlaç uygulamasını takiben eller bol su ile yıkanmalıdır.

Deri ve gözlere ilaç sıçradığında hemen bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Güneş ışığından koruyarak 15-25 °C'de muhafaza ediniz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

100 ml'lik beyaz polietilen şişelerde kutulu olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 14.11.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
11.10.2011- 024/0092

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

İç Ambalaj Etiketi (100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

AMPROVİD

Oral Çözelti

Veteriner Antikoksidial – Vitamin

BİLEŞİMİ:

AMPROVİD Oral Çözelti, koyu sarı-açık kahverengi renkli berrak çözeltinin her ml'si 240 mg Amprolyum'a eşdeğer 271,1 mg Amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR:

AMPROVİD Oral Çözelti; broiler ve yumurtacı tavuklarda Eimeria türlerinden E. tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. maxima ve E. mivati'nin neden olduğu koksidyosisin sağaltılması ve korunması amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

AMPROVİD Oral Çözelti hayvanların içme sularına 120-240 mg/litre dozunda katılarak, ağız yoluyla uygulanır.

Pratik doz: 1 litre AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak, 5-7 gün süreyle uygulanır. Takip eden 7-14 gün boyunca 500 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak tedavinin devamı sağlanır.

Tekrar eden enfeksiyonları önlemek için doz 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 250 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak 1-2 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı su verilir.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları: Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Güneş ışığından koruyarak 15-25 °C'de muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

100 ml'lik beyaz polietilen şişelerde kutulu olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
11.10.2011- 024/0092

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi (100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
AMPROVİD
Oral Çözelti
Veteriner Antikoksidiyal – Vitamin

BİLEŞİMİ:

AMPROVİD Oral Çözelti, koyu sarı-açık kahverengi renkli berrak çözeltinin her ml'si 240 mg Amprolyum'a eşdeğer 271,1 mg Amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR:

AMPROVİD Oral Çözelti; broiler ve yumurtacı tavuklarda Eimeria türlerinden E. tenella, E. acervulina, E. necatrix, E. maxima ve E. mivati'nin neden olduğu koksidiyosisin sağaltılması ve korunması amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

AMPROVİD Oral Çözelti hayvanların içme sularına 120-240 mg/litre dozunda katılarak, ağız yoluyla uygulanır.

Pratik doz: 1 litre AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak, 5-7 gün süreyle uygulanır. Takip eden 7-14 gün boyunca 500 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak tedavinin devamı sağlanır.

Tekrar eden enfeksiyonları önlemek için doz 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 250 ml AMPROVİD Oral Çözelti 1000 litre içme suyuna katılarak 1-2 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı su verilir.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları: Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi (0) gündür.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Güneş ışığından koruyarak 15-25 °C'de muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

100 ml'lik beyaz polietilen şişelerde kutulu olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
11.10.2011-024/0092

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

KDV Dahil PSF: