

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

ANOREX-B

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml’de:

Aktif maddeler:

Vitamin B1 (tiamin hidroklorür).....100 mg

Vitamin B6 (piridoksin hidroklorür).....10 mg

Yardımcı maddeler:

(Antimikrobiyal koruyucu)

Benzil alkol (tiamin hidroklorür).....15 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.’e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Renksiz ya da soluk sarı renkte steril enjeksiyonluk çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, Koyun, Keçi, At, Kedi ve Köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti, aşağıda belirtilen durumlarda kullanır;

- B1 ve B6 vitaminlerinin eksikliklerinde

- B1 ve B6 vitamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve sebepsiz gibi görülen duyarlılık artışı, ışığa duyarlılık, iştah kaybı, gelişme yavaşlaması veya durması, kuru kepekli dermatit, kıl dökülmesi, lens bozuklukları, korneada vaskülarizasyon ve katarakt, yürüyüş bozuklukları, ataksi, epileptik kramplar, pareziler, genel zayıflık, periferik sinirlerde miyelin kaybı, mikrositer veya hipokromik anemi, kusma, yutma güçlüğü, rezorbsiyon bozuklukları ve sindirim sistemi mukozası bozukluğuna bağlı diyarelerde destek olarak, poliensefalomalazi oluşturan hastalıklar, rumen asidozu ve alkolozu, gastro intestinal sisteme bağlı bozukluk ve enfeksiyonların tedavisinde destek amaçlı,

- Eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Tiamine duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Parenteral vitamin B1 (tiamin hidroklorür) uygulaması sonucu anafilaktik reaksiyonlar şekillenebileceğinden 500 mg etken maddeyi aşan dozlar, yavaş ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Ven içi (IV) uygulamalarda anafilaktik şoklara daha sık rastlandığı bildirilmiştir. Anafilaktik şok durumunda, adrenalin sağaltımı yapılmalıdır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar:

-

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar: Etkin madde veya yardımcı maddelere duyarlı kişiler ürünle temas etmemelidir.

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Deriye temas halinde temas bölgesini bol su ve sabun ile yıkayınız, irritasyon devam ederse tıbbi tedavi alınız, bu ürüne ait prospektüsü doktorunuza gösteriniz.

(iii) Diğer uyarılar:

-

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Anafilaktik reaksiyonlar (öksürük, yutma güçlüğü, deride kaşıntı, yüzde şişkinlik, nefes almada güçlük vb) görülebilir. Kas içi ve deri altı yollardan yapılan uygulamalarda, enjeksiyon bölgesinde hafif irritasyon görülebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Hedef türlerde gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin antagonistidir. Amprolyum, tiamin hidroklorürün barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. İzonikotinik asit hidrazid (izoniazid) ise B6 vitamini antagonistidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti tüm hayvanlarda ven içi (IV), kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır. Günlük pratik doz;

Sığır – At: 10 – 20 ml.

Koyun-Keçi: 3 – 5 ml.

Dana – Döve: 5 – 10 ml

Kuzu -Oğlak: 1-2 ml.

Buzağı – Tay: 3- 5 ml

Köpek-Kedi: 1,5-2 ml

Klinik semptomlar kayboluncaya kadar yukarıda belirtilen dozlarda uygulanır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Çok yüksek dozlarda ven içi uygulandığında, vazodilatasyon, kan basıncında düşme, bradikardi, solunum düzensizliği veya depresyonu bildirilmiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Et ve süt için “0” sıfır gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

ATC Vet Kodu: QA11EA Grup: Vitamin B kompleksleri

5.1 Farmakodinamik özellikler

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti, vitamin B1 (tiamin hidroklorür) ile vitamin B6 (piridoksin hidroklorür) kombinasyonudur.

Vitamin B1 (tiamin hidroklorür), insan ve hayvan vücudunda ATP tarafından fosfatlanarak, tiamin difosfata dönüşür. Tiamin difosfat vücutta karbonhidratların ara metabolizmasında rol oynayan önemli bir koenzimdir. Tiamin, pirofosforik asit esteri şeklinde karbonhidrat metabolizmasına katılıp katalizör görevi yaparak aktif asetik asidin ortaya çıkmasını sağlar. Aktif asetik asit dokularda görülen pirüvik ve laktik asit birikimini ortadan kaldırarak sinirsel uyarıların iletimine katılan asetilkolinin ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Buna bağlı olarak vitamin B1 (tiamin hidroklorür) enjeksiyonundan kısa süre sonra organizmanın karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı görülür.

Vitamin B6 (piridoksin hidroklorür), hidroksillenmiş ve iki metil alkol grubu içeren bir piridin türevidir. Aminoasitlerin katabolizma ve anabolizmaları ile ilgili enzim reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite gösterir. Bu bakımdan aminoasit metabolizması ile karbonhidrat, yağ asitleri ve enerji metabolizması arasında önemli bağlantı kurar. Aynı zamanda, hemoglobinin şekillenmesi için de gereklidir.

Rumen mikroflora dengesinin bozulduğu, rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıda indigesyonlarında ve gastrointestinal enfeksiyonlarda tüm B vitaminleri gibi, B1 ve B6 vitaminlerinin sentezi de yavaşlar ya da durur.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Vitamin B1 (tiamin hidroklorür), kas içi uygulandığında hızla emilir ve birçok vücut dokusuna dağılır. Emilimi büyük ölçüde duodenum ve ince barsakların üst kısmında gerçekleşir. Vücut gereksinimi kadar olan kısmı depolanır, kalan kısmı da parçalanmış metabolitler halinde idrarla atılır.

Vitamin B6 (piridoksin hidroklorür), parenteral yolla verildikten sonra kolayca emilir ve tüm vücuda dağılır. Emilimin ardından, piridoksal fosfat ve piridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde metabolize olur. 4-piridoksik asit ve diğer inaktif metabolitlerine okside olur, idrarla atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Benzil Alkol

Sitrik asit monohidrat

Sodyum hidroksit

Disodyum EDTA

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. İlk kullanımı takiben tıpa 40 defadan fazla delinmemelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

100 ml'lik amber renkli tip 2 cam flakonlar, gri bromobutil tıpalı ve alüminyum halkalı şeffaf flip-off kapaklı şekilde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler ilgili mevzuata göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. Royal Plaza No:18/6 Kadıköy/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

22/053

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

16.03.2010

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

04.09.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ANOREX-B

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti; her ml'sinde 100 mg vitamin B1 (tiamin hidroklorür), 10 mg vitamin B6 (piridoksin hidroklorür) ve koruyucu olarak 15 mg benzil alkol içeren renksiz ya da soluk sarı renkte steril bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti, vitamin B1 (tiamin hidroklorür) ile vitamin B6 (piridoksin hidroklorür) kombinasyonudur.

Vitamin B1 (tiamin hidroklorür), insan ve hayvan vücudunda ATP tarafından fosfatlanarak, tiamin difosfata dönüşür. Tiamin difosfat vücutta karbonhidratların ara metabolizmasında rol oynayan önemli bir koenzimdir. Tiamin, pirofosforik asit esteri şeklinde karbonhidrat metabolizmasına katılıp katalizör görevi yaparak aktif asetik asidin ortaya çıkmasını sağlar. Aktif asetik asit dokularda görülen pirüvik ve laktik asit birikimini ortadan kaldırarak sinirsel uyarıların iletimine katılan asetilkolinin ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Buna bağlı olarak vitamin B1 (tiamin hidroklorür) enjeksiyonundan kısa süre sonra organizmanın karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı görülür. Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti

Vitamin B6 (piridoksin hidroklorür), hidroksillenmiş ve iki metil alkol grubu içeren bir piridin türevidir. Aminoasitlerin katabolizma ve anabolizmaları ile ilgili enzim reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite gösterir. Bu bakımdan aminoasit metabolizması ile karbonhidrat, yağ asitleri ve enerji metabolizması arasında önemli bağlantı kurar. Aynı zamanda, hemoglobinin şekillenmesi için de gereklidir.

Rumen mikroflora dengesinin bozulduğu, rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıda indigesyonlarında ve gastrointestinal enfeksiyonlarda tüm B vitaminleri gibi, B1 ve B6 vitaminlerinin sentezi de yavaşlar ya da durur.

Farmakokinetik özellikler

Vitamin B1 (tiamin hidroklorür), kas içi uygulandığında hızla emilir ve birçok vücut dokusuna dağılır. Emilimi büyük ölçüde duodenum ve ince barsakların üst kısmında gerçekleşir. Vücut gereksinimi kadar olan kısmı depolanır, kalan kısmı da parçalanmış metabolitler halinde idrarla atılır.

Vitamin B6 (piridoksin hidroklorür), parenteral yolla verildikten sonra kolayca emilir ve tüm vücuda dağılır. Emilimin ardından, piridoksal fosfat ve piridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca

karaciğerde metabolize olur. 4-piridoksik asit ve diğer inaktif metabolitlerine okside olur, idrarla atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır;

- B1 ve B6 vitaminlerinin eksikliklerinde

- B1 ve B6 vitamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve sebepsiz gibi görülen duyarlılık artışı, ışığa duyarlılık, iştah kaybı, gelişme yavaşlaması veya durması, kuru kepekli dermatit, kıl dökülmesi, lens bozuklukları, korneada vaskülarizasyon ve katarakt, yürüyüş bozuklukları, ataksi, epileptik kramplar, pareziler, genel zayıflık, periferik sinirlerde miyelin kaybı, mikrositer veya hipokromik anemi, kusma, yutma güçlüğü, rezorbsiyon bozuklukları ve sindirim sistemi mukozası bozukluğuna bağlı diyarelerde destek olarak, poliensefalomalazi oluşturan hastalıklar, rumen asidozu ve alkolozu, gastro intestinal sisteme bağlı bozukluk ve enfeksiyonların tedavisinde destek amaçlı,

- Eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti tüm hayvanlarda ven içi (IV), kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır. Günlük pratik doz;

Sığır - At: 10-20 ml. Koyun-Keçi:3-5 ml.

Dana -Düve:5-10 ml Kuzu -Oğlak:1-2 ml.

Buzağı-Tay: 3- 5 ml Köpek-Kedi:1,5-2 ml

Klinik semptomlar kayboluncaya kadar yukarıda belirtilen dozlarda uygulanır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Parenteral vitamin B1 (tiamin hidroklorür) uygulaması sonucu anafilaktik reaksiyonlar şekillenebileceğinden 500 mg etken maddeyi aşan dozlar, yavaş ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Ven içi (IV) uygulamalarda anafilaktik şoklara daha sık rastlandığı bildirilmiştir. Anafilaktik şok durumunda, adrenalin sağaltımı yapılmalıdır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı: Hedef türlerde gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Anafilaktik reaksiyonlar (öksürük, yutma güçlüğü, deride kaşıntı, yüzde şişkinlik, nefes almada güçlük vb) görülebilir. Kas içi ve deri altı yollardan yapılan uygulamalarda, enjeksiyon bölgesinde hafif irritasyon görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin antagonistidir. Amprolyum, tiamin hidroklorürün barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. İzonikotinik asit hidrazid (izoniazid) ise B6 vitamini antagonistidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Çok yüksek dozlarda ven içi uygulandığında, vazodilatasyon, kan basıncında düşme, bradikardi, solunum düzensizliği veya depresyonu bildirilmiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Tiamine duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Etkin madde veya yardımcı maddelere duyarlı kişiler ürünle temas etmemelidir.

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Deriye temas halinde temas bölgesini bol su ve sabun ile yıkayınız, irritasyon devam ederse tıbbi tedavi alınız, bu ürüne ait prospektüsü doktorunuza gösteriniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpa 40 defadan fazla delinmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler ilgili mevzuata göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 ml'lik amber renkli tip 2 cam flakonlar, gri bromobutil tıpalı ve alüminyum halkalı şeffaf flip-off kapaklı şekilde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 04.09.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
16.03.2010 – 22/053

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. Royal Plaza No:18/6 Kadıköy/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ANOREX-B

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

her ml'sinde 100 mg vitamin B1 (tiamin hidroklorür), 10 mg vitamin B6 (piridoksin hidroklorür) ve koruyucu olarak 15 mg benzil alkol içerir.

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti, B1 ve B6 vitaminlerinin eksikliklerinden kaynaklanan bozuklukların tedavisinde ve eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde kullanılır.

Tüm hayvanlarda ven içi (IV), kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır. Günlük pratik doz;

Sığır - At: 10-20 ml. Koyun-Keçi:3-5 ml.

Dana -Düve:5-10 ml Kuzu -Oğlak:1-2 ml.

Buzağı-Tay: 3- 5 ml Köpek-Kedi:1,5-2 ml

Klinik semptomlar kayboluncaya kadar yukarıda belirtilen dozlarda uygulanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonra 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpa 40 defadan fazla delinmemelidir.

100 ml'lik amber renkli tip 2 cam flakonlar, gri bromobutil tıpalı ve alüminyum halkalı şeffaf flip-off kapaklı şekilde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

16.03.2010 – 22/053

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. Royal Plaza No:18/6 Kadıköy/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İç Ambalaj Etiketi (100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ANOREX-B

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

her ml'sinde 100 mg vitamin B1 (tiamin hidroklorür), 10 mg vitamin B6 (piridoksin hidroklorür) ve koruyucu olarak 15 mg benzil alkol içerir.

Anorex-B Enjeksiyonluk Çözelti, B1 ve B6 vitaminlerinin eksikliklerinden kaynaklanan bozuklukların tedavisinde ve eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde kullanılır.

Tüm hayvanlarda ven içi (IV), kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla uygulanır.

Sığır - At: 10-20 ml. Koyun-Keçi:3-5 ml.

Dana -Düve:5-10 ml Kuzu -Oğlak:1-2 ml.

Buzağı-Tay: 3- 5 ml Köpek-Kedi:1,5-2 ml

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Et ve süt için “0” sıfır gündür.

Kullanmadan Önce Prospektüsü Okuyunuz.

100 ml'lik amber renkli tip 2 cam flakonlar, gri bromobutil tıpalı ve alüminyum halkalı şeffaf flip-off kapaklı şekilde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
16.03.2010 – 22/053

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ: ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul

ÜRETİM YERİ: ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş., Tokat

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: