ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
BEERAZ Arı Kovanı Şeridi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her bir ahşap şerit içeriği:
Aktif madde:
Amitraz 500 mg

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Arı Kovanı Şeridi
Açık sarı, sarı renkli çözelti emdirilmiş, açık sarı amber renkli ahşap şerit

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür
Bal arısı *(Apis mellifera)*

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

4.3. Kontrendikasyonlar
Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız. Amitraza dirençli kolonilerde kullanmayınız.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir. Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

(iii) Diğer uyarılar

Bulunmamaktadır.

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Uygulanamaz.

4.8. Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır. Amitrazın toksikolojik etkisi, bakır tuzlarının varlığında artmakta ve terapötik aktivitesi piperonylbutoxide varlığında azalmaktadır. Bu maddelerden herhangi birinin ürünle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çıta) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çıtaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler.

Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çıtalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çıtalar arasına; 2. Şerit ise 5. ve 6. Çıtalar arasına) uygulanır.
Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahat döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının kararsız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek[#] (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki vb. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.
Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Özel bir antidotu yoktur. Önerilen dozdan 1,5 kat yüksek dozların 8 hafta boyunca uygulanması esnasında arı ölümlerinde hafif bir yükselme görülebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte önerilen dozdan 5 kat yüksek dozların 6 hafta boyunca uygulanması, Aşırı sıcak havalarda kolonilerde salkım oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir.
Doz aşımında aşılan dozun miktarına bağlı olarak, arılarda huzursuzluk, geçici koordinasyon bozukluğu, felç, kovan terki, kovan içinde/kovan önünde ölü arılar ve koloni sönmesi görülebilir. Böyle durumlarda kovan kapağı açılarak şerit dışarıya alınmalı, kovan kapağı bir müddet açık bırakılarak kovan içi havalandırılmalı ve ana arı kontrol edilmelidir. Gerekirse uygulamaya en az bir gün ara verilmeli; kolonideki stres durumu da göz önüne alınarak uygulamaya en erken ertesi gün devam edilmelidir.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden, formamidin grubu, non-sistemik bir akarisit ve insektisittir. Etkisini oktopamin reseptörleri ile monoaminooksidaz enzimlerini inhibe etmek ve alfa-adrenerjik reseptörleri uyarmak suretiyle gösterir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler

Ksilen

Etil alkol

6.2. Geçimsizlikler
Amitraz, asitlerle geçimsizdir.

6.3. Raf ömrü
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

6.4. Muhafaza şartları
Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI
28/010

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:
26.07.2018

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
18.11.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BEERAZ

Arı Kovanı Şeridi

Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ:

Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden, formamidin grubu, non-sistemik bir akarisit ve insektisittir. Etkisini oktopamin reseptörleri ile monoaminooksidaz enzimlerini inhibe etmek ve alfa-adrenerjik reseptörleri uyarmak suretiyle gösterir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda) ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çıta) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çıtaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çıtalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çıtalar arasına; 2. Şerit ise 5. ve 6. Çıtalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık

sonrası nekahat döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının kararsız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek[#] (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki vb. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.
Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir. Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.
İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır. Amitrazın toksikolojik etkisi, bakır tuzlarının varlığında artmakta ve terapötik aktivitesi piperonylbutoxide varlığında azalmaktadır. Bu maddelerden herhangi birinin ürünle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Amitraz, asitlerle geçimsizdir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Önerilen dozdan 1,5 kat yüksek dozların 8 hafta boyunca uygulanması esnasında arı ölümlerinde hafif bir yükselme görülebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte önerilen dozdan 5 kat yüksek dozların 6 hafta boyunca uygulanması, aşırı sıcak havalarda kolonilerde salkım oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir.

Doz aşımında aşılan dozun miktarına bağlı olarak, arılarda huzursuzluk, geçici koordinasyon bozukluğu, felç, kovan terki, kovan içinde/kovan önünde ölü arılar ve koloni sönmesi görülebilir. Böyle durumlarda kovan kapağı açılarak şerit dışarıya alınmalı, kovan kapağı bir müddet açık bırakılarak kovan içi havalandırılmalı ve ana arı kontrol edilmelidir. Gerekirse uygulamaya en az bir gün ara verilmeli; kolonideki stres durumu da göz önüne alınarak uygulamaya en erken ertesi gün devam edilmelidir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR:
Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız. Amitraza dirençli kolonilerde kullanmayınız.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:
Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 18.11.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.07.2018 – 28/010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0 216 420 83 24 Faks: 0 216 415 83 37

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

İÇ ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BEERAZ

Arı Kovanı Şeridi

Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ:

Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Şeritler, prospektüste gösterildiği şekilde her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda) ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çıta) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çıtaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çıtalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çıtalar arasına; 2. Şerit ise 5. ve 6. Çıtalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahat döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının kararsız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki vb. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.

Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.
İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.07.2018 – 28/010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri Numarası:
Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:
DIŞ ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BEERAZ

Arı Kovanı Şeridi

Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ:

Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda) ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çıta) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çıtaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çıtalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çıtalar arasına; 2. Şerit ise 5. ve 6. Çıtalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahat döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının kararsız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki vb. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.

Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR: Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.
İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:
Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:
Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:
Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:
Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:
Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.07.2018 – 28/010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Albafarma Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Mevdudi Sok. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:
Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Tuzla Org. San. Böl.8.Cad. No:11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri Numarası:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF: