

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ:
BEEVARFLU

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:

Her bir ahşap şerit içeriği:

Aktif Maddeler:

Flumetrin 3,6 mg

Yardımcı Maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKLİ:

Arı Kovanı Şeridi

Açık sarı, sarı renkli çözelti emdirilmiş, açık sarı amber renkli ahşap şerit

4. KLİNİK ÖZELLİKLER:

4.1 Hedef Türler:

Bal arısı (*Apis mellifera*)

4.2 Her Bir Hedef Tür İçin Kullanım Alanı:

Beevarflu Arı Kovanı Şeridi; bal arılarında Varroosise sebep olan *Varroa destructor* adlı arı akarının teşhisi, önlenmesi ve mücadelesi amacıyla kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonları:

Önerilen kullanım şekli haricinde kullanılmaz. Geçmişte varroa için direnç göstermiş kovanlıkta kullanılmamalıdır. Bal tutumu (bal akımı) süresince uygulanmaz. Şeritleri insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirmeyiniz. Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız.

4.4 Her Bir Hedef Tür İçin Özel Uyarılar:

Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir. Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

4.5 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar

(i) Hayvanlarda Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

Uygulayıcının ilaç ile zehirlenmesi halinde, prospektüs ile birlikte hekime müracaat edilmelidir.

(iii) Diğer uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Hasarlı ambalajları kullanmayınız. Son Kullanım tarihi geçen ürünleri kullanmayınız

4.6 İstenmeyen Etkiler (sıklığı ve şiddeti)

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

4.7 Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı

Uygulanamaz.


4.8 Diğer İlaçlarla Etkileşimi Ve Diğer Etkileşim Şekilleri

Piretroitler ilaç etkinliğini artırır. Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır.

4.9 Dozaj ve Kullanım Yolu

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi için: 7-8 dolu çerçeve bulunan (genç ve küçük arı kolonisi) her bir kovana 2 şerit asılır. Büyük arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca kovanda bırakılır.

Varroosis teşhisi için: Kovan zemini temizlenir ve zemine bir kağıt serilir. Şeritler önerilen dozda 24 saat boyunca kovanda bırakılır. Süre sonunda kağıt üzerindeki ölü Varroaların varlığı teşhis ve sayısı da tespit edilir.

4.10 Doz Aşımı, Varsa Semptomlar, Acil Prosedürler, Antidotlar:

Doz Aşımı: Kış döneminde normal şerit sayısının iki katının kullanıldığı çalışmalarda, arılar üzerinde olumsuz bir etki ya da sonraki yetiştirme dönemi üzerinde de herhangi bir olumsuz etki göstermemiştir. Özel bir antidotu yoktur.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ürünün kullanıldığı zamana bakılmaksızın bal için ilaç kalıntı arınma süresi gerekli değildir.

5 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakoterapötik Grup: Lokal kullanım için Ektoparazitler (İnsektisitler dahil)

ATC Vet Kodu: QP53AC05

5.1 Farmakodinamik özellikler

“Flumetrin” Tip-II sentetik piretroid grubundan akarisit ve insektisit özellikte bir dış parazit ilacıdır. Flumetrin; parazitlerin sinir hücrelerindeki sinir impluslarının iletimi esnasında, normalde geçici olan sodyum iyonu geçirgenliğinin süresini uzatarak, sinir iletiminin durmasına ve böylece parazitin felç olmasına sebep olarak etki eder. Flumetrin; Varroanın ergin şekillerine temas yoluyla etki eder.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Deriden emilim önemsiz olacaktır kadar az miktardadır.

Toksikolojik Bilgiler: Ratlardaki akut dermal LD₅₀ değeri >2000 mg/kg canlı ağırlıktır. Laboratuvar hayvanlarında yapılan dermal ve göz iritasyon testlerinde, flumetrinin lokal iritasyon olmadığı saptanmıştır. Flumetrin %1'lik dökme çözeltiler ile yapılan lokal iritasyon testlerinde, çok hafif, geçici değişiklikler (çok zor fark edilebilir kızarıklık ya/yada kabarcık) gözlenmiş, fakat gözün mukoz membranında değişim olmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), flumetrini akut toksisitesi yönünden sınıflandırmamıştır.

Direnç: Çeşitli ülkelerde yapılan direnç testleri arasında en güncel olarak Flumetrin için bildirilen LC50 değeri 0,286 mg/litre olarak tespit edilmiştir.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Ksilen

Etil alkol

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf Ömrü:

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

6.4 Muhafaza Şartları

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

6.5 Birincil Ambalajın Niteliği Ve Kompozisyonu:

Karton kutuda, ağız kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 3,6 mg Flumetrin içeren, 200 x 20 x 0.55 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

6.6 Kullanılmamış veya Arta Kalan Ürünün İmhasına İlişkin Özel Önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI ve ADRESİ

SANTAVET İLAÇ SAN. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 28/011

9. PAZARLAMA İZNİ TARİHİ, GÜNCELLEME ve YENİLEME TARİHİ: 26.07.2018

10. SON DÜZENLEME TARİHİ:

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BEEVARFLU
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ:

Her bir ahşap şerit 3,6 mg Flumettrin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Farmakodinamik: “Flumettrin” Tip-II sentetik piretroid grubundan akarisit ve insektisit özellikte bir dış parazit ilacıdır. Flumettrin; parazitlerin sinir hücrelerindeki sinir impluslarının iletimi esnasında, normalde geçici olan sodyum iyonu geçirgenliğinin süresini uzatarak, sinir iletiminin durmasına ve böylece parazitin felç olmasına sebep olarak etki eder. Flumettrin; Varroanın ergin şekillerine temas yoluyla etki eder.

Farmakokinetik: Deriden emilim önemsenmeyecek kadar az miktardadır

Toksikolojik Bilgiler: Ratlardaki akut dermal LD50 değeri > 2000 mg/kg canlı ağırlıktır. Laboratuar hayvanlarında yapılan dermal ve göz iritasyon testlerinde, flumettrinin lokal iritan olmadığı saptanmıştır. Flumettrin %1'lik dökme çözeltiler ile yapılan lokal iritasyon testlerinde, çok hafif, geçici değişiklikler (çok zor fark edilebilir kızarıklık ya/yada kabarcık) gözlenmiş, fakat gözün mukoz membranında değişim olmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), flumettrini akut toksisitesi yönünden sınıflandırmamıştır.

Direnç: Çeşitli ülkelerde yapılan direnç testleri arasında en güncel olarak Flumettrin için bildirilen LC50 değeri 0,286 mg/litre olarak tespit edilmiştir.


KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Beevarflu Arı Kovanı Şeridi; bal arılarında Varroosis sebepli olan *Varroa destructor* adlı arı akarının teşhisi, önlenmesi ve mücadelesi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanım şekli kovani içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi için: 7-8 dolu çerçeve bulunan (genç ve küçük arı kolonisi) her bir kovana 2 şerit asılır. Büyük arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca kovanda bırakılır.

Varroosis teşhisi için: Kovan zemini temizlenir ve zemine bir kağıt serilir. Şeritler önerilen dozda 24 saat boyunca kovanda bırakılır. Süre sonunda kağıt üzerindeki ölü Varroaların varlığı teşhis ve sayısı da tespit edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir.

Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Piretroidler ilaç etkinliğini artırır. Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Doz aşımı: Kış döneminde normal şerit sayısının iki katının kullanıldığı çalışmalarda, arılar üzerinde olumsuz bir etki ya da sonraki yetiştirme dönemi üzerinde de herhangi bir olumsuz etki göstermemiştir.

Özel bir antidotu yoktur.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ürünün kullanıldığı zamana bakılmaksızın bal için ilaç kalıntı arınma süresi gerekli değildir.

KONTRENDİKASYONLAR:

Önerilen kullanım şekli haricinde kullanılmaz. Geçmişte varroa için direnç göstermiş kovaniğe kullanılmamalıdır. Bal tutumu (bal akımı) süresince uygulanmaz. Şeritleri insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirmeyiniz. Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Hasarlı ambalajları kullanmayınız. Son kullanım tarihi geçen ürünleri kullanmayınız

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:

Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

Uygulayıcının ilaç ile zehirlenmesi halinde, prospektüs ile birlikte hekime müracaat edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 3,6 mg Flumetrim içeren, 200 x 20 x 0.55 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner muayenahaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:26.07.2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NUMARASI:26.07.2018-28/011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul

Tel: 0 216 420 83 34 Fax: 0 216 415 83 37 www.santavet.com.tr

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ: Albafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 11 34959 Tuzla / İstanbul

İÇ ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BEEVARFLU
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

Bileşimi:

Her bir ahşap şerit 3,6 mg Flumetrim içerir.

Kullanım Sahası/Endikasyonlar:

Beevarflu Arı Kovanı Şeridi; bal arılarında Varroosis sebepleri olan *Varroa destructor* adlı arı akarının teşhisi, önlenmesi ve mücadelesi amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Kullanım şekli kovanı içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, prospektüste gösterildiği şekilde, her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.

Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi için: 7-8 dolu çerçeve bulunan (genç ve küçük arı kolonisi) her bir kovana 2 şerit asılır. Büyük arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca kovanda bırakılır.

Varroosis teşhisi için: Kovanı zemini temizlenir ve zemine bir kağıt serilir. Şeritler önerilen dozda 24 saat boyunca kovanda bırakılır. Süre sonunda kağıt üzerindeki ölü Varroaların varlığı teşhis ve sayısı da tespit edilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntısı Uyarıları:

İlaç Kalıntısı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ürünün kullanıldığı zamana bakılmaksızın bal için ilaç kalıntısı arınma süresi gerekli değildir.

Genel Uyarılar:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Hasarlı ambalajları kullanmayınız. Son Kullanım tarihi geçen ürünleri kullanmayınız

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

Ticari Takdim Şekli:

Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 3,6 mg Flumetrim içeren, 200 x 20 x 0.55 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

Satış Yeri ve Şartları:

Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner muayenahaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:26.07.2018-28/011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ: Albafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri Numarası

Üretim Tarihi

Son Kullanma Tarihi

DIŞ ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BEEVARFLU
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ:

Her bir ahşap şerit 3,6 mg Flumetrin içerir.


KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Beevarflu Arı Kovanı Şeridi; bal arılarında Varroosis sebepli olan *Varroa destructor* adlı arı akarının teşhisi, önlenmesi ve mücadelesi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanım şekli kovana içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi için: 7-8 dolu çerçeve bulunan (genç ve küçük arı kolonisi) her bir kovana 2 şerit asılır. Büyük arı kolonilerinde kovana 4 şerit asılabilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca kovanda bırakılır.

Varroosis teşhisi için: Kovan zemini temizlenir ve zemine bir kağıt serilir. Şeritler önerilen dozda 24 saat boyunca kovanda bırakılır. Süre sonunda kağıt üzerindeki ölü Varroaların varlığı teşhis ve sayısı da tespit edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Ürünün kullanıldığı zamana bakılmaksızın bal için ilaç kalıntı arınma süresi gerekli değildir.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Hasarlı ambalajları kullanmayınız. Son Kullanım tarihi geçen ürünleri kullanmayınız

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutuda, ağız kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 3,6 mg Flumetrin içeren, 200 x 20 x 0.55 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:26.07.2018-28/011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Albafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri Numarası

Üretim Tarihi

Son Kullanma Tarihi

KDV dahil PSF: