

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Bevitbar Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml'sinde 100 mg Vitamin B₁ (Tiamin HCl), 10 mg Vitamin B₆ (Piridoksin HCl), yardımcı madde olarak Propil gallat ve enjeksiyonluk su içeren renksiz veya hafif sarı renkli, partikülsüz, berrak steril bir çözeltidir.

Aktif Maddeler:

Vitamin B₁ (Tiamin HCl)..... 100 mg/ml

Vitamin B₆ (Piridoksin HCl).... 10 mg/ml

Yardımcı Maddeler

Propil Gallat..... 1,5 mg/ml

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef Türler

Gıda değeri olan hayvanlar: Sığır, Koyun, Keçi

Gıda değeri olmayan hayvanlar: At, Kedi, Köpek

4.2 Her Bir Hedef Tür İçin Kullanım Alanı

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B₁ (Tiamin HCl) ve Vitamin B₆ (Pridoksin HCl) eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde, bu vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanan verim kaybı, anemi, büyüme ve gelişmenin durması gibi nedenlerle oluşan kayıpların engellenmesinde, eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde, çığ balıkla beslenme ve amprolyum uygulamaları da antagonizma nedeniyle B₁ vitamini noksanlığında, merkezi ve periferik sinir sistemine bağlı bozukluklarda, travmalarda, kuru kepekli dermatit ve kıl dökülmesi gibi deri hastalıklarında ve metabolik hastalıklarda kullanılır. Ayrıca akut, subakut ve kronik enfeksiyonlarda, nekahat dönemlerinde, absorbsiyon bozukluklarında, enzootik ataksi gibi hastalıklarda, genç hayvanların gebelikleri ile yeni doğan ishallerinde, rumen asidozu ve alkolozu, gastro intestinal sisteme bağlı bozukluk ve enfeksiyonlarında ana tedaviye destekleyici olarak kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan Vitamin B₁ (Tiamin HCl)'in damar içi kullanımında nadiren de olsa anafilaktik şok oluşturduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle Vitamin B₁ (Tiamin HCl)'e duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.4 Her Bir Hedef Tür İçin Özel Uyarılar

Belirtilen doz ve periyot aşılmamalıdır. Parenteral tiamin'e karşı anafilaktik reaksiyonlar şekillenebileceğinden 500 mg etken maddeyi aşan dozlar, yavaş ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

4.5 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar

(i)Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Parenteral yollarla verildiğinde enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir irritasyon şekillenebilir.

(ii)Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Tüm uygulamalarda asepti-antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

(iii)Diğer uyarılar

Belirtilmemiştir.

4.6 İstenmeyen Etkiler (sıklık ve şiddet)

Parenteral yollarla verildiğinde enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir irritasyon şekillenebilir.

4.7 Gebelik, Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanım

Hedef türlerde gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

4.8 Diğer İlaçlarla Etkileşimi ve Diğer Etkileşim Şekilleri

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin antagonistidir. Amprolyum, tiamin'in barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. İzonicotik asit hidrazid (izoniazid) ise Vitamin B6 (Piridoksin HCl) antagonistidir.

4.9 Dozaj ve Kullanım Yolu

Tüm hedef türlerde kas içi (i.m.), deri altı (s.c.) ve yavaş damar içi (i.v.) yolla kullanılır. Kullanım amacına ve rasyon bileşimine bağlı olarak değişen oranlarda olmak üzere, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günlük dozları aşağıda belirtildiği şekildedir:

Pratik doz tablosu:

Hedef Hayvan	Canlı Ağırlık	Günlük Doz
Sığır - At	400 kg	10 - 20 ml
Dana - Düve	200 kg	5 – 10 ml
Koyun - Keçi	100 kg	2,5 - 5 ml
Kedi - Köpek	5 kg	1 -2 ml

Farmakolojik doz: Sığır, at, koyun ve keçi için 2,5-5 mg/kg canlı ağırlık B1 Vitamin, 0,25-0,5 mg /kg canlı ağırlık B6 itamin ; Kedi ve köpek için 20-40 mg/ kg canlı ağırlık Vitamin B1, 2-4 mg /kg canlı ağırlık Vitamin B6 için doz olarak hesaplanmalıdır.

Pratikte büyükbaş hayvanlar için her 10 kg canlı ağırlığa 0,25 – 0,5 ml, kedi ve köpekler için 5 kg canlı ağırlığa 1 - 2 ml ürün hesabıyla doz belirlenebilir. Yeni doğanlarda doğumdan 24 saat sonra başlanabilir. Veteriner Hekimin tavsiyesine bağlı olarak günde 1 veya 2 uygulama yapılır. Uygulama tedavi gerekli görüldüğü sürece devam edebilir.

4.10 Doz Aşımı, varsa Semptomlar, Acil Prosedürler, Antidotlar

Pratik uygulamada doz aşımı görülmez. Doz aşımı olduğu düşünülen olgularda adrenalin ve benzeri ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmalıdır.

4.11 Kalıntı Arınma Süreleri

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için kalıntı süresi ‘‘0’’ gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup: Vitaminler

ATCvet Kodu: QA11JA

5.1 Farmakodinamik Özellikler

Bileşiminde bulunan etkin maddelere ait özet farmakodinamik bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Vitamin B₁ (Tiamin HCl)

Tiamin trifosfat (TTP) adı verilen ko-enzimin yapısında yer alır. α – ketoasit (piruvik asit, α – ketoglutarik ve bağlantılı zincir α – ketoasitler) dekarboksilasyonunda rol oynar.

Gastrointestinal sistemde serbest kalan Tiamin, proximal bağırsaktan aktif ve pasif mekanizmalarda emilir. Öncelikli olarak karaciğer ve böbreklerde depolanır. Başlıca böbreklerden değişmeden atılır. Bununla birlikte insanlarda ve sıçanlarda kısmen farklı metabolitler tespit edilmiştir. Tiamin en az depolanan vitaminlerden biridir. Memelilerin vücut depoları 1 ila 2 hafta içerisinde boşalabilir. İnsanlarda ve hayvanlarda enerji metabolizmasında görevlidir.

Vitamin B₆ (Pridoksin HCl)

Vitamin B₆ tanımlaması birbiriyle ilişkili piridoksin, pridoksal, piridoksamin ve herbirinin 5’-fosfat bileşiklerini içerir.

Ruminantlar, ihtiyacı olan riboflavin miktarını rumen mikroflorasında sentezler. Ruminant olmayan türlerde kolonda mikrobiyal sentez meydana gelir. Pasif prosesle ince bağırsaklardan emilir. Vücutta çok az miktarda birikir. Emilim ve dağılım türlere göre farklılık gösterdiği bildirilmiştir. Emildikten sonra aktif formu olan NAD ve FAD’ye dönüşür. Yaklaşık olarak %70’i inaktif metaboliti olan 4-piridoksik asit olarak idrarla atılır.

5.2 Farmakokinetik Özellikler

Bileşiminde bulunan etkin maddelere ait özet farmakokinetik bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Vitamin B₁ (Tiamin HCl)

Vitamin B₁ için kinetik çalışmalar Royer-Morrot (1992) tarafından kas içi ve oral farmakolojik dozlarla yapılmıştır. 12 saat aralıklarla 250 mg oral yolla uygulama ile günlük 500 mg kas içi uygulamaların 11 günlük sonuçları karşılaştırıldığında, Vitamin B₁ plazma konsantrasyonlarının sırasıyla 7 gün ve 5,6 gün sonra kararlı hale geldiği görülmüştür. Atılım yarı ömrü ortalama 1,8 gün olarak hesaplanmıştır. Biyolojik yarı ömrü 9 ila 18 gün arasında değişmektedir.

Vitamin B₆ (Pridoksin HCl)

Çeşitli çalışmalar piridoksal fosfat’ın plazma konsantrasyonunun yaş ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yaş ilerledikçe plazma konsantrasyonu düşmektedir. Pridoksin’in ve metaboliti olan piridoksal-5’-fosfat’ın metabolizması ve doku dağılımının yaş ile bağlantılı değişiklikleri sıçanlarda yapılan çalışmalarda rapor edilmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı Maddeler

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin antagonistidir. Amprolyum, tiamin'in barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. İzonikotik asit hidrazid (izoniazid) ise Vitamin B6 (Piridoksin HCl) antagonistidir.

6.3 Raf Ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün
İlaçlı içme suyunun raf ömrü: Geçerli değildir.

6.4 Muhafaza Şartları

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. İlk kullanımı takiben tıpanın 24 defadan fazla delinmemesi önerilir.

6.5 Birincil Ambalajın Niteliği ve Kompozisyonu

Karton kutu içinde 100 ml amber renkli Tıp I cam şişelerde, gri bromobutil tıpa ve mavi flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya Arta Kalan Ürünün İmhasına İlişkin Özel Önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI 27 / 059

9. PAZARLAMA İZNİ (İLK VERİLME) TARİHİ : 08.05.2017

10. METİN DEĞİŞİKLİĞİ TARİHİ 29.12.2025

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
BEVİTBAR
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya hafif sarı renkli, partikülsüz, berrak ve steril bir çözelti olup 1 ml'sinde; 100 mg Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve 10 mg Vitamin B6 (Piridoksin HCl), yardımcı madde olarak Propil gallat ve enjeksiyonluk su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti; B grubu vitaminlerden Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve Vitamin B6 (Piridoksin HCl) kombinasyonudur.

Vitamin B1 (Tiamin HCl), suda çözünen ve karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan ve eksildiğinde ciddi neuro-musküler belirtilere neden olan pirimidin ve tiyazol çekirdeğinden oluşan organik bir maddedir ve tiamin hidroklorür olarak bulunur. Oral ve kas içi uygulamada hızla emilim gösterir. Geniş bir şekilde birçok vücut dokusuna yayılır. Değişmemiş olarak veya metabolitleri olarak idrarla vücuttan atılır.

Vitamin B6 (Piridoksin HCl), suda çözünen vitaminlerden olan piridoksin, aminoasit metabolizmasının şekillenmesi için gereklidir. Ağızdan verilen piridoksin hızla emilerek aktif form olan piridoksal fosfat ve piridoksamın fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde metabolize olarak 4-piridoksik asid ve diğer inaktif metabolitlerine okside olarak idrarla atılır.

Rumen mikroflora dengesinin bozulduğu, rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıda indigesyonlarında ve mide bağırsak sistemi enfeksiyonlarında tüm B vitaminleri gibi, B1 ve B6 vitaminlerinin sentezi de yavaşlar ya da durur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti: sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve Vitamin B6 (Piridoksin HCl) eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde, bu vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanan verim kaybı, anemi, büyüme ve gelişmenin durması gibi nedenlerle oluşan kayıpların engellenmesinde, eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde, çığ balıkla beslenme sonrası oluşan B vitamini eksikliklerinde ve amprolyum uygulamaları sonrasında oluşabilecek antagonizmalar nedeniyle muhtemel B1 vitamini noksanlığında, merkezi ve periferik sinir sistemine bağlı bozukluklarda, travmalarda, kuru kepekli dermatit ve kıl dökülmesi gibi deri hastalıklarında ve metabolik hastalıkların tedavisinde veya tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Ayrıca akut, subakut ve kronik enfeksiyonlarda, nekahat dönemlerinde, sindirim bozukluklarında, enzootik ataksi gibi hastalıklarda, genç hayvanların gebelikleri ile yeni doğan ishallerinde, rumen asidozu ve alkolozu, mide bağırsak sistemine bağlı bozukluk ve enfeksiyonlarında ana tedaviye destekleyici olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef türlerde kas içi (i.m.), deri altı (s.c.) ve yavaş damar içi (i.v.) yolla kullanılır.

Kullanım amacına ve rasyon bileşimine bağlı olarak değişen oranlarda olmak üzere, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günlük dozları aşağıda belirtildiği şekildedir:

Pratik doz tablosu:

Hedef Hayvan	Canlı Ağırlık	Günlük Doz
Sığır - At	400 kg	10 - 20 ml
Dana - Düve	200 kg	5 – 10 ml
Koyun - Keçi	100 kg	2,5 - 5 ml
Kedi - Köpek	5 kg	1 -2 ml

Farmakolojik doz: Sığır, at, koyun ve keçi için 2,5-5 mg/kg canlı ağırlık B₁ Vitamin, 0,25-0,5 mg /kg canlı ağırlık B₆ vitamin ; Kedi ve köpek için 20-40 mg/ kg canlı ağırlık Vitamin B₁, 2-4 mg /kg canlı ağırlık Vitamin B₆ için doz olarak hesaplanmalıdır.

Pratikte büyükbaş hayvanlar için her 10 kg canlı ağırlığa 0,25 – 0,5 ml, kedi ve köpekler için 5 kg canlı ağırlığa 1 - 2 ml ürün hesabıyla doz belirlenebilir. Yeni doğanlarda doğumdan 24 saat sonra başlanabilir. Veteriner Hekimin tavsiyesine bağlı olarak günde 1 veya 2 uygulama yapılır. Uygulama tedavi gerekli görüldüğü sürece devam edebilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Belirtilen doz ve periyot aşılmamalıdır. Parenteral tiamin'e karşı anafilaktik reaksiyonlar şekillenebileceğinden 500 mg etken maddeyi aşan dozlar, yavaş ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. **Gebelik ve laktasyonda kullanım:** Hedef türlerde gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Parenteral yollarla verildiğinde enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir iritasyon şekillenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin antagonistidir. Amprolyum, tiamin'in barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. İzonicotinik asit hidrazid (izoniazid) ise Vitamin B6 (Piridoksin HCl) antagonistidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Pratik uygulamada doz aşımı görülmez. Doz aşımı olduğu düşünülen olgularda adrenalin ve benzeri ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için kalıntı süresi "0" (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bileşiminde bulunan Vitamin B1 (Tiamin HCl)'in damar içi kullanımda nadiren de olsa anafilaktik şok oluşturduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle Vitamin B1 (Tiamin HCl)'e duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Tüm uygulamalarda asepsi-antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpanın 24 defadan fazla delinmemesi önerilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 100 ml amber renkli Tip I cam şişelerde, gri bromobutil tıpa ve mavi flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.12.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
08.05.2017-27/059

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San.ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

ARİON İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 12. Cadde No : 8
34959 Tepeören – Tuzla / İstanbul

Dış Ambalaj Etiket (100 ml):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
BEVİTBAR
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya hafif sarı renkli, partikülsüz, berrak ve steril bir çözelti olup 1 ml'sinde; 100 mg Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve 10 mg Vitamin B6 (Piridoksin HCl) yardımcı madde olarak Propil gallat ve enjeksiyonluk su içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti: sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve Vitamin B6 (Piridoksin HCl) eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef türlerde kas içi (i.m.), deri altı (s.c.) ve yavaş damar içi (i.v.) yolla kullanılır. Kullanım amacına ve rasyon bileşimine bağlı olarak değişen oranlarda olmak üzere, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; günlük dozları aşağıda belirtildiği şekildedir:

Pratik doz tablosu:

Hedef Hayvan	Canlı Ağırlık	Günlük Doz
Sığır - At	400 kg	10 - 20 ml
Dana - Düve	200 kg	5 - 10 ml
Koyun - Keçi	100 kg	2,5 - 5 ml
Kedi - Köpek	5 kg	1 -2 ml

Pratikte büyükbaş hayvanlar için her 10 kg canlı ağırlığa 0,25 – 0,5 ml, kedi ve köpekler için 5 kg canlı ağırlığa 1 - 2 ml ürün hesabıyla doz belirlenebilir. Yeni doğanlarda doğumdan 24 saat sonra başlanabilir. Veteriner Hekimin tavsiyesine bağlı olarak günde 1 veya 2 uygulama yapılır. Uygulama tedavi gerekli görüldüğü sürece devam edebilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için kalıntı süresi “0” (sıfır) gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpanın 24 defadan fazla delinmemesi önerilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde 100 ml amber renkli Tip I cam şişelerde, gri bromobutil tıpa ve mavi flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
08.05.2017-27/059

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San.ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

ARİON İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) 12. Cadde No : 8
34959 Tepeören – Tuzla / İstanbul

Seri no :
Üretim tarihi :
Son kullanma tarihi :
KDV dahil Perakende Satış Fiyatı :

İç Ambalaj Etiket (100 ml):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
BEVİTBAR
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti, renksiz veya hafif sarı renkli, partikülsüz, berrak ve steril bir çözelti olup 1 ml'sinde; 100 mg Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve 10 mg Vitamin B6 (Piridoksin HCl) yardımcı madde olarak Propil gallat ve enjeksiyonluk su içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

BEVİTBAR Enjeksiyonluk Çözelti: sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B1 (Tiamin HCl) ve Vitamin B6 (Piridoksin HCl) eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef türlerde kas içi (i.m.), deri altı (s.c.) ve yavaş damar içi (i.v.) yolla kullanılır. Pratikte büyükbaş hayvanlar için her 10 kg canlı ağırlığa 0,25 – 0,5 ml, kedi ve köpekler için 5 kg canlı ağırlığa 1 - 2 ml ürün hesabıyla doz belirlenebilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için kalıntı süresi “0” (sıfır) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpanın 24 defadan fazla delinmemesi önerilir.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
08.05.2017-27/059

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören - Tuzla / İstanbul

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

ARİON İlaç San. Tic. A.Ş. Tepeören – Tuzla / İstanbul

Seri no :
Üretim tarihi :
Son kullanma tarihi :