ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 ml'de;

Aktif madde:
Sefkuinom 25 mg
(Sefkuinoma eşdeğer Sefkuinom sülfat)

Yardımcı maddeler:
Koruyucu:
Benzil alkol (E1519) 10 mg

Tam liste için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Beyaz - krem renkli, steril, yağlı bir süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür
Sığır

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığırlarda sefkuinoma duyarlı gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica'*nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları
- Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital necrobacillosis (ayak çürüğü).
- Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi
- Buzağılarda *E. coli* septisemisinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar
Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanmayınız.
İnsanlara antimikrobiyal direncin yayılması riski nedeniyle tavuklarda (yumurta dahil) kullanmayınız.
Vücut ağırlığı 1.25 kg'dan az olan hayvanlara uygulamayınız.
Sefalosporinlere, β-laktam antibiyotiklere ve / veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanmayınız.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Ürünün uygun olmayan kullanımı, sefkuinom'a dirençli bakterilerin prevalansını arttırabilir ve çapraz direnç potansiyeli nedeniyle beta laktam antibiyotikleri ile tedavinin etkinliğini azaltabilir. Mümkün olduğunca ürün duyarlılık testine göre kullanılmalıdır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Allerjik reaksiyon oluşması halinde, tedavi durdurulmalıdır.
Geniş spektrumlu beta-laktamaz taşıyan bakterilerin dirençli suşlarında kullanılır ve bu suşların yiyecek vb. yollarla insanlara bulaşması, insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Bu sebeple ürün, tedaviye istenilen cevabı vermeyen klinik vakalarda ya da ilk tedaviye (bakteriyel tanı yapılmadan tedaviye başlanması gereken perakut vakalarda) iyi cevap vermesi beklenmeyen durumlarda kullanılmalıdır. Ürünün uygun olmayan kullanımı, Sefkuinoma dirençli bakteri prevalansını artırabilir ve çapraz direnç potansiyeline sahip olduğu için diğer beta laktam antibiyotiklerin etkinliği azaltabilir.
Ürün kullanılacağı zaman resmi, ulusal ve bölgesel antimikrobiyal ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Belirtilen kullanma talimatı dışına çıkmak da dahil, aşırı kullanımı, direnç oluşumunu arttırabilir. Mümkünse, ürünü sadece duyarlı testlerin sonuçlarına göre kullanınız.
Hayvanların bireysel tedavisi için tasarlanmıştır. Hastalık önleme veya sürü sağlığı programlarının bir parçası olarak kullanılmamalıdır.
Hayvan gruplarının tedavisi, onaylanmış kullanım koşullarına göre devam etmekte olan hastalık salgınlarıyla kesinlikle sınırlı olmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Penisilin ve sefalosporinler enjeksiyon, soluma, yutma veya deri teması sonrası aşırı duyarlılığa sebep olabilirler. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık, sefalosporinlere karşı çapraz duyarlılık oluşturabilir ve aynı zamanda tam tersi de geçerlidir. Bu maddelere karşı oluşan alerjik reaksiyonlar bazı durumlarda ciddi seyredebilir. Duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Sefalosporinler ve diğer β-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız. Gerekli tüm önlemleri alarak ve ürüne maruz kalmayacak şekilde dikkatlice kullanılmalıdır. İlaca maruz kaldıktan sonra deride kızarıklık gibi semptomlar şekilleniyorsa ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurunuz. Yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtiler daha ciddi semptomlardır ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

(iii) Diğer uyarılar
Yoktur.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Veteriner Tıbbi ürünün kullanımı lokal doku reaksiyonlarına neden olabilir. Doku lezyonları, ürünün uygulanmasından 15 gün sonra iyileşir. Nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Laboratuvar hayvanlarında yapılan çalışmalar, teratojenite, abort ve reprodüksiyon üzerine etkiler göstermese de, ürünün gebe ineklerde güvenilir kullanımı araştırılmamıştır. Sadece veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine göre gebelikte kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Çeşitli Sefalosporinler ve diğer β-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık vardır.
İstenmeyen farmakodinamik etkileşim nedeniyle, sefkuinomu bakteriyostatik etkili farmasötik maddeler ile eş zamanlı kullanmayınız. Sefalosporinler ve diğer β-laktam antibiyotikler ile aminoglikozidler arasında sinerjik etki söz konusudur.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Türler	Endikasyon	Dozaj	Sıklık
Sığır	*Pasteurella multocida* ve *M. haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozis (ayak çürüğü)	1 mg sefkuinom / kg vücut ağırlığı (2 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.
	Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi	1 mg sefkuinom /kg vücut ağırlığı (2 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Art arda 2 gün boyunca günde bir kez
Buzağı	*E. coli* septisemisi	2 mg sefkuinom /kg vücut ağırlığı (4 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.

Tüm uygulamalar kas içi olarak yapılmalıdır. Çalışmalar, ikinci ve ardışık enjeksiyonların farklı enjeksiyon bölgelerine yapılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Tercih edilen enjeksiyon bölgesi orta boyun kas dokusudur.
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Doğru dozu sağlamak amacıyla, doz aşımından kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca iyi hesaplanmalıdır.

Uygulama esnasında kuru ve steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır. Gerekli doz hacminin doğru bir şekilde verilmesine izin vermek için uygun şekilde derecelenmiş bir şırınga kullanılmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Sığırlarda 20 mg / kg /gün doz aşımı iyi şekilde tolere edilmiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Sistemik Kulllanım İçin Antibakteriyeller, Dördüncü Kuşak Sefalosporinler
ATC Vet Kodu: QJ01DE90

5.1 Farmakodinamik özellikler
Sefkuinom bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki eden 4. kuşak sefalosporin grubu bir antibakteriyel ilaçtır. Bakterisidal etkilidir. Betalaktamlar bakteri hücre duvarı sentezine müdahale ederek etki gösterir. Hücre duvarı sentezi penisilin bağlayıcı proteinler olarak isimlendirilen enzimlere bağımlıdır. Bakteriler sefalosporinlere 4 temel mekanizma ile direnç

geliştirir; 1) Penisilin bağlayıcı proteinleri duyarsız hale getirerek, 2) Hücre duvarının betalaktam geçirgenliğini değiştirerek, 3) Betalaktam halkasının bölünmesini sağlayan betalaktamaz üreterek, 4) Aktif efflux.
Gram negatif enterik organizmalarda bulunan bazı betalaktamazlar, birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler, betalaktam inhibe edici kombinasyonlar, penisilinler, ampisilinler ve üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinlerin MIC değerlerini değişken miktarda yükseltebilmektedir.
Geniş terapötik spektrum aktivitesi ve penisilinazlara ve betalaktamazlara karşı yüksek stabilitesiyle karakterizedir. *Escherichia coli, Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Serratia marcenscens, Histophilus somni, Trueperella pyogenes, Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *Prevotella* spp. (*Bacterioides* spp.), *Actinobacillus* spp. ve *Erysipelothrix rhusiopathiae*'yi de içeren Gram pozitif ve Gram negatif bakteri grubuna karşı *in vitro* etkinliği kanıtlanmıştır.

Önceki nesil sefalosporinlerin aksine, sefkuinom, Amp-C tipi kromozomal kodlanmış sefalosporinazlar veya bazı enterobakteriyel türlerin plasmid aracılı sefalosporinazları tarafından hidrolize edilmez. Bununla birlikte, bazı genişletilmiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL), diğer nesil sefalosporinleri ve sefkuinomu hidrolize edebilir. Sefkuinoma karşı direnç geliştirme potansiyeli oldukça düşüktür.
Sefkuinoma üst düzey direnç, iki genetik değişikliğin tesadüfini, yani belirli ß-laktamazların hiperproduksiyonunun yanı sıra zar geçirgenliğinin azalmasını gerektirecektir.

5.2 Farmakokinetik özellikler
Sığırlarda, 1 mg / kg dozda kas içi uygulamadan sonra 1.5-2 saat içinde yaklaşık 2 µg/ml pik serum konsantrasyonuna, ulaşmıştır. Sefkuinom, nispeten kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir (2.5 saat), <%5 proteinlere bağlanır ve idrarla değişmeden atılmaktadır. Sefkuinom, oral uygulama sonrası emilime uğramamaktadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Benzil alkol (E 1519)
Propilen glikol dikaprilokaprat
Stearik asit
Etil oleat

6.2 Geçimsizlikler
Uyumluluk çalışmalarının yokluğu sebebiyle Cefquivet %2.5, başka veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: İlk dozun çekilmesinden itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.
Tıpa 30 kezden fazla delinmemelidir.

6.4 Muhafaza şartları
Kendi ambalajında, 25 ^{o}C'nin altında, oda sıcaklığında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon; karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmayan veteriner tıbbi ürünler ve bu ürünlerden kalan atıklar yerel kurallara göre yok edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15 Küçükçekmece / İSTANBUL
info@mbv.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:24.11.2026-033/0043

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

İÇ - DIŞ AMBALAJ METNİ, PROSPEKTÜS METNİ

Prospektüs:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Cefquivet %2.5

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Beyaz - krem renkli, steril, yağlı bir süspansiyon olan Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon her ml'sinde 25 mg sefkuinoma eşdeğer sefkuinom sülfat ve koruyucu olarak 10 mg benzil alkol (E1519) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Sefkuinom bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki eden 4. kuşak sefalosporin grubu bir antibakteriyel ilaçtır. Bakterisidal etkilidir. Betalaktamlar bakteri hücre duvarı sentezine müdahale ederek etki gösterir. Hücre duvarı sentezi penisilin bağlayıcı proteinler olarak isimlendirilen enzimlere bağımlıdır. Bakteriler sefalosporinlere 4 temel mekanizma ile direnç geliştirir; 1) Penisilin bağlayıcı proteinleri duyarsız hale getirerek, 2) Hücre duvarının betalaktam geçirgenliğini değiştirerek, 3) Betalaktam halkasının bölünmesini sağlayan betalaktamaz üreterek, 4) Aktif efflux.

Gram-negatif enterik organizmalarda bulunan bazı betalaktamazlar, birinci ve ikinci kuşak sefalosporinler, betalaktam inhibe edici kombinasyonlar, penisilinler, ampisilinler ve üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinlerin MIC değerlerini değişken miktarda yükseltebilmektedir.

Geniş terapötik spektrum aktivitesi ve penisilinazlara ve betalaktamazlara karşı yüksek stabilitesiyle karakterizedir. *Escherichia coli, Citrobacter* spp., *Klebsiella* spp., *Pasteurella* spp., *Proteus* spp., *Salmonella* spp., *Serratia marcenscens, Histophilus somni, Trueperella pyogenes, Bacillus* spp., *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp., *Prevotella* spp. (*Bacterioides* spp.), *Actinobacillus* spp. ve *Erysipelothrix rhusiopathiae*'yi de içeren Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteri grubuna karşı *in vitro* etkinliği kanıtlanmıştır.

Önceki nesil sefalosporinlerin aksine, sefkuinom, Amp-C tipi kromozomal kodlanmış sefalosporinazlar veya bazı enterobakteriyel türlerin plasmid aracılı sefalosporinazları tarafından hidrolize edilmez. Bununla birlikte, bazı genişletilmiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL), diğer nesil sefalosporinleri ve sefkuinomu hidrolize edebilir. Sefkuinoma karşı direnç geliştirme potansiyeli oldukça düşüktür.

Sefkuinoma üst düzey direnç, iki genetik değişikliğin tesadüfini, yani belirli ß-laktamazların hiperproduksiyonunun yanı sıra zar geçirgenliğinin azalmasını gerektirecektir.

Farmakokinetik özellikler

Sığırlarda, 1 mg / kg dozda kas içi uygulamadan sonra 1.5-2 saat içinde yaklaşık 2 µg/ml pik serum konsantrasyonuna, ulaşmıştır. Sefkuinom, nispeten kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir (2.5 saat), <%5 proteinlere bağlanır ve idrarla değişmeden atılmaktadır. Sefkuinom, oral uygulama sonrası emilime uğramamaktadır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığırlarda sefkuinoma duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

- *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica'*nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları,

- Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital necrobacillosis (ayak çürüğü).
- Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi,
- Buzağılarda *E. coli* septisemisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Türler	Endikasyon	Dozaj	Sıklık
Sığır	*Pasteurella multocida* ve *M. haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozis (ayak çürüğü)	1 mg sefkuinom / kg vücut ağırlığı (2 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.
	Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi	1 mg sefkuinom /kg vücut ağırlığı (2 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Art arda 2 gün boyunca günde bir kez
Buzağı	*E. coli* septisemisi	2 mg sefkuinom /kg vücut ağırlığı (4 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.

Tüm uygulamalar kas içi olarak yapılmalıdır. Çalışmalar, ikinci ve ardışık enjeksiyonların farklı enjeksiyon bölgelerine yapılmasının uygun olduğunu belirtmiştir. Tercih edilen enjeksiyon bölgesi orta boyun kas dokusudur.
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Doğru dozu sağlamak amacıyla, doz aşımından kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca iyi hesaplanmalıdır.
Uygulama esnasında kuru ve steril iğne ve enjektör kullanılmalıdır. Gerekli doz hacminin doğru bir şekilde verilmesine izin vermek için uygun şekilde derecelenmiş bir şırınga kullanılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Geniş spektrumlu beta-laktamaz taşıyan bakterilerin dirençli suşlarında kullanılır ve bu suşların yiyecek vb. yollarla insanlara bulaşması, insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Bu sebeple ürün, tedaviye istenilen cevabı vermeyen klinik vakalarda ya da ilk tedaviye (bakteriyel tanı yapılmadan tedaviye başlanması gereken perakut vakalarda) iyi cevap vermesi beklenmeyen durumlarda kullanılmalıdır.
Ürünün uygun olmayan kullanımı, sefkuinom'a dirençli bakterilerin prevalansını arttırabilir ve çapraz direnç potansiyeli nedeniyle beta laktam antibiyotikleri ile tedavinin etkinliğini azaltabilir.
Ürün kullanılacağı zaman resmi, ulusal ve bölgesel antimikrobiyal ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. Belirtilen kullanma talimatı dışına çıkmak da dahil, aşırı kullanımı, direnç oluşumunu arttırabilir. Mümkün olduğunca ürün duyarlılık testine göre kullanılmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım

Laboratuvar hayvanlarında yapılan çalışmalar, teratojenite, abort ve reprodüksiyon üzerine etkiler göstermese de, ürünün gebe ineklerde güvenilir kullanımı araştırılmamıştır. Sadece veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesine göre gebelikte kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Veteriner tıbbi ürünün kullanımı lokal doku reaksiyonlarına neden olabilir. Doku lezyonları, ürünün uygulanmasından 15 gün sonra iyileşir. Nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Çeşitli sefalosporinler ve diğer β-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık vardır.
İstenmeyen farmakodinamik etkileşim nedeniyle, sefkuinomu bakteriyostatik etkili farmasötik maddeler ile eş zamanlı kullanmayınız. Sefalosporinler ve diğer β-laktam antibiyotikler ile aminoglikozidler arasında sinerjik etki söz konusudur. Uyumluluk çalışmalarının yokluğu sebebiyle Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon, başka veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Sığırlarda 20 mg / kg /gün doz aşımı iyi şekilde tolere edilmiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Aktif maddeye karşı aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanmayınız.
Vücut ağırlığı 1.25 kg'dan az olan hayvanlara uygulamayınız.
Sefalosporinlere, β-laktam antibiyotiklere ve / veya bileşimindeki yardımcı maddelere karşı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
İlaçla temastan kaçınılmalı ve ilaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Sefalosporinler ve β-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız. Sefalosporin ve penisilinlere duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Penisilin ve sefalosporinler enjeksiyon, soluma, yutma veya deri teması sonrası aşırı duyarlılığa sebep olabilirler. Penisilinlere karşı aşırı duyarlılık, sefalosporinlere karşı çapraz duyarlılık oluşturabilir ve aynı zamanda tam tersi de geçerlidir. Bu maddelere karşı oluşan alerjik reaksiyonlar bazı durumlarda ciddi seyredebilir. Duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Gerekli tüm önlemleri alarak ve ürüne maruz kalmayacak şekilde dikkatlice kullanılmalıdır. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile birlikte doktora başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, 25 ^{o}C'nin altında, oda sıcaklığında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Tıpa 30 kezden fazla delinmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmayan veteriner tıbbi ürünler ve bu ürünlerden kalan atıklar yerel kurallara göre yok edilmelidir. İnsanlara antimikrobiyal direncin yayılması riski nedeniyle tavuklarda (yumurta dahil) kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 24.11.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 24.11.2026-033/0043
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15 Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

İç Ambalaj etiketi (50 ml için):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Cefquivet %2.5
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Her ml'de 25 mg sefkuinoma eşdeğer sefkuinom sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Sığırlarda sefkuinoma duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Kas içi olarak *Pasteurella multocida* ve *M. haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı, dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozisde (ayak çürüğü) ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez ve sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisinde art arda 2 gün boyunca günde bir kez; 50 kg vücut ağırlığına 2 ml uygulanır. Buzağılarda *E. coli* septisemisinde ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez 50 kg vücut ağırlığına 4 ml uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kendi ambalajında, 25ºC'nin altında, oda sıcaklığında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.
Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 24.11.2026-033/0043
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükçekmece / İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Seri No: **Üretim Tarihi:** **Son Kullanma Tarihi:**

İç Ambalaj etiketi (100 ml için):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Cefquivet %2.5
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Her ml'de 25 mg sefkuinoma eşdeğer sefkuinom sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığırlarda sefkuinoma duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica'*nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları
- Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital necrobacillosis (ayak çürüğü).
- Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi
- Buzağılarda *E. coli* septisemisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Kas içi olarak *Pasteurella multocida* ve *M. haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı, dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozisde (ayak çürüğü) ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez ve sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisinde art arda 2 gün boyunca günde bir kez; 50 kg vücut ağırlığına 2 ml uygulanır. Buzağılarda *E. coli* septisemisinde ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez 50 kg vücut ağırlığına 4 ml uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kendi ambalajında, 25ºC'nin altında, oda sıcaklığında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 24.11.2026-033/0043

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No: **Üretim Tarihi:** **Son Kullanma Tarihi:**

Dış Ambalaj etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Cefquivet %2.5
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Her ml'de 25 mg sefkuinoma eşdeğer sefkuinom sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Cefquivet %2.5 Enjeksiyonluk Süspansiyon sığırlarda sefkuinoma duyarlı Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
- *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica'*nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları
- Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital necrobacillosis (ayak çürüğü).
- Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi
- Buzağılarda *E. coli* septisemisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Kas içi olarak aşağıda belirtilen doz ve sürelerde uygulanır.

Türler	**Endikasyon**	**Dozaj**	**Sıklık**
Sığır	*Pasteurella multocida* ve *M. haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi hastalığı Dijital dermatitis, bulaşıcı bulber nekrozis ve akut interdigital nekrobasillozis (ayak çürüğü)	1 mg sefkuinom / kg vücut ağırlığı (2 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.
	Sistemik semptomlar ile birlikte seyreden akut *E. coli* mastitisi	1 mg sefkuinom /kg vücut ağırlığı (2 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Art arda 2 gün boyunca günde bir kez
Buzağı	*E. coli* septisemisi	2 mg sefkuinom /kg vücut ağırlığı (4 ml/50 kg vücut ağırlığı)	Ardışık 3-5 gün süresince günde bir kez uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 1 gün (2 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında, 25 ºC'nin altında, oda sıcaklığında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Tıpa 30 kezden fazla delinmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
24.11.2026-033/0043
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15
34307 Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3
59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No: **Üretim Tarihi:** **Son Kullanma Tarihi:**

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):