

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

COBEMİX Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 ml’de:

Aktif madde:

Vitamin B ₁ (Thiamin HCl)	5 mg,
Vitamin B ₂ (Riboflavin 5-Sodyum fosfat)	2 mg,
Vitamin B ₃ (Niasinamid)	20 mg,
Vitamin B ₅ (D-panthenol)	10 mg,
Vitamin B ₆ (Piridoksin HCl)	2 mg,
Vitamin B ₁₂ (Siyanokobalamin)	0,004 mg

Yardımcı maddeler:

Metil Paraben	1 mg (Antimikrobiyal koruyucu)
Propil Paraben	0,1 mg (Antimikrobiyal koruyucu)
Propil Gallat.....	0,5 mg (Antioksidan koruyucu)
Benzil Alkol.....	5,67 mg (Antimikrobiyal koruyucu)

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.’e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Turuncu-sarı renkli, berrak görünümlü sulu bir enjeksiyonluk çözeltilidir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde görülen gıdaya bağlı indigesyonlarda, enfeksiyöz hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan indigesyonlarda, iştahsızlık, gelişmede yavaşlama, sindirim sistemi florasının bozulmasına neden olan antibakteriyel uygulamalarda, paraziter salgınlarda, asıl tedaviyi destekleyici olarak, formülasyondaki vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanan deri, kas ve sinir hastalıklarında, çeşitli stres durumlarında, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Tiaminin damar içi yolla kullanımında anafilaktik şok oluşabilir. Bu gibi durumlarda adrenalin ve benzeri ilaçlarla sağaltım yapılmalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Damar içi (IV) kullanmayınız.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Vitamin B₁ özellikle atlarda damar içi uygulandığında anaflaktik şok oluşabileceğinden, bu uygulamadan kaçınılmalıdır. Zorunlu hallerde enjeksiyonluk su ile sulandırılıp, çok yavaş şekilde uygulanmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı bilinen alerjisi olan kişiler ilacı dikkatle uygulamalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Kas içi (IM) ve deri altı (SC) yollarla verildiğinde enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir iritasyon şekillenebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebe hayvanlara uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Neuromuskuler blokaj yapan ilaçlar, alkali, ağır metal tuzları, oksidan ve redüktörler, civa, iyot ve demir tuzları, sodyum bikarbonat infüzyonu, Askorbik asit ile geçimsizlikleri nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır. Ampisilin, amikasin, kloksasilin, klindamisin, kloramfenikol, karbenisilin, linkomisin, nafsilin, novobiosin, oksasilin, tetrasiklinler, sefalotin, streptomisin, vankomisinler; vitamin B kompleksi ile geçimsiz olduklarından aynı enjektörle uygulanmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

COBEMİX Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, deri altı (S.C.) veya kas içine (İ.M.) uygulanır.

Pratik doz tablosu

Hayvan Türü	Verilecek Miktar (ml)
Sığır, Manda, At	15-30 ml
Dana, Düve, Malak	10-15 ml
Buzağı, Tay	5-10 ml
Koyun, Keçi	5-10 ml
Kuzu, Oğlak	3-5 ml
Köpek	1-5 ml
Kedi	1 ml

Hedef hayvan türlerinde öngörülen etkilerin elde edilebilmesi ve klinik belirtilerin tümüyle düzeltilebilmesi için seçilen bir defalık sağaltım dozları günde 1-2 kez tekrarlanmak üzere, gerekli görüldüğü sürece ilaç uygulamalarına devam edilir.

Tıpa, ilk kullanımı takiben 50 defadan fazla delinmemelidir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Bulunmamaktadır.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra et ve süt 0 (sıfır) gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Vitamin B kompleksi ve kombinasyonları

ATCvet kodu: QA11EA

5.1 Farmakodinamik Özellikler

B kompleks vitaminlerden oluşan **COBEMİX Enjeksiyonluk Çözelti**, organizmanın genel durumlarını takviye etmeleri yanında, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmalarında rolü bulunan enzim ve fermentleri de stimüle ederler. Özellikle Vitamin B₁₂, geniş getiren hayvanlarda ruminasyonu olumlu yönde etkileyerek, bitkisel proteinlerden maksimum faydalanmayı sağlar.

Vitamin B₁ (Tiamin HCl), suda çözünen, karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan ve eksikliğinde ciddi neuro-musküler belirtilere neden olan pirimidin ve tiyazol çekirdeğinden oluşan organik bir maddedir ve Tiamin hidroklorür olarak bulunur. Oral ve kas içi uygulamada hızla emilim gösterir. Geniş bir şekilde bir çok vücut dokusuna yayılır. Değişmemiş olarak veya metabolitleri olarak idrarla vücuttan atılır.

Vitamin B₂ (Riboflavin 5-Sodyum fosfat), fosfat tuzu olarak suda iyi çözünürlük gösteren ve hayvanlarda enerji metabolizmasında rol alan, aynı zamanda nikotinik asit ve piridoksin metabolizmasında da gerekli olan bir vitamindir. Hem parenteral hem de ağızdan uygulandığında iyi emilir. Emildikten sonra tüm vücuda dağılır ve çok az miktarda depo edilir. İdrarla atılır.

Vitamin B₃ (Niasinamid), B grubu vitaminlerden olup parenteral uygulama yerinden ve sindirim kanalından iyi bir şekilde emilerek vücutta nikotinamid dinükleotid (NAD) ve nikotinamid adenin dinükleotid fosfat (NADP)'ye dönüşür ve şeker, protein ve yağ metabolizmasında rol alır, tüm vücut dokularında dağılır ve idrarla küçük miktarlarda atılır. Terapötik dozlarda kullanılan niasinamidin küçük bir miktarı değişmemiş şekilde idrarla atılır.

Vitamin B₅ (D-panthenol), ko-enzim A'nın esasını teşkil eder; enzimde sisteinle fosforlu ester eşeklinde bulunur. Bu enzim şeker ve yağların ara metabolizmasında önemli görevler yapar ve iki karbonlu yapıların (asil ve asetil grupları) taşınmasını gerçekleştirir. Ağızdan verildikten sonra pantotenik asit sindirim kanalından iyi emilir. Alkol halinde deri yoluyla uygulandığında da vücuttaki noksanlığı giderecek veya ihtiyacı karşılayacak ölçüde emilir. Tüm vücuda dağılır, çoğunluğu değişmemiş şekilde idrarla atılır.

Vitamin B₆ (Piridoksin HCl), suda çözünen vitaminlerden olan Piridoksin, aminoasit metabolizmasının şekillenmesi için de gereklidir. Ağızdan verilen Piridoksin hızla emilerek aktif form olan piridoksal fosfat ve piridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde metabolize olarak 4-piridoksik asit ve diğer inaktif metabolitlerine okside olarak idrarla atılır.

Vitamin B₁₂ (Siyanokobalamin), suda çözünen bir vitamin olup, deri altı ve kas içi yolla verildiğinde uygulama yerinden iyi emilir, hayvan vücudunda ara metabolizmada rol alır ve normal gelişme ve beslenme, kan şekilli hücrelerinin şekillenmesi, epitel hücrelerde dahil tüm hücrelerin gelişmesi ve çoğalması, sinir dokusunda myelin sentezi ve bütünlüğünü koruması gibi son derece önemli görevleri vardır. Çoğunluğu da idrarla atılır.

5.2 Farmakokinetik Özellikler

COBEMİX Enjeksiyonluk Çözelti, kas içi (İ.M.) uygulandıktan sonra uygulama yerlerinden hızla ve tam olarak emilir. Plazma proteinlerine bağlanmış halde karaciğere taşınır. Başlıca karaciğerde metabolize edilirler. Aynı organdan geçen vitaminler bütün vücuda dağılırlar. Büyük ölçüde metabolizma ürünleri ve çok düşük oranlarda da değişmemiş halde vücuttan atılırlar.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Metil Paraben
Propil Paraben
EDTA
Propil Gallat
Sitrik Asit
Demir (III) Klorür Hekzahidrat
Monopropilen Glikol
Sorbitol
Benzil Alkol
Sodyum Hidroksit Pellets
Enjeksiyonluk Su

6.2 Geçimsizlikler

Neuromuskuler blokaj yapan ilaçlarla, glikokortikoid ve antihistaminiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

6.4 Muhafaza şartları

Ürün ilk kullanımdan sonra da dahil, orijinal ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25°C'nin altında muhafaza edilmelidir. Güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içerisinde 100 ml amber Tip II cam flakonlarda 20 mm gri bromobutil lastik tıpa ve 20 mm baskılı kapak ve 250 ml amber Tip II cam flakonlarda 32 mm gri bromobutil lastik tıpa ve 32 mm baskılı kapak ile sıvanarak satışa arz edilmiştir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DMR BESİN MADDELERİ YEM KATKI ÜRÜNLERİ GIDA KİMYA PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı Blok no: 20 N İç Kapı no: 6 06200 Yenimahalle/ANKARA

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

021/0052

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

14.05.2009

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
19.01.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

COBEMIX

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti; berrak, turuncu-sarı renkli, hafif kokulu, steril ve apirojen enjeksiyonluk bir çözelti olup beher ml'de;

B₁ Vit. 5 mg,

B₂ Vit. 2 mg,

B₆ Vit. 2 mg,

B₁₂ Vit. 4 µg,

D-panthenol 10 mg,

Niacin 20 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti'nin bileşiminde B kompleks vitaminleri bulunur.

B₁ vitamini (Tiamin), insan ve hayvan vücudunda ATP tarafından fosfatlanarak tiamin difosfata dönüşür. Tiaminin etkin şeklini oluşturan ve ATP vericisi olarak iş gören bu madde, vücutta karbonhidratların ara metabolizmasında rol oynayan önemli bir koenzimdir.

B₂ vitamini (Riboflavin), tüm evcil hayvanlarda karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizması için kesinlikle gerekli olan çok sayıdaki enzimin prostetik gruplarını oluşturur.

B₆ vitamini (Piridoksin), etkin türevleri olan piridoksal-5-fosfat ve piridoksamin fosfat, aminoasitlerin emilmesi, metabolizması ve taşınmasında görevli çok sayıda enzim çeşidinin koenzim kısmını oluşturur.

B₁₂ vitamini (Siyanokobalamin), hayvan vücudunda metil kobalamin ve ko-enzim B₁₂ aktif metabolitlerine dönüşmek suretiyle çok yönlü biyolojik olaylara karışır. Böylece; normal beslenme, gelişme, kanın şekillenmesi, epitel hücreleri de dahil, bütün hücrelerin gelişmesi ve çoğalması, miyelin sentezi ve sinirsel dokularda bütünlüğün korunması ve bazı yardımcı enzimlerin sentezlenmesinde önemli görevler yapar.

D-panthenol, evcil hayvanlarda oldukça çeşitlilik gösteren dokusal metabolik olayların gerçekleşmesinde belirleyici öneme sahip olan ko-enzim A ve asetil taşıyıcı proteinin bileşimlerine katılır.

Niasin, tüm gelişmiş canlılarda NAD ve NADP'tan oluşan koenzimlere dönüşmek suretiyle, dokusal solunum için temel olan çok yönlü oksido-redüksiyon sistemlerinde yardımcı faktör olarak görev yapar. Söz konusu nikotinik asit kökenli enzimler hidrojen taşıyıcısıdır.

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, kas içi (İ.M.) uygulandıktan sonra uygulama yerlerinden hızla ve tam olarak emilir. Plazma proteinlerine bağlanmış halde karaciğere taşınır. Başlıca karaciğerde metabolize edilirler. Aynı organdan geçen vitaminler bütün vücuda dağılırlar. Büyük ölçüde metabolizma ürünleri ve çok düşük oranlarda da değişmemiş halde vücuttan atılırlar.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, gıdaya bağlı indigesyonlarda, enfeksiyöz hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan indigesyonlarda, iştahsızlık, gelişmede yavaşlama, sindirim sistemi

florasının bozulmasına neden olan antibakteriyel uygulamalarda, paraziter salgınlarda, asıl tedaviyi destekleyici olarak, formülasyondaki vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanan deri, kas ve sinir hastalıklarında, çeşitli stres durumlarında, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, deri altı (S.C.) veya kas içine (İ.M.) uygulanır.

Pratik doz tablosu

Hayvan Türü	Verilecek miktar (ml)
Sığır, Manda ve At	15 - 30 ml
Dana, Düve	10 -15 ml
Buzağı, Tay	5 - 10 ml
Koyun, Keçi	5 - 10 ml
Kuzu, Oğlak	3 - 5 ml

Hedef hayvan türlerinde öngörülen etkilerin elde edilebilmesi ve klinik belirtilerin tümüyle düzeltilmesi için seçilen bir defalık sağaltım dozları günde 1-2 kez tekrarlanmak üzere, gerekli görüldüğü sürece ilaç uygulamalarına devam edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Damar içi (İ.V.) kullanmayınız.

İSTENMEYEN ETKİLER

Nadiren de olsa meydana gelebilecek aşırı hassasiyet reaksiyonlarında adrenalin kullanılmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, suda çözünen 6 çeşit vitamin aktif maddesinin dengeli ve uyumlu bir kombinasyonu esasına göre, çeşitli yardımcı çözücüler, çözünmeyi kolaylaştırıcı ajanlar ve yükseltgenmeyi engelleyici yardımcı maddeler kullanılarak oldukça dar sınırlı pH değerine sahip sulu ortamda çözündürülmesiyle hazırlanmış olan sulu bir çözeltidir. Belirtilen özel formülasyonu ve farmasötik şekli nedeniyle uygulama aşamasında diğer sıvı ilaçlarla karıştırıldığında bulanma ve çökme sakıncası söz konusu olabilir. Özellikle de alkali pH'lı sıvı ilaçlar ve kalsiyum içeren infüzyon sıvılarıyla karıştırılmaması gerekir. Neuromuskuler blokaj yapan ilaçlarla, glikokortikoid ve antihistaminiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Tiaminin parenteral uygulamalarında nadiren de olsa anafilaktik şok oluşabilir. Yavaşça enjekte ediniz ve anafilaktik şok görüldüğünde adrenalin ile sağaltıma geçiniz.

Gebelikte kullanımı: Gebe hayvanlara uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, Işıktan korunarak ve 25°C'nin altındaki ortamlarda ve kendi ambalajında muhafaza edilir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Açılmış flakonlar kısa zamanda kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli cam flakonlarda ve karton kutuda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 19.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO 14.05.2009
– 21/052

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DMR BESİN MADDELERİ YEM KATKI ÜRÜNLERİ GIDA KİMYA PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:20 N iç kapı no: 6 Yenimahalle/ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

(****Ürünün iki farklı üretim yeri olduğundan nerede üretim yapılacaksa o üretim yerinin adı ve adresi yazılacaktır.)

İç ve Dış Etiket (50,100 ve 250 ml için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

COBEMIX

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ: Beher ml’de; B₁ Vit. 5 mg, B₂ Vit. 2 mg, B₆ Vit. 2 mg, B₁₂ Vit. 4 µg, D-panthenol 10 mg, Niacin 20 mg içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, gıdaya bağlı indigesyonlarda, enfeksiyöz hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan indigesyonlarda, iştahsızlık, gelişmede yavaşlama, sindirim sistemi florasının bozulmasına neden olan antibakteriyel uygulamalarda, paraziter salgınlarda, asıl tedaviyi destekleyici olarak, formülasyondaki vitaminlerin eksikliğinden kaynaklanan deri, kas ve sinir hastalıklarında, çeşitli stres durumlarında, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:Deri altı (S.C.) veya kas içine (İ.M.) uygulanır.

Kullanım detayları ve Uyarılar için Prospektüsü okuyunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” gündür.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Işıktan korunarak ve 25°C’nin altındaki ortamlarda ve kendi ambalajında muhafaza edilir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Açılmış flakonlar kısa zamanda kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Cobemix Enjeksiyonluk Çözelti, 20 ml, 50 ml,100 ml ve 250 ml’lik amber renkli cam flakonlarda ve karton kutuda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
14.05.2009 – 21/052

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DMR BESİN MADDELERİ YEM KATKI ÜRÜNLERİ GIDA KİMYA PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:20 N iç kapı no: 6 Yenimahalle/ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

(****Ürünün iki farklı üretim yeri olduğundan nerede üretim yapılacaksa o üretim yerinin adı ve adresi yazılacaktır.)

SERİ NO:

Ü.T.:

S.K.T.:

P.S.F.: (KDV DAHİL) (Sadece dış ambalaj)

İç ve Dış Etiket(20 ml için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

COBEMIX

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

Beher ml’de; B₁ Vit. 5 mg, B₂ Vit. 2 mg, B₆ Vit. 2 mg, B₁₂ Vit. 4 µg, D-panthenol 10 mg, Niacin 20 mg içerir. At, keçi, koyun, manda, sığırlarda deri altı (S.C.) veya kas içine (İ.M.) uygulanır.

Kullanım detayları ve Uyarılar için Prospektüsü okuyunuz.

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” gündür.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

14.05.2009 – 21/052

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

DMR BESİN MADDELERİ YEM KATKI ÜRÜNLERİ GIDA KİMYA PAZARLAMA
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:20 N iç kapı no: 6 Yenimahalle/ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

(***Ürünün iki farklı üretim yeri olduğundan nerede üretim yapılacaksa o üretim yerinin adı ve adresi yazılacaktır.)

SERİ NO:

Ü.T.:

S.K.T.:

P.S.F.: (KDV DAHİL) (Sadece dış ambalaj)