

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Compovit Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 ml’de

Aktif madde:

Vitamin B1 (Tiamin Hidroklorür).....	5,00 mg
Vitamin B2 (Riboflavin Sodyum Fosfat).....	2,00 mg
Vitamin B3 (Nikotinamid).....	20,00 mg
Vitamin B5 (D-Pantenol).....	10,00 mg
Vitamin B6 (Piridoksin Hidroklorür).....	2,00 mg
Vitamin B12 (Siyanokobalamin).....	0,004 mg

Yardımcı maddeler:

Benzil Alkol (E1519).....	15,00 mg
---------------------------	----------

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.’e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Çözelti,

Berrak, sarı renkli çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, At, Koyun, Keçi, Köpek, Kedi, Tavşan, Kanatlılar

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Compovit Enjeksiyonluk Çözelti, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı olarak şekillenen absorbsiyon bozuklukları, ateşli akut ve kronik enfeksiyonel hastalıklara ve buna bağlı nekahet dönemleri, antibiyotik ve sulfonamid gibi kemoterapötiklerin oral uygulamaları, mineral eksikliğine bağlı beyaz kas ve enzootik ataksi gibi rahatsızlıklar, deri, kas, sinir sistemi hastalıkları, genç hayvanların gebelikleri ve yeni doğanların septisemi, pnömoni ve ishalleri, anemi, stres durumları, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bilinmemektedir.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Genelde ven içi uygulama tavsiye edilmez. Mutlaka ven içi uygulanması gerekiyorsa, anafilaktik şok riskini azaltmak için sulandırılarak ve yavaşça enjekte edilmelidir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Genelde ven içi uygulama tavsiye edilmez. Mutlaka ven içi uygulanması gerekiyorsa, anafilaktik şok riskini azaltmak için sulandırılarak ve yavaşça enjekte edilmelidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

-

(iii) Diğer uyarılar

-

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Ven içi uygulama sonrasında özellikle atlarda anafilaktik şok yapabilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

-

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Alkali, ağır metal tuzları, oksidan ve redüktörler, cıva-iod-demir tuzları, karbonat, tennik asit ve askorbik asitle geçimsizliği bulunduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Tüm hayvanlarda kas içi, deri altı veya oral yolla (Kanatlılar için-içme suyuna katılarak) verilir. Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmemiş ise;

At-Sığır-Manda: 15 – 30 ml

Dana-Düve-Malak: 10 – 15 ml

Buzağı-Tay: 5 – 10 ml

Koyun-Keçi: 5 – 10 ml

Köpek-Kedi: 1 – 5 ml

Tavşan: 1 ml

Kanatlılarda: 1 litre içme suyuna 2 ml

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Doza bağlı kalmadan sadece ven içi kullanım sonrasında anafilaktik şok görüldüğünde adrenalin ve benzeri uygun ilaçlarla sağıtıma geçilir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Et, süt ve yumurta için bekleme süresi “0” gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Vitamin B kompleksi, kombinasyonlar dahil

ATCvet kodu: QA11E

5.1 Farmakodinamik özellikler

B kompleks vitaminler protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmalarında rolü bulunan enzim ve fermentleri de stimüle ederler. Özellikle Vitamin B₁₂, geniş getiren hayvanlarda ruminasyonu tetikleyerek, bitkisel proteinlerden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlar.

5.2 Farmakokinetik özellikler

-

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Benzil Alkol (E1519)

Disodyum EDTA

Enjeksiyonluk Su

6.2 Geçimsizlikler

Bölüm 4.8'e bakınız.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajı içinde, 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra da 25°C'nin altında saklanmalıdır.

İlk kullanımı takiben tıpa 40 defadan fazla delinmemelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda, gri renkli bromobutil tıpalı ve alüminyum halkalı şeffaf flip-off kapaklı olarak karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Sahrayıcedit Mah. Batman Sk. Royal Plaza No:18/6 Kadıköy-İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

011/1063

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

20.06.2002

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

22.10.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
COMPOVİT
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

Her ml'de, 5 mg Vitamin B₁ (Tiamin Hidroklorür), 2 mg Vitamin B₂ (Riboflavin Sodyum Fosfat), 20 mg Vitamin B₃ (Nikotinamid), 10 mg Vitamin B₅ (D-Pantenol), 2 mg Vitamin B₆ (Piridoksin Hidroklorür) ve 0,004 mg Vitamin B₁₂ içeren, koruyucu olarak ise 15 mg Benzil Alkol (E1519) içeren berrak, sarı renkte bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik Özellikler

B kompleks vitaminler protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmalarında rolü bulunan enzim ve fermentleri de stimüle ederler. Özellikle Vitamin B₁₂, geviş getiren hayvanlarda ruminasyonu tetikleyerek, bitkisel proteinlerden maksimum düzeyde yararlanmayı sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

-

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Compovit Enjeksiyonluk Çözelti, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı olarak şekillenen absorpsiyon bozuklukları, ateşli akut ve kronik enfeksiyonel hastalıklara ve buna bağlı nekahet dönemleri, antibiyotik ve sulfonamid gibi kemoterapötiklerin oral uygulamaları, mineral eksikliğine bağlı beyaz kas ve enzootik ataksi gibi rahatsızlıklar, deri, kas, sinir sistemi hastalıkları, genç hayvanların gebelikleri ve yeni doğanların septisemi, pnömoni ve ishalleri, anemi, stres durumları, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hayvanlarda kas içi, deri altı veya oral yolla (Kanatlılar için-içme suyuna katılarak) verilir. Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmemiş ise;

At-Sığır-Manda: 15 – 30 ml

Dana-Düve-Malak: 10 – 15 ml

Buzağı-Tay: 5 – 10 ml

Koyun-Keçi: 5 – 10 ml

Köpek-Kedi: 1 – 5 ml

Tavşan: 1 ml

Kanatlılarda: 1 litre içme suyuna 2 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Genelde ven içi uygulama tavsiye edilmez. Mutlaka ven içi uygulanması gerekiyorsa, anafilaktik şok riskini azaltmak için sulandırılarak ve yavaşça enjekte edilmelidir.

Gebelikte kullanım:-

İSTENMEYEN ETKİLER

Ven içi uygulama sonrasında özellikle atlarda anafilaktik şok yapabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Alkali, ağır metal tuzları, oksidan ve redüktörler, cıva-iod-demir tuzları, karbonat, tennik asit ve askorbik asitle geçimsizliği bulunduğundan birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doza bağlı kalmadan sadece ven içi kullanım sonrasında anafilaktik şok görüldüğünde adrenalin ve benzeri uygun ilaçlarla sağıtıma geçilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Et, süt ve yumurta için bekleme süresi “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinmemektedir.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

-

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra da 25°C'nin altında saklanmalıdır.

İlk kullanımı takiben tıpa 40 defadan fazla delinmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda, gri renkli bromobutil tıpalı ve alüminyum halkalı şeffaf flip-off kapaklı olarak karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenahanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.10.2025**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO:**

20.06.2002-011/1063

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. Royal Plaza No.18/6 Kadıköy/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Dış Ambalaj Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

COMPOVİT

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

Her ml'de, 5 mg Vitamin B₁ (Tiamin Hidroklorür), 2 mg Vitamin B₂ (Riboflavin Sodyum Fosfat), 20 mg Vitamin B₃ (Nikotinamid), 10 mg Vitamin B₅ (D-Pantenol), 2 mg Vitamin B₆ (Piridoksin Hidroklorür) ve 0,004 mg Vitamin B₁₂ içeren, koruyucu olarak ise 15 mg Benzil Alkol (E1519) içeren berrak, sarı renkte bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Compovit Enjeksiyonluk Çözelti, sindirim sistemi hastalıklarına bağlı olarak şekillenen absorpsiyon bozuklukları, ateşli akut ve kronik enfeksiyonel hastalıklara ve buna bağlı nekahet dönemleri, antibiyotik ve sulfonamid gibi kemoterapötiklerin oral uygulamaları, mineral eksikliğine bağlı beyaz kas ve enzootik ataksi gibi rahatsızlıklar, deri, kas, sinir sistemi hastalıkları, genç hayvanların gebelikleri ve yeni doğanların septisemi, pnömoni ve ishalleri, anemi, stres durumları, verim düşüklüğü ve fiziki güçsüzlük hallerinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hayvanlarda kas içi, deri altı veya oral yolla (Kanatlılar için-içme suyuna katılarak) verilir. Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmemiş ise;

At-Sığır-Manda: 15 – 30 ml

Dana-Düve-Malak: 10 – 15 ml

Buzağı-Tay: 5 – 10 ml

Koyun-Keçi: 5 – 10 ml

Köpek-Kedi: 1 – 5 ml

Tavşan: 1 ml

Kanatlılarda: 1 litre içme suyuna 2 ml

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Et, süt ve yumurta için bekleme süresi "0" gündür.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra da 25°C'nin altında saklanmalıdır.

İlk kullanımı takiben tıpa 40 defadan fazla delinmemelidir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

20.06.2002-011/1063

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. Royal Plaza No.18/6 Kadıköy/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İç Ambalaj Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

COMPOVİT

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

Her ml'de, 5 mg Vitamin B₁ (Tiamin Hidroklorür), 2 mg Vitamin B₂ (Riboflavin Sodyum Fosfat), 20 mg Vitamin B₃ (Nikotinamid), 10 mg Vitamin B₅ (D-Pantenol), 2 mg Vitamin B₆ (Piridoksin Hidroklorür) ve 0,004 mg Vitamin B₁₂ içeren, koruyucu olarak ise 15 mg Benzil Alkol (E1519) içeren berrak, sarı renkte bir çözeltidir.

Tüm hayvanlarda kas içi, deri altı veya oral yolla (Kanatlılar için-içme suyuna katılarak) verilir.

Veteriner hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmemiş ise;

At-Sığır-Manda: 15 – 30 ml; Dana-Düve-Malak: 10 – 15 ml; Buzağı-Tay: 5 – 10 ml

Koyun-Keçi: 5 – 10 ml; Köpek-Kedi: 1 – 5 ml; Tavşan: 1 ml

Kanatlılarda: 1 litre içme suyuna 2 ml

DETAYLI BİLGİ İÇİN PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.

Et, süt ve yumurta için bekleme süresi "0" gündür.

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. Royal Plaza No.18/6 Kadıköy/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL PERAKENDE SATIŞ FİYATI: