

Prospektüs (100-500-1000 ml'lik ambalajlar için)

ZEHIRLİDİR

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

DEKATOKS

Daldırma Çözeltisi İçin Konsantrat Veteriner Ektoparazitler
(İnsektisit-Akarisit)

BİLEŞİMİ: Berrak, sarı-kahverengi renkli daldırma emülsiyonu için konsantrat olan **DEKATOKS**'in beher ml'sinde 50 mg Deltamethrin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Sentetik piretroidlerden deltamethrin ihtiva eden **DEKATOKS** Konsantrat kene, bit, sinek gibi duyarlı ektoparazitlerin yumurta, larva ve ergin hallerine etkilidir. Deltamethrin de diğer sentetik piretroidler gibi temas ve mide zehiri olarak etkisini göstermektedir. Sistemik bir etkisi yoktur. Hedef ektoparazitlerin nöronlarında sinirsel ileti sırasında sodyum geçirgenliğinin uzamasına sebep olarak parazitlerin üzerinde toksik etkisini gösterir. Deltamethrin lipofilik özelliğinde olduğundan insektlerin lipoid moleküllerince zengin kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşır. Parazitlerin zehirlenmesi neticesinde eksitasyon, hareketlerde inkoordinasyon, paraliz, dehidrasyon ve ölüm görülür. Hayvanlara haricen uygulandığında güvenlidir. Memelilerdeki toksisitesi çok düşüktür. Deltamethrin lipofilik karakterde bir madde olduğundan uygulama sonrası yağmurdan etkilenmez. Deltamethrin deri yolu ile uygulamasından sonra çok az emilir ve hedef parazitte etkisini devam ettirir. Emilen Deltamethrinin büyük bir kısmı dışkı ile, az bir kısmı ise idrarla vücuttan atılır. Deriden az emildiğinden kalıntı seviyeleri minimum limitlerin altındadır.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Sığır ve koyunlarda; Kene (yumurta, larva, ergin), bit, uyuz etkenleri ile mücadelede, çeçesineği ve diğer zararlı sineklerin uzaklaştırılmasında ve hayvanların sinek larvaları ile enfestasyonunun önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: **DEKATOKS** Konsantrat, daldırma, püskürtme veya yıkama yöntemleri ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediğinde aşağıdaki tablodaki dozlar uygulanır.

Sığırlarda	0,25-1,5 mg/kg Canlı ağırlık Gerektiğinde 3-6 haftada bir tekrarlanabilir.
Koyunlarda	0,94-4,5 mg/kg Canlı ağırlık Gerektiğinde 10-21 gün sonra tekrarlanabilir.

Daldırma Çözeltisinin Hazırlanması; Daldırma havuzunda her 1000 litre su için 1 litre **DEKATOKS** kullanılır.

Yıkama ve Püskürtme Çözeltisinin Hazırlanması; Her 1 litre su için 1 ml **DEKATOKS** kullanılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Günün sıcak saatlerinde banyo yaptırılması tavsiye edilmemektedir. Banyo yaptırılmadan evvel hayvanların tüyleri fırçalanarak olası döküntülerden arındırılır. Parazitlerin yaygın ve enfestasyonun yoğun olan bölgelerde her hayvan için en az 3 litre yıkama emülsiyonu uygulamak gerekir. Spesifik bir antidotu bulunmamaktadır. **Gebelikte kullanımına** ilişkin bir komplikasyon bildirilmemektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Organik fosforlu insektisitlerle karıştırılmamalıdır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER: Bazı sığırlarda hafif huzursuzluk belirtileri gözlenebilir, bunun yanı sıra kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetleri meydana

gelebileceği bildirilmiştir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER: Deltametrinin, deri yolu ile uygulamada toksisitesi düşüktür. Kazara çok yüksek dozda ilaç kullanımı sonrasında doz aşımı durumunda hayvanlarda uyuşukluk, kaşıntı, yanma hissi, koordinasyon bozukluğu, felç görülebilir. İlaç kullanımı sonrası benzer belirtiler görüldüğünde veteriner hekime başvurulmalıdır. Klinik bulgular için semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Bilinen herhangi bir antidotu bulunmamaktadır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 3 gün, koyunlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanım süresince ve durdurulmasını takiben elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulabilir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda ise kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI: Aktif maddeye hassasiyeti olan hayvanlara ve 7 günlükten küçük buzağılara, 4 haftalıktan küçük kuzulara uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyi haricinde bir yolla (göz, ağız vs.) uygulanmaz.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Haricen kullanılır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Uygulamadan sonra hayvanların su kaynaklarına girmeleri ve birbirlerini yalamaları engellenmelidir. Hayvanlar yıkandıktan sonra ilaçlama yapınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR: Temas ve uygulama esnasında koruyucu bir giysi giymeli. Spreyleme esnasında inhalasyon mümkün olduğunca az tutulmalı ve yüz maskesi kullanılmalıdır. Uygulama esnasında yemekten, içmekten ve sigara kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bulaşık elbiseler mutlaka çıkartılmalı sabun ve su ile iyice yıkanmalıdır. Kazara göze ilaç kaçtığında temiz su ile bolca yıkanmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Arılar için toksiktir. Bu nedenle kovanlardan uzak tutulmalıdır. Balıklar için de tehlikeli olduğundan akarsu, gölet vb. gibi yerlere dökülmemelidir. Kullanımdan hemen sonra boş ilaç şişeleri emin bir şekilde yok edilmeli ve farklı bir amaç için kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda sıcaklığında 15 °C-25 °C'de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml coex şişelerde karton kutu içerisinde, 500 ml ve 1000 ml'lik coex şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi (VHR) ile veteriner muayenahanelerinde ve eczanelerde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 13.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO:

03.06.2011-024/0036

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ: Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: 0 212 361 55 13 Faks: 0212 361 55 12

İMAL EDİLDİĞİ YER: BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kırklareli OSB 5. Cadde No:6/2 Kızılcıkdere Köyü Merkez/KIRKLARELİ

Dış Ambalaj Etiketi (100-500-1000 ml'lik ambalajlar için)

ZEHİRLİDİR

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

DEKATOKS

Daldırma Çözeltisi İçin Konsantrat Veteriner Ektoparaziter
(İnsektisit-Akarisit)

BİLEŞİMİ: Berrak, sarı-kahverengi renkli daldırma e

mülsiyonu için Konsantrat olan **DEKATOKS**'in beher ml'sinde 50 mg Deltamethrin içerir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Sığır ve koyunlarda; Kene (yumurta, larva, ergin), bit, uyuz etkenleri ile mücadelede, çeşesineği ve diğer zararlı sineklerin uzaklaştırılmasında ve hayvanların sinek larvaları ile enfestasyonunun önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: **DEKATOKS** Konsantrat, daldırma, püskürtme veya yıkama yöntemleri ile uygulanır.

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediğinde aşağıdaki tablodaki dozlar uygulanır.

Sığırlarda	0,25-1,5 mg/kg Canlı ağırlık Gerektiğinde 3-6 haftada bir tekrarlanabilir.
Koyunlarda	0,94-4,5 mg/kg Canlı ağırlık Gerektiğinde 10-21 gün sonra tekrarlanabilir.

Daldırma Çözeltisinin Hazırlanması; Daldırma havuzunda her 1000 litre su için 1 litre **DEKATOKS** kullanılır. Yıkama ve Püskürtme Çözeltisinin Hazırlanması; Her 1 litre su için 1 ml **DEKATOKS** kullanılır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 3 gün, koyunlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanım süresince ve durdurulmasını takiben elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulabilir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda ise kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Haricen kullanılır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Uygulamadan sonra hayvanların su kaynaklarına girmeleri ve birbirlerini yalamaları engellenmelidir. Hayvanlar yıkandıktan sonra ilaçlama yapınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda sıcaklığında 15 °C -25 °C 'de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml coex şişelerde karton kutu içerisinde, 500 ml ve 1000 ml'lik coex şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi (**VHR**) ile veteriner muayenahanelerinde ve eczanelerde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:
03.06.2011-024/0036

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ: Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0 212 361 55 13 Faks: 0212 361 55 12

İMAL EDİLDİĞİ YER: BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kırklareli OSB 5. Cadde No:6/2 Kızılcıkdere Köyü Merkez/KIRKLARELİ

Seri No:

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):

İç Ambalaj Etiketi (100-500-1000 ml'lik ambalajlar için)

ZEHIRLİDİR

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

DEKATOKS

Daldırma Çözeltisi İçin Konsantrat Veteriner Ektoparaziter
(İnsektisit-Akarisit)

BİLEŞİMİ: Berrak, sarı-kahverengi renkli daldırma emülsiyonu için konsantrat olan **DEKATOKS**'in beher ml'sinde 50 mg Deltamethrin içerir.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLARI: Sığır ve koyunlarda; Kene (yumurta, larva, ergin), bit, uyuz etkenleri ile mücadelede, çeçesineği ve diğer zararlı sineklerin uzaklaştırılmasında ve hayvanların sinek larvaları ile enfestasyonunun önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: **DEKATOKS** Konsantrat, daldırma, püskürtme veya yıkama yöntemleri ile uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediğinde aşağıdaki tablodaki dozlar uygulanır.

Sığırlarda	0,25-1,5 mg/kg Canlı ağırlık Gerektiğinde 3-6 haftada bir tekrarlanabilir.
Koyunlarda	0,94-4,5 mg/kg Canlı ağırlık Gerektiğinde 10-21 gün sonra tekrarlanabilir.

Daldırma Çözeltisinin Hazırlanması; Daldırma havuzunda her 1000 litre su için 1 litre **DEKATOKS** kullanılır. Yıkama ve Püskürtme Çözeltisinin Hazırlanması; Her 1 litre su için 1 ml **DEKATOKS** kullanılır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 3 gün, koyunlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanım süresince ve durdurulmasını takiben elde edilen inek sütleri insan tüketimine sunulabilir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlarda ise kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Haricen kullanılır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Uygulamadan sonra hayvanların su kaynaklarına girmeleri ve birbirlerini yalamaları engellenmelidir. Hayvanlar yıkandıktan sonra ilaçlama yapınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda sıcaklığında 15 °C -25 °C 'de muhafaza edilmelidir. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 100 ml coex şişelerde karton kutu içerisinde, 500 ml ve 1000 ml'lik coex şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi (**VHR**) ile veteriner muayenahanelerinde ve eczanelerde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:
03.06.2011-024/0036

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ: Biyoteknik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kocatepe Mah. Cumhuriyet Cad. İnkılap Apt. No:15/2 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0 212 361 55 13 Faks: 0212 361 55 12

İMAL EDİLDİĞİ YER: BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kırklareli OSB 5. Cadde No:6/2 Kızılcıkdere Köyü Merkez/KIRKLARELİ

Seri No:

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):