

Prospektüs Metni

DİCRAZOL Oral Tablet Veteriner Endektosit

BİLEŞİMİ

1 tablet; aktif madde olarak 250 mg Prazikuantel ve 10 mg İvermektin, renklendirici olarak 0,05 mg sarı boya içeren sarı renkli, oval, ortadan çentikli oral tabletlerdir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dicrazol Oral Tablet Praziquantel ve İvermektin kombinasyonudur. Bileşiminde bulunan İvermektin en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B1a ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöyromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (Cl-) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, İvermektin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşır merkezi sinir sistemi içinde yer alır GABA-nerjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür. İvermektin oral yolla uygulamasını takiben gastrointestinal sistemden iyi bir şekilde emilir ve 4-8 saat içerisinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır.

İvermektin beyin omurilik sıvısı dışında tüm vücut dokularına ulaşır ve özellikle karaciğer ve yağ dokusunda yüksek, kas dokusunda ise düşük konsantrasyonda bulunur. İlaç vücutta bir seri yükseltgenme reaksiyonuna maruz kalarak ilacın % 98'i safra yolu ve % 2'si de idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırılır.

Praziquantel şeritlere olan etkisini şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak, glikoz alımını engellemek ve parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Praziquantel düşük konsantrasyonlarda önce kasılmaları artırır sonrasında ise spastik felç yapar. Şeritlerde tüm halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve barsağa gömülü çengeller serbest kalır. Buna bağlı olarak da barsakla parazitin teması kesilir. Praziquantel hem ergin hem de larvalara karşı etkilidir.

Praziquantel'in yarı ömrü yaklaşık 3 saat kadar olup, ilk 24 saat içinde yaklaşık olarak % 80'i 48 saatte ise tamamı idrar ve gaita ile atılır. Büyük oranda karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Dicrazol Oral Tablet; koyunlarda mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtları, burun kurdu gibi iç ve dış parazit invazyonlarının etkili bir şekilde sağaltımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir kombinasyondur.

Koyunlarda etki spektrumuna giren parazitler şunlardır;

Gastrointestinal Nematodlar (ergin ve larva): Haeamonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Strongyloides papillosus, Oesophagostomum sp., Dictyocaulus sp., ergin ve larval formları

Sestod türleri: Moniezia expansa, Stilesia globipunctata, Avitellina centripunctata, Cyticercus tenuicollis'in ergin formları

Karaciğer kelebeği: Dicrocoelium dendriticum

Burun kurdu : Oestrus ovis

Uyuz etkenleri: Psoroptes communis ovis, Sarcoptes scabiei bovis

Kene: Boophilus spp.

Bitler: Linognathus vituli

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Dicrazol Oral Tablet koyun ve kuzularda elle veya tablet aparatı ile dilin kaidesine bırakılarak bol suyla yutturulur.

Farmakolojik doz: Praziquantel için 5 mg/kg vücut ağırlığıdır.

İvermektin için 0.2 mg/kg. vücut ağırlığı vücut ağırlığıdır.

Dicrocoelium dentricum (Kum kelebeği) tedavisinde Praziquantel dozu 50 mg/kg vücut ağırlığına çıkarılmalıdır.

Avitellina centipuncta için Praziquantel dozu 7.5 mg/kg vücut ağırlığına çıkarılmalıdır.

Pratik doz:

Kuzu için (25 kg) : ½ Tablet

Koyun için (50 kg): 1 Tablet

Yukarıda belirtilen dozlar 3 ayda bir tekrarlanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Dicrazol Oral Tablet uygulama zamanı ve sıklığının belirlenmesi için parazitlerin gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, mera koşulları dikkate alınmalıdır.

En uygun ve etkin parazit mücadelesi programı için veteriner hekime danışınız.

Dicrazol Oral Tablet kullanılmadan önce hayvanlara her hangi bir diyet uygulamaya veya tedavi sonrası herhangi bir sürgüt kullanılmasına gerek yoktur.

Koyunlarda psoreptik uyuz tedavisinde en iyi sonucu alabilmek için 7 gün ara ile 2 defa uygulama yapılması önerilmektedir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Güvenlik endeksi geniştir. Nadiren de olsa karın ağrısı, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal görülebilir.

Gebelikte kullanım: Önerilen dozlarda gebelerde güvenle kullanılabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Praziquantel deksametazon ile birlikte kullanıldığında praziquantelin konsantrasyonu yarı yarıya düşmektedir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen koyunlar 28 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Hedef hayvanlarda bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

Aşırı duyarlılık hallerinde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerinin sulara karışmamasına dikkat ediniz.

Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız.

İvermektin'in toprakta kısa sürede parçalanması nedeniyle toprağa gömülmesi veya yakılması önerilmektedir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürün ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde; 10, 20 ve 50 tabletlik alüminyum folyolu blister ambalajlarda ve 100 tabletlik kahve renkli cam şişede satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle eczane ve veteriner hekim muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 19.11.2025**T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE**

NO.:20.11.2012-026/0073

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

MAMVET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

(****Ürünün üç farklı üretim yeri olduğundan nerede üretim yapılacaksa o üretim yeri adı ve adresi yazılacaktır.)

İç ve Dış Ambalaj Etiketi

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
DİCRAZOL
Oral Tablet
Veteriner Endektosit**

1 tablet aktif madde olarak 250 mg Prazikuantel, 10 mg İvermektin ve renklendirici olarak 0,05 mg sarı boya içerir.

Dicrazol Oral Tablet koyun ve kuzularda elle veya tablet aparatı ile dilin kaidesine bırakılarak bol suyla yutturulur.

Farmakolojik doz: Prazikuantel için 5 mg/kg vücut ağırlığıdır.

İvermektin için 0.2 mg/kg vücut ağırlığı vücut ağırlığıdır.

Dicrocoelium dentricum (Kum kelebeği) tedavisinde Prazikuantel dozu 50 mg/kg vücut ağırlığına çıkarılmalıdır.

Avitellina centipuncta için Prazikuantel dozu 7.5 mg/kg vücut ağırlığına çıkarılmalıdır.

Pratik doz:

Kuzu için (25 kg) : ½ Tablet

Koyun için (50 kg): 1 Tablet

Yukarıda belirtilen dozlar 3 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

Koyun eti için kalıntı arınma süresi 28 gündür.

İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

Ürün ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır.

TC.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.:

20.11.2012-026/0073

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ:

MAMVET İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

(****Ürünün üç farklı üretim yeri olduğundan nerede üretim yapılacaksa o üretim yeri adı ve adresi yazılacaktır.)

SERİ NO:

Ü.T.:

S.K.T.:

KDV DÂHİL P.S.F. (sadece dış ambalaj etiketi):

İç Ambalaj Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

DİCRAZOL

Oral Tablet

Veteriner Endektosit

1 tablet; aktif madde olarak 250 mg Prazikuantel ve 10 mg İvermektin, renklendirici olarak 0,05 mg sarı boya içerir.

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ: Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

SERİ NO:

Ü.T.:

S.K.T.: