

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Fiprovvet Drop Köpek Damlatma Çözeltisi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml:

Aktif maddeler:

Fipronil	100 mg
S-metopren	90 mg

Yardımcı maddeler:

Antioksidan: Bütilhidroksianisol (BHA) (E320)	0,2 mg
Antioksidan: Bütilhidroksitoluen (BHT) (E321)	0,1 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Sarı-amber renkte berrak damlatma çözeltisi

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Köpeklerde pire (*Ctenocephalides* spp.), kene (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) ve ısırıcı bit (*Trichodectes canis*) enfestasyonlarının tedavi ve korunması ile pire kaynaklı alerjik dermatitis tedavisinde destekleyici amaçla kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

8 haftalıktan küçük köpeklere uygulanmamalıdır. 2 kg altında olan köpeklerde kullanılmamalıdır. Tavşanlarda ölüme neden olduğundan kullanımı kontrendikedir. Hasta (sistemik hastalık, ateş...) veya güçsüz hayvanlarda kullanılmamalıdır. Bu ürün köpeklere özel geliştirilmiştir, kedi ve diğer hedef olmayan türlerde kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Fiprovvet Drop Köpek Damlatma Çözeltisi, ergin pirelere karşı 8 hafta süreyle etkilidir. Yumurta, larva ve pupa gelişimini inhibe edici etkisi uygulamadan sonra 8 hafta süreyle devam eder.

Kenelere yönelik akarisit etkisi köpeklerde 4 haftadır (yapılan deneysel çalışmalara dayanarak). Pire kaynaklı alerjik dermatitislerde hasta hayvan ile çevresindeki diğer kedi ve köpeklere aylık uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pire Alerjik Dermatitis tedavisi uygulandığında uygulamadan 24 saat geçmeden köpeğin havuz veya diğer su kaynaklarının içinde yüzmesi engellenmelidir.

Çok sayıda hayvanın bir arada bulunduğu yerlerde pire ve kene problemlerinin optimal kontrolü için ortamdaki tüm kedi ve köpekler uygun bir insektisit ile ilaçlanmalıdır. Ayrıca, ortamın vakumla süpürülmesi, pet yataklarının yıkanması ve çevreye yönelik önlemlerin de alınması tavsiye edilir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Ürünün etkinliği üzerinde nasıl bir sonuç doğuracağı araştırılmadığından uygulama sonrası 2 gün süreyle hayvanlar yıkanmamalıdır. Ürünün hayvanların gözlerine temasından kaçınılmalıdır. Ürün, hayvanın ulaşamayacağı bir bölgeye uygulanmalı ve tedavi edilen hayvanların birbirlerini yalamalarına izin verilmemelidir. Uygulama yeri kuruyana kadar hayvana dokunulmamalı, hayvanların çocuklarla ve ortamdaki diğer hayvanlarla temas etmesine izin verilmemelidir. Bu nedenle hayvanların gün içinde değil akşamın erken saatlerinde tedavi edilmesi ve yakın zamanda tedavi edilen hayvanların sahipleriyle özellikle de çocuklarla uyumalarına izin verilmemesi önerilmektedir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

İlaç ile temas edilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Ellere bulaşması halinde su ve sabunla yıkayınız. Göze teması halinde bol su ile yıkayınız. Uygulama sonrası, kurumadan hayvanlara dokunmayınız.

Ürünün mukoz membran, cilt ve gözlerde irritasyona yol açabilir, bu nedenle ağız, deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. İnsektisitler ya da alkole duyarlı olduğu bilinen hayvanlar ve insanların ilaç ile temas etmemesi gerekmektedir. Uygulama esnasında bir şey yiyip içilmemelidir ve sigara kullanılmamalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

Ürün insektisit akarasit özelliği nedeniyle balıklar, suda yaşayan diğer canlılar ve karada yaşayan bazı artropodlar için toksik etki gösterebilmektedir. Fipronil aktif maddesi, tarım alanında pestisid olarak kullanılmak üzere formüle edildiğinde kuşlar ve bal arıları üzerinde etkili olabilir.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Hayvanların uygulama bölgesini yalamaları durumunda kısa süreli hipersalivasyon gözlemlenebilir. Çok seyrek de olsa uygulama bölgesinde geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal alopesi, kaşıntı, kızarıklık) ve genel kaşıntı veya alopesi şekillendiği bildirilmiştir. İstisna olarak da aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon, sinirsel semptomlar) veya kusma görüldüğü bildirilmiştir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Ürün amitraz ile sinerjik etki gösterir. Diğer pire ilaçları ile eş zamanlı olarak kullanmayınız.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Fipronilin farmakolojik dozu 6.7 mg/kg, S-metoprenin ise 6 mg/kg'dır. Vücut ağırlığına göre önerilen dozlar aşağıdaki gibidir;

Vücut ağırlığı	Uygulama Dozu
2-10 kg	0.67 ml'lik bir tüp
10-20 kg	1.34 ml'lik bir tüp
20-40 kg	2.68 ml'lik bir tüp
40 kg ve üzeri	4.02 ml'lik bir tüp

Tüpün kapağı çevrilerek açılır. Köpekte iki omuz başı arasındaki kıl örtüsü elle aralanarak deri ortaya çıkartılır. Tüpün ucu deri üzerine yerleştirilir ve tüpü sıkarak içeriği bir iki damla veya kısa bir çizgi halinde deri üzerine boşaltılır. 1 ay arayla tedavinin tekrarlanması tavsiye edilir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Doz aşımı yan etkilerin görülme riskini artırabilir; bu nedenle vücut ağırlığı dikkate alınarak doğru doz uygulaması yapılmalıdır.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Topikal kullanım için ektoparazitler

ATCvet Kodu: QP53AX65

5.1 Farmakodinamik özellikler

Fipronil, fenilpirazol grubundan bir insektisit akarısittir. Fipronil, insektlerde merkezi sinir sisteminin normal fonksiyonunu engelleyerek çalışır. GABA reseptör sistemi inhibitördür ve sinirlerin aşırı uyarılmasını engeller. GABA reseptörlerinin fipronil tarafından bloke edilmesi insektlerde eksitasyona ve ölüme sebep olur.

S-metopren bir insekt gelişim inhibitörüdür (IGR). Olgunlaşmamış insektlerin gelişimini inhibe eder. Pirelerde gelişimi durdurarak, gelişmekte olanların ölümüne neden olur. S-metoprenin hayvan üzerindeki ovisidal etkisi, ya direkt olarak yeni çıkan yumurtanın kabuğuna penetre olması veya yetişkin pirelerin kutikulasından direkt emilim sonucu gerçekleşmektedir. S-metopren aynı zamanda larva ve pupa gelişimini de engelleyici etkiye sahiptir.

Fipronil pireleri 24 saat içinde, keneleri (*Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*) ve bitleri ise maruziyet sonrası 48 saat içinde öldürür.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Fipronil ve S-metoprenin deriye uygulamadan sonraki farmakokinetik profilleri köpeklerle çalışılmıştır. Bu çalışmada deriye uygulanan fipronilin sistemik dolaşımdan emilimi yavaş gerçekleşmiştir (%11). Ortalama plazma C_{max} değeri fipronil için 35 ng/ml, fipronil metaboliti fipronil sulfon için 55 ng/ml olarak tespit edilmiştir. Fipronil plazmada yavaş bir şekilde pik plazma konsantrasyonlarına ulaşır (ortalama t_{max} 101 saat) ve yaklaşık 154 saatlik bir terminal yarılanma ömrü ile azalır. Topikal uygulamayı takiben fipronil köpeklerde yoğun bir şekilde fipronil sulfona metabolize olur.

Köpeklere lokal uygulanan S-metoprenin plazma konsantrasyonları tespit limitinin (20 ng/ml) altında çıkmıştır.

Birlikte uygulanan S-metopren ve fipronil (metabolitleri dahil) 1 gün içerisinde köpeklerde kıl örtüsüne iyi bir şekilde dağılır. Fipronil, fipronil sulfon ve S-metoprenin kıl örtüsündeki konsantrasyonları zamanla azalır ve uygulama sonrası en az 60 gün süreyle tespit edilebilir düzeylerde kalır.

Toksikolojik bilgiler:

GABA reseptörlerinin duyarlılığındaki farklılık nedeniyle fipronilin insektler üzerindeki toksisitesi memelilerden daha yüksektir. Fipronilin dişi ratlardaki LD_{50} değeri 175 mg/kg c.a., distile su içerisinde ratlara uygulandığında dermal LD_{50} değeri >2000 mg/kg c.a., tavşanlardaki dermal LD_{50} değeri 354 mg/kg c.a. olarak tespit edilmiştir. S-metoprenin ratlar için oral LD_{50} değeri >5000 mg/kg c.a., tavşanlar için dermal LD_{50} değeri >2000 mg/kg c.a., köpekler için oral LD_{50} değeri >3400 mg/kg c.a. olarak tespit edilmiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Kopovidon
Etanol
Bütilhidroksianisol (BHA) (E320)
Bütilhidroksitoluen (BHT) (E321)
Polisorbat 80
Dietilen glikol monoetil eter

6.2 Geçimsizlikler

Ürünü diğer tıbbi ürünlerle karıştırmayın.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: -

6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Şeffaf blister içerisinde bulunan 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml veya 4.02 ml'lik 3 adet beyaz renkli polifolyo tüp içeren karton kutularda satışa sunulmaktadır. Her kutuda tüp sayısı kadar karneye yapıştırılacak etiketler bulunur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler ilgili mevzuata göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. İlaçlı veya boş ambalajlar havuz ve su kanallarına atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Arma İlaç San. ve Tic. A. Ş. Malıköy Başkent OSB Mah., Atatürk Bulvarı, No: 69, Sincan/ANKARA

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

20/050

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

18.09.2008

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

07.01.2026

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
FİPROVET DROP KÖPEK
Damlatma Çözeltisi
Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit-Akarisit)

BİLEŞİMİ

Fiprovvet Drop Köpek Damlatma Çözeltisi, sarı-amber renkte berrak bir çözelti olup, her ml’de 100 mg fipronil ve 90 mg S-metopren ile antioksidan olarak 0,2 mg bütildihidroksianisol (BHA) (E320) ve 0,1 mg bütildihidroksitoluen (BHT) (E321) içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Fipronil, fenilpirazol grubundan bir insektisit akarısittir. Fipronil, insektlerde merkezi sinir sisteminin normal fonksiyonunu engelleyerek çalışır. GABA reseptör sistemi inhibitördür ve sinirlerin aşırı uyarılmasını engeller. GABA reseptörlerinin fipronil tarafından bloke edilmesi insektlerde eksitasyona ve ölüme sebep olur.

S-metopren bir insekt gelişim inhibitörüdür (IGR). Olgunlaşmamış insektlerin gelişimini inhibe eder. Pirelerde gelişimi durdurarak, gelişmekte olanların ölümüne neden olur. S-metoprenin hayvan üzerindeki ovisidal etkisi, ya direkt olarak yeni çıkan yumurtanın kabuğuna penetre olması veya yetişkin pirelerin kutikulasından direkt emilim sonucu gerçekleşmektedir. S-metopren aynı zamanda larva ve pupa gelişimini de engelleyici etkiye sahiptir.

Fipronil pireleri 24 saat içinde, keneleri (*Dermacentor reticulatus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*) ve bitleri ise maruziyet sonrası 48 saat içinde öldürür.

Farmakokinetik özellikler

Fipronil ve S-metoprenin deriye uygulamadan sonraki farmakokinetik profilleri köpeklerle çalışılmıştır. Bu çalışmada deriye uygulanan fipronilin sistemik dolaşımdan emilimi yavaş gerçekleşmiştir (%11). Ortalama plazma C_{max} değeri fipronil için 35 ng/ml, fipronil metaboliti fipronil sulfon için 55 ng/ml olarak tespit edilmiştir. Fipronil plazmada yavaş bir şekilde pik plazma konsantrasyonlarına ulaşır (ortalama t_{max} 101 saat) ve yaklaşık 154 saatlik bir terminal yarılanma ömrü ile azalır. Topikal uygulamayı takiben fipronil köpeklerde yoğun bir şekilde fipronil sulfona metabolize olur.

Köpeklere lokal uygulanan S-metoprenin plazma konsantrasyonları tespit limitinin (20 ng/ml) altında çıkmıştır.

Birlikte uygulanan S-metopren ve fipronil (metabolitleri dahil) 1 gün içerisinde köpeklerde kıl örtüsüne iyi bir şekilde dağılır. Fipronil, fipronil sulfon ve S-metoprenin kıl örtüsündeki konsantrasyonları zamanla azalır ve uygulama sonrası en az 60 gün süreyle tespit edilebilir düzeylerde kalır.

Toksikolojik bilgiler:

GABA reseptörlerinin duyarlılığındaki farklılık nedeniyle fipronilin insektler üzerindeki toksisitesi memelilerden daha yüksektir. Fipronilin dışı ratlardaki LD₅₀ değeri 175 mg/kg c.a., distile su içerisinde ratlara uygulandığında dermal LD₅₀ değeri >2000 mg/kg c.a., tavşanlardaki dermal LD₅₀ değeri 354 mg/kg c.a. olarak tespit edilmiştir. S-metoprenin ratlar için oral LD₅₀ değeri >5000 mg/kg c.a., tavşanlar için dermal LD₅₀ değeri >2000 mg/kg c.a., köpekler için oral LD₅₀ değeri >3400 mg/kg c.a. olarak tespit edilmiştir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Köpeklerde pire (*Ctenocephalides* spp.), kene (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*) ve ısırıcı bit (*Trichodectes canis*) enfestasyonlarının tedavi ve korunması ile pire kaynaklı alerjik dermatitis tedavisinde destekleyici amaçla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Fipronilin farmakolojik dozu 6.7 mg/kg, S-metoprenin ise 6 mg/kg'dır. Vücut ağırlığına göre önerilen dozlar aşağıdaki gibidir;

Vücut ağırlığı	Uygulama Dozu
2-10 kg	0.67 ml'lik bir tüp
10-20 kg	1.34 ml'lik bir tüp
20-40 kg	2.68 ml'lik bir tüp
40 kg ve üzeri	4.02 ml'lik bir tüp

Tüpün kapağı çevrilerek açılır. Köpekte iki omuz başı arasındaki kıl örtüsü elle aralanarak deri ortaya çıkartılır. Tüpün ucu deri üzerine yerleştirilir ve tüpü sıkarak içeriği bir iki damla veya kısa bir çizgi halinde deri üzerine boşaltılır. 1 ay arayla tedavinin tekrarlanması tavsiye edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Fiprovat Drop Köpek Damlatma Çözeltisi, ergin pirelere karşı 8 hafta süreyle etkilidir. Yumurta, larva ve pupa gelişimini inhibe edici etkisi uygulamadan sonra 8 hafta süreyle devam eder.

Kenelere yönelik akarisit etkisi köpeklerde 4 haftadır (yapılan deneysel çalışmalara dayanarak). Pire kaynaklı alerjik dermatitislerde hasta hayvan ile çevresindeki diğer kedi ve köpeklere aylık uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pire Alerjik Dermatitis tedavisi uygulandığında uygulamadan 24 saat geçmeden köpeğin havuz veya diğer su kaynaklarının içinde yüzmesi engellenmelidir.

Çok sayıda hayvanın bir arada bulunduğu yerlerde pire ve kene problemlerinin optimal kontrolü için ortamdaki tüm kedi ve köpekler uygun bir insektisit ile ilaçlanmalıdır. Ayrıca, ortamın vakumla süpürülmesi, pet yataklarının yıkanması ve çevreye yönelik önlemlerin de alınması tavsiye edilir.

Ürünün etkinliği üzerinde nasıl bir sonuç doğuracağı araştırılmadığından uygulama sonrası 2 gün süreyle hayvanlar yıkanmamalıdır. Ürünün hayvanların gözlerine temasından kaçınılmalıdır. Ürün, hayvanın ulaşamayacağı bir bölgeye uygulanmalı ve tedavi edilen hayvanların birbirlerini yalamalarına izin verilmemelidir. Uygulama yeri kuruyana kadar hayvana dokunulmamalı, hayvanların çocuklarla ve ortamdaki diğer hayvanlarla temas etmesine izin verilmemelidir. Bu nedenle hayvanların gün içinde değil akşamın erken saatlerinde tedavi edilmesi ve yakın zamanda tedavi edilen hayvanların sahipleriyle özellikle de çocuklarla uyumalarına izin verilmemesi önerilmektedir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Hayvanların uygulama bölgesini yalamaları durumunda kısa süreli hipersalivasyon gözlemlenebilir. Çok seyrek de olsa uygulama bölgesinde geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal alopesi, kaşıntı, kızarıklık) ve genel kaşıntı veya alopesi şekillendiği bildirilmiştir. İstisna olarak da aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon, sinirsel semptomlar) veya kusma görüldüğü bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ürün amitraz ile sinerjik etki gösterir. Diğer pire ilaçları ile eş zamanlı olarak kullanmayınız. Ürünü diğer tıbbi ürünlerle karıştırmayın.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı yan etkilerin görülme riskini artırabilir; bu nedenle vücut ağırlığı dikkate alınarak doğru doz uygulaması yapılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

8 haftalıktan küçük köpeklerle uygulanmamalıdır. 2 kg altında olan köpeklerde kullanılmamalıdır. Tavşanlarda ölüme neden olduğundan kullanımı kontrendikedir. Hasta (sistemik hastalık, ateş...) veya güçsüz hayvanlarda kullanılmamalıdır. Bu ürün köpeklerle özel geliştirilmiştir, kedi ve diğer hedef olmayan türlerde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

İlaç ile temas edilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Ellere bulaşması halinde su ve sabunla yıkayınız. Göze teması halinde bol su ile yıkayınız. Uygulama sonrası, kurumadan hayvanlara dokunmayınız.

Ürünün mukoz membran, cilt ve gözlerde irritasyona yol açabilir, bu nedenle ağız, deri ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. İnsektisitler ya da alkole duyarlı olduğu bilinen hayvanlar ve insanların ilaç ile temas etmemesi gerekmektedir. Uygulama esnasında bir şey yiyip içilmemelidir ve sigara kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler ilgili mevzuata göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. İlaçlı veya boş ambalajlar havuz ve su kanallarına atılmamalıdır.

Ürün insektisit akarazit özelliği nedeniyle balıklar, suda yaşayan diğer canlılar ve karada yaşayan bazı artropodlar için toksik etki gösterebilmektedir. Fipronil aktif maddesi, tarım alanında pestisid olarak kullanılmak üzere formüle edildiğinde kuşlar ve bal arıları üzerinde etkili olabilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Şeffaf blister içerisinde bulunan 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml veya 4.02 ml'lik 3 adet beyaz renkli polifolyo tüp içeren karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Her kutuda tüp sayısı kadar karneye yapıştırılacak etiketler bulunur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenahanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 07.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
18.09.2008-20/050

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Arma İlaç San. ve Tic. A. Ş.
Malıköy Başkent OSB Mah., Atatürk Bulvarı, No: 69, Sincan/ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi
Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 Tokat

Dış ambalaj bilgileri

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
FİPROVET DROP KÖPEK
Damlatma Çözeltisi
Veteriner Ektoparaziter (İnsektisit-Akarisit)

BİLEŞİMİ

Her ml'de 100 mg fipronil ve 90 mg S-metopren ile antioksidan olarak 0,2 mg bütildihidroksianisol (BHA) (E320) ve 0,1 mg bütildihidroksitoluen (BHT) (E321) içermektedir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR


Köpeklerde pire, kene ve ısırıcı bit enfestasyonlarının tedavi ve korunması ile pire kaynaklı alerjik dermatitis tedavisinde destekleyici amaçla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Fipronilin farmakolojik dozu 6.7 mg/kg, S-metoprenin ise 6 mg/kg'dır. Vücut ağırlığına göre önerilen dozlar aşağıdaki gibidir;

Vücut ağırlığı	Uygulama Dozu
2-10 kg	0.67 ml'lik bir tüp
10-20 kg	1.34 ml'lik bir tüp
20-40 kg	2.68 ml'lik bir tüp
40 kg ve üzeri	4.02 ml'lik bir tüp

Tüpün kapağı çevrilerek açılır. Köpekte iki omuz başı arasındaki kıl örtüsü elle aralanarak deri ortaya çıkartılır. Tüpün ucu deri üzerine yerleştirilir ve tüpü sıkarak içeriği bir iki damla veya kısa bir çizgi halinde deri üzerine boşaltılır. 1 ay arayla tedavinin tekrarlanması tavsiye edilir.



GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Şeffaf blister içerisinde bulunan 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml veya 4.02 ml'lik 3 adet beyaz renkli polifolyo tüp içeren karton kutularda satışa sunulmaktadır. Her kutuda tüp sayısı kadar karneye yapıştırılacak etiketler bulunur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenahanelerinde satılır. (VHR)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIđI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
18.09.2008-20/050

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Arma İlaç San. ve Tic. A. Ş.
Malıköy Başkent OSB Mah., Atatürk Bulvarı, No: 69, Sincan/ANKARA

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: Alke Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 2.
Kısım 10. Cadde No:7 Tokat

Seri no:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):

İç ambalaj bilgileri

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

FİPROVET DROP KÖPEK

Damlatma Çözeltilisi

100 mg fipronil + 90 mg S-metopren

Seri no:

Son Kullanma Tarihi:

Karne Etiketi

FİPROVET DROP

Karne Etiketi

Arma LOGO

Fiprovvet uygulamalarınızı takip edebilmek için etiketlere uygulama tarihini yazarak aşı karnesine yapıştırınız.