

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

### 1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

FORTEZOL Oral Tablet

### 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 tablet:

Aktif madde:

Oksfendazol.....450 mg

Oksiklozanid.....900 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

### 3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Beyaz krem renk arası ortadan çentikli kenarları düz oblong, oral tablet

### 4. KLİNİK ÖZELLİKLER

#### 4.1 Hedef tür

Sığır, dana, buzağı, koyun ve kuzu

#### 4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Fortezol Oral Tablet, sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları, şeritler ve karaciğer kelebeklerine karşı antihelmintik amaçlı kullanılır.

Etkili olduğu parazitler:

#### Sığırlarda

**Karaciğer Kelebekleri:** *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*'nın ergin şekillerine karşı etkilidir.

**Akciğer Kıl Kurtları:** *Dictyocaulus viviparus*

**Barsak Şeritleri:** *Moniezia sp.*

**Mide Barsak Kıl Kurtları:** *Ostertagia sp.*, *Nematodirus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Bunostomum sp.*, *Haemonchus sp.*, *Trichuris sp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum sp.* türleri ve bunların larval ve yumurta şekillerine etkilidir.

#### Koyunlarda

**Karaciğer Kelebekleri:** *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*'nın ergin şekillerine karşı etkilidir.

**Akciğer Kıl Kurtları:** *Dictyocaulus filaria*.

**Barsak Şeritleri:** *Moniezia sp.*

**Mide barsak Kıl Kurtları:** *Ostertagia sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Nematodirus sp.*, *T.colubriformis*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomum sp.*, *Haemonchus sp.*, *Chabertia ovina*, *Trichuris sp.*, *Oesophagostomum sp.* türleri ve bunların larval ve yumurta şekillerine etkilidir.

#### 4.3 Kontrendikasyonlar

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

#### 4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

-

#### 4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.

- Sağaltımda, uygulamanın 1-2 ay sonra tekrarlanması önerilir.
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılarak ve ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
- İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

İlacın deriye temasından minimum ölçüde sakınıınız.

Mümkünse ilaçlama sırasında lastik eldiven ve koruyucu elbise kullanınız.

İlaç kullanımı sonrası elinizi bol akan su ile yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar

#### 4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Sığır ve koyunlarda Oksiklozanid'in tolerans verileri, tek seferde uygulanan nispeten düşük dozların (15mg/kg vücut ağırlığı) merkezi sinir sistemi ve bağırsak fonksiyonları üzerinde istenmeyen etkiler (davranış bozukluğu, diyare ve iştahsızlık) oluşturabileceğini göstermiştir.

#### 4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

#### 4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Oksfendazol'un trematodlara karşı bromsalanlarla birlikte kullanılmaması önerilir.

Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında sığırlarda abortlara ve koyunlarda da ölümlere neden olabilirler.

#### 4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki gibi uygulanır.

##### Farmakolojik doz:

Koyunda 5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol- 15-20mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid

Sığırda 5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol -10-15mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid

##### Pratik doz:

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuzu   | :1/2 tablet (30 kg vücut ağırlığı için)                                               |
| Koyun  | :1 tablet (60 kg vücut ağırlığı için)                                                 |
| Buzağı | :1 tablet (60 kg vücut ağırlığı için)                                                 |
| Dana   | :2 tablet (120 kg vücut ağırlığı için)                                                |
| Sığır  | :3 tablet (180 kg vücut ağırlığı için)                                                |
| Sığır  | :4 tablet (240 kg ve üzeri vücut ağırlığı için) (Sığırlarda maksimum doz 4 tablettir) |

Tabletler yutturulur ya da su içine dağıtılarak şişeye içirilir.

#### 4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Oksiklozanid sığır ve koyunlarda yüksek dozlarda verildiği takdirde toksisite belirtilerinin şiddeti artabilmekte (Terapotik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksi, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir.) ve 50 mg/kg vücut ağırlığı ve üzeri dozlarda ölüm şekillenebilmektedir. Toksik belirtiler durumunda klinik semptomlara göre sağaltıma geçilmelidir.

#### 4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

**Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlı) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.**

## **5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER**

Farmakoterapötik Grup: Antihelmintikler, Oksfendazol ve kombinasyonları  
ATCvet Kodu: QP52AC52

### **5.1 Farmakodinamik özellikler**

Oksfendazol, bir benzimidazol türevi olup; parazit helmintlerin enerji-üretim metabolizmalarını bozmak suretiyle antihelmintik etki gösterir. Parazitlerde fumarat redüktazın etkinliğini engelleyerek etkili olur. Engelleme sonucu glikoz emilmesini önler, glikojen kullanımını artırır ve ATP üretimini azaltır. Bunun sonucunda kullanılabilir enerjiden yoksun kalan parazit ölür. Oksiklozanid, salisilanilid türevi suda çözünmeyen bir maddedir. *F. hepatica* ve *F. gigantica*'nın ergin şekillerine etkilidir. Oksiklozanid parazitlerde bir yandan fumarat redüktaz enzimini inhibe ederken, diğer yandan da enerji metabolizmasında gerekli fosforilaz bağlantısını koparmak suretiyle güçlü antinematodal etkisini gösterir, emilimi hızlıdır.

### **5.2 Farmakokinetik özellikler**

Oksfendazol oral yolla alındığında sindirim kanalında çok az emilir. Oksfendazol sığır ve koyunlarda, 6 saatte plazmada doruk yoğunluğa ulaşır ve yarı ömrü yaklaşık 6 saat kadardır. Aktif madde ve metabolitlerin vücuttan atılımları yavaştır. %26 oranında idrarla, %63 oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid ruminantların sindirim kanalından iyi emilir ve 24-48 saat içinde plazmada doruk yoğunluğa erişir. Sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde en yüksek yoğunluklarda birikir ve glukuronid bileşiği halinde safrayla atılır.

## **6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER**

### **6.1 Yardımcı maddeler**

Primojel  
Magnezyum Stearat  
Mısır Nişastası

### **6.2 Geçimsizlikler**

-

### **6.3 Raf ömrü**

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay  
Açılmış ürün (yarım tablet) 14 gün içinde tüketilmelidir.

### **6.4 Muhafaza şartları**

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

### **6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu**

Fortezol Oral Tablet; 10 tabletlik alüminyum folyo-PVC kaplı blister ambalajlarda, karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

**6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler**  
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

**7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

**Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

**8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI**

22/084

**9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ**

17.05.2010

**10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ**

24.09.2025

## **Prospektüs Metni**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**FORTEZOL**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

### **BİLEŞİMİ**

1 tablet; 450 mg Oksfendazol ve 900 mg Oksiklozanid içeren beyaz krem renk arası, ortadan çentikli, kenarları düz oblong tabletlerdir.

### **FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER**

#### **Farmakodinamik özellikler**

Oksfendazol, bir benzimidazol türevi olup; parazit helmintlerin enerji-üretim metabolizmalarını bozmak suretiyle antihelmintik etki gösterir. Parazitlerde fumarat redüktazın etkinliğini engelleyerek etkili olur. Engelleme sonucu glikoz emilmesini önler, glikojen kullanımını artırır ve ATP üretimini azaltır. Bunun sonucunda kullanılabilir enerjiden yoksun kalan parazit ölür. Oksiklozanid, salisilanilid türevi suda çözünmeyen bir maddedir. *F. hepatica* ve *F. gigantica*'nın ergin şekillerine etkilidir. Oksiklozanid parazitlerde bir yandan fumarat redüktaz enzimini inhibe ederken, diğer yandan da enerji metabolizmasında gerekli fosforilaz bağlantısını koparmak suretiyle güçlü antinematodal etkisini gösterir, Emilimi hızlıdır.

#### **Farmakokinetik özellikler**

Oksfendazol oral yolla alındığında sindirim kanalında çok az emilir. Oksfendazol sığır ve koyunlarda, 6 saatte plazmada doruk yoğunluğa ulaşır ve yarı ömrü yaklaşık 6 saat kadardır. Aktif madde ve metabolitlerin vücuttan atılımları yavaştır. %26 oranında idrarla, %63 oranında gaita ile atılır.

Oksiklozanid ruminantların sindirim kanalından iyi emilir ve 24-48 saat içinde plazmada doruk yoğunluğa erişir. Sindirim kanalı, karaciğer ve böbreklerde en yüksek yoğunluklarda birikir ve glukuronid bileşiği halinde safrayla atılır.

### **KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR**

Fortezol Oral Tablet, sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları, şeritler ve karaciğer keleklerine karşı antihelmintik amaçlı kullanılır.

Etkili olduğu parazitler:

#### **Sığırlarda**

**Karaciğer Kelekleri:** *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*'nın ergin şekillerine karşı etkilidir.

**Akciğer Kıl Kurtları:** *Dictyocaulus viviparus*

**Barsak Şeritleri:** *Moniezia sp.*

**Mide Barsak Kıl Kurtları:** *Ostertagia sp.*, *Nematodirus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Bunostomum sp.*, *Haemonchus sp.*, *Trichuris sp.*, *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum sp.* türleri ve bunların larval ve yumurta şekillerine etkilidir.

#### **Koyunlarda**

**Karaciğer Kelekleri:** *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*'nın ergin şekillerine karşı etkilidir.

**Akciğer Kıl Kurtları:** *Dictyocaulus filaria*.

**Barsak Şeritleri:** *Moniezia sp.*

**Mide barsak Kıl Kurtları:** *Ostertagia sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Nematodirus sp.*, *T.colubriformis*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomum sp.*, *Haemonchus sp.*, *Chabertia ovina*, *Trichuris sp.*, *Oesophagostomum sp.* türleri ve bunların larval ve yumurta şekillerine etkilidir.

### **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki gibi uygulanır.

#### **Farmakolojik doz:**

Koyunda 5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol- 15-20mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid  
Sığırdaki 5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol -10-15mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid

#### **Pratik doz:**

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuzu   | :1/2 tablet (30 kg vücut ağırlığı için)                                               |
| Koyun  | :1 tablet (60 kg vücut ağırlığı için)                                                 |
| Buzağı | :1 tablet (60 kg vücut ağırlığı için)                                                 |
| Dana   | :2 tablet (120 kg vücut ağırlığı için)                                                |
| Sığır  | :3 tablet (180 kg vücut ağırlığı için)                                                |
| Sığır  | :4 tablet (240 kg ve üzeri vücut ağırlığı için) (Sığırlarda maksimum doz 4 tablettir) |

Tabletler yutturulur ya da su içine dağıtılarak şişeye içirilir.

### **ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR**

- Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.
- Sağaltımda, uygulamanın 1-2 ay sonra tekrarlanması önerilir.
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılarak ve ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
- İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.

#### **Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım**

Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

### **İSTENMEYEN ETKİLER**

Sığır ve koyunlarda Oksiklozanid'in tolerans verileri, tek seferde uygulanan nispeten düşük dozların (15mg/kg vücut ağırlığı) merkezi sinir sistemi ve bağırsak fonksiyonları üzerinde istenmeyen etkiler (davranış bozukluğu, diyare ve iştahsızlık) oluşturabileceğini göstermiştir.

### **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ**

Oksfendazol'un trematodlara karşı bromsalanlarla birlikte kullanılmaması önerilir.

Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında sığırlarda abortlara ve koyunlarda da ölümlere neden olabilirler.

### **DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT**

Oksiklozanid sığır ve koyunlarda yüksek dozlarda verildiği takdirde toksisite belirtilerinin şiddeti artabilmekte (Terapotik endeksinin çok üzerinde yüksek dozlarda verildiğinde, iştahsızlık, depresyon, ataksi, yere yatma ve ayağa kalkamama, solunum hızlanması, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler ortaya çıkabilir.) ve 50 mg/kg vücut ağırlığı ve üzeri dozlarda ölüm şekillenebilmektedir. Toksik belirti durumunda klinik semptomlara göre sağaltıma geçilmelidir.

### **GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI**

**Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 saım) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.**

#### **KONTRENDİKASYONLAR**

Aşırı karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

#### **GENEL UYARILAR**

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

#### **UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER**

İlacın deriye temasından minimum ölçüde sakınınız.

Mümkünse ilaçlama sırasında lastik eldiven ve koruyucu elbise kullanınız.

İlaç kullanımı sonrası elinizi bol akan su ile yıkayınız.

#### **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ürün (yarım tablet) 14 gün içinde tüketilmelidir.

#### **KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR**

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

#### **TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ**

Fortezol Oral Tablet; 10 tabletlik alüminyum folyo-PVC kaplı blister ambalajlarda, karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

#### **SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

#### **PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ**

24.09.2025

#### **T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO**

17.05.2010-22/084

#### **PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

**Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

#### **ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ**

**AKSU Eczacılık ve İlaç San İth. İhr. Ltd. Şti.**

Batı Sitesi Mah. Arif Halıcı Sok. No: 32-34-36-38 Yenimahalle/ANKARA

**Damla İlaç ve Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.**

Aydınlı-Orhanlı Mevkii, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Sama Cad. No:9 (L3-1

Parsel) Tuzla / İSTANBUL

**Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.**

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 8. Cadde No:11 Tepeören- Tuzla/  
İSTANBUL

**İç Ambalaj Metni**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**FORTEZOL**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

1 tablette 450 mg Oksfendazol ve 900 mg Oksiklozanid içerir.

**Seri No:**                      **Üretim Ta.:**                      **Son Kul. Ta.:**

**Dış Ambalaj Metni**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

**FORTEZOL**

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

1 tablet; 450 mg Oksfendazol ve 900 mg Oksiklozanid içeren beyaz krem renk arası, ortadan çentikli, kenarları düz oblong tabletlerdir

FORTEZOL Oral Tablet, sığır ve koyunlarda mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları, şeritler ve karaciğer kebeklerine karşı antihelmintik amaçlı kullanılır.

**Farmakolojik doz:**

Koyunda 5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol- 15-20mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid

Sığırdada 5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol -10-15mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid

**Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.**

**Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlı) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.**

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde ve kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ürün (yarım tablet) 14 gün içinde tüketilmelidir.

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO**

17.05.2010-22/084

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

**ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ**

AKSU Eczacılık ve İlaç San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Batı Sitesi Mah. Arif Halıcı Sok. No: 32-34-36-38 Yenimahalle/ANKARA

Damla İlaç ve Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı-Orhanlı Mevkii, Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Sama Cad. No:9 (L3-1  
Parsel) Tuzla / İSTANBUL

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 8. Cadde No:11 Tepeören- Tuzla/  
İSTANBUL

**SERİ NO:**

**Ü.T.:**

**S.K.T.:**

**KDV DÂHİL P.S.F. (sadece dış ambalaj etiketi):**