

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

FRONTLINE Sprey

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir ml;

Aktif madde:

Fipronil 2.5 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Sprey

Renksiz ve berrak sıvı

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef Tür

Kediler ve köpekler

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

5 kg'dan daha ağır kedi ve köpeklerde fipronile duyarlı parazitlerin yol açtığı enfestasyonlar.

Kedilerde ve köpeklerde;

- Pire ve kenelerin neden olduğu enfestasyonların tedavisi ve önlenmesi
- Isırcı bitlerin eliminasyonu

Köpeklerde, yeni pire enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi 60 ile 90 gün arasında değişir. Köpeklerde kene enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi kene türüne bağlı olarak üç ile beş hafta arasında değişmektedir.

Kedilerde, yeni pire enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi yaklaşık 40 gündür. Yeni kene enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi ise 2 haftadır.

Pire Alerjik Dermatiti'nin (PAD) kontrolü için tedavi stratejisinin bir parçası olarak da kullanılabilir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Hasta hayvanlarda (sistemik hastalıklar, ateş) veya nekahet dönemindeki hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Bazen ölümcül yan etkileri olabileceğinden tavşanlarda kullanılmamalıdır.

Ürünün etken maddesine veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığın söz konusu olduğu durumlarda kullanmayınız.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Ürünün hayvanın gözleri ile temasından kaçınınız.

Tavsiye edilen dozu aşmayınız.

Zarar görmüş deriye doğrudan püskürtmeyiniz.

Tedavi edilen hayvanları iyi havalandırılan bir odada kurumaya bırakınız.

Tüyleri tamamen kurumadan, hayvanları kapalı bir alana veya hayvan taşıma çantalarına koymayınız.

Tolerans ve etkinlikle ilgili spesifik verilerin mevcut olmadığı durumlarda, ürünün kediler ve köpekler dışındaki diğer türlerde kullanılması önerilmez.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Hasarlı ve doku kayıplı deri üzerine uygulama yapılmamalıdır.

Ürünün, hayvanın yalayamayacağı bir bölgeye uygulanması ve hayvanların birbirini yalamamasını sağlamak önemlidir.

Uygulamayı takip eden 2 gün süresince hayvanların su ile temasından kaçınılmalıdır (“Kullanılmamış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler” başlıklı bölüme bakınız). Ürünün uygulanmasından önceki ve ürünün uygulanmasını takip eden 2 gün boyunca hayvanları şampuanla yıkamayınız.

Hayvanlara zaman zaman kenelerin tutunduğu gözlemlenebilir. Bu nedenle, eğer koşullar elverişsiz ise, hayvanlara enfeksiyöz hastalık bulaşma olasılığını göz önünde bulundurunuz. Evcil hayvan pireleri, çoğu zaman, hayvanların kutularını, uyuma alanlarını, halı ve koltuklar gibi onların her zamanki dinlenme alanlarını enfeste eder. Büyük bir istila durumunda, bu yerlerin tedavinin başlangıcında uygun bir insektisit ile ilaçlanması ve elektrikli süpürgeyle düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Bu ürün mukoza ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, ürünün ağız ve gözlerle temasından kaçınmak gerekir.

İnsektisitlere veya alkole karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı bulunan hayvanlar veya kullanıcılar ürünle her türlü temastan kaçınmalıdır.

Ürün içeriğinin el ile temasından kaçınınız. Temas durumunda, ellerinizi su ve sabunla yıkayınız.

Gözün ilaca kazara maruz kalması durumunda, gözünüzü suyla dikkatlice durulayınız.

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Tedavi edilen hayvanları ellemez ve uygulama bölgesi tamamen kuruyuncaya kadar çocukların tedavi edilen hayvanlarla oynamasına izin vermeyiniz. Bu nedenle, hayvanların gündüz vakti değil, akşamın erken saatlerinde tedavi edilmeleri ve yakın zamanda tedavi edilen hayvanların sahipleri, özellikle de çocuklar ile uyumasına izin verilmemesi önerilmektedir.

Uygulama esnasında sigara kullanmayınız ve bir şey yiyip içmeyiniz.

Tüm insektisitlerde olduğu gibi, uygulamaya sırasında eldiven takılması ve hayvanların iyi havalandırılan bir yerde tedavi edilmesi tavsiye edilmektedir.

Ürünü solumayınız.

(iii) Diğer uyarılar

Fipronil suda yaşayan organizmaları olumsuz etkileyebilir. Havuzları, su yollarını veya hendekleri ürün veya boş kaplarla kirletmeyiniz.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Ürünün yalanması durumunda, yardımcı maddenin doğası gereği hayvanlarda kısa bir süre boyunca aşırı tükürük salgılaması (hipersalivasyon) gözlemlenebilir.

Son derece seyrek görülen yan etkiler arasında, kullanımdan sonra geçici deri reaksiyonları, eritem, kaşıntı veya alopesi bildirilmiştir.

İstisnai olarak, kullanımdan sonra aşırı tükürük salgılama (hipersalivasyon), geçici nörolojik semptomlar (hiperestezi, keyifsizlik, sinirsel semptomlar), kusma veya solunum semptomları gözlemlenmiştir. Gözlemlenen etkiler 6 aydan küçük yavru köpeklerde daha şiddetli olabilir.

Doz aşımı yapmayınız.

Advers reaksiyonların sıklığı ise aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

- çok yaygın (bir tedavi sırasında 10 hayvandan 1'den fazlasında advers reaksiyon görülmesi)
- yaygın (100 hayvanda 1'den fazla, ancak 10 hayvandan az)
- yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla, ancak 10 hayvandan az)
- seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla, ancak 10 hayvandan az)
- çok seyrek (izole bildirimler de dahil 10.000 hayvanda 1'den az)

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Laboratuvar çalışmaları sıçan ve tavşanlarda fipronilin teratojenik etkisine dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır.

Emziren dişilerin tedavisi sonrasında fipronil yavru köpeklerde iyi tolere edilmektedir.

Dişi kedi ve köpeklerin gebelikleri sırasında, dişi kedilerin emzirme dönemlerinde ilacın kullanımıyla ilgili herhangi bir spesifik çalışma bulunmamaktadır. Ürün, veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Etkin madde olarak fipronil içeren diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanmayınız.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Uygulama yolu: Deriye püskürtme.

Dozaj, her vücut ağırlığı kilogramı için 7.5 mg fipronile ya da kg başına 3 ml çözeltiye (her kg için 6 pompa sıkımı (100 ml'lik takdim şekli) veya 2 pompa sıkımı (250 ml ve 500 ml'lik takdim şekli)) eşdeğerdir.

Tüy uzunluğunu hesaba katmak ve deriden yeterli emilimi sağlamak amacıyla bu dozaj her kg için 15 mg fipronile ya da kg başına 6 ml çözeltiye (her kg için 12 pompa sıkımı (100 ml'lik takdim şekli) veya 4 pompa sıkımı (250 ml ve 500 ml'lik takdim şekli)) kadar artırılabilir.

Herhangi bir tolerans verisi mevcut değilse, minimum tedavi aralığı 4 haftadır.

Uygulama yöntemi: Şişeyi yaklaşık 10-20 cm mesafede tutarak hayvanın vücut yüzeyinin tamamına püskürtünüz. Tüyleri eşit ve homojen bir biçimde ıslatmak amacıyla, ürünü hayvanın vücudunun tamamını kaplayacak şekilde tüylerin uzama yönünün tersine doğru uygulayınız. Ürünün hayvanın derisine kadar penetre olmasını sağlayınız. Uygulama yapılan bölgeyi silmeden kurumaya bırakınız.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Doz aşımı durumunda, ilacın yan etkilere yol açma riski artabilir ("İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)" başlıklı bölüme bakınız).

Doz aşımı halinde, uygun bir semptomatik tedavi uygulayınız. Bilinen bir antidotu yoktur.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

Uygulanamaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: topikal kullanıma yönelik diğer harici antiparaziter ajanlar.

ATC-vet kodu: QP53AX13.

5.1 Farmakodinamik özellikler

Fipronil, fenilpirazol ailesine ait bir insektisit-akarisittir. Fipronil, ligand kapılı klorür kanallarına özellikle nörotransmitter gamma-aminobütirik asit (GABA) kapılı olanlara etki etmektedir. Böylelikle klorür iyonlarının presinaptik ve postsinaptik geçişini hücre membranları arasında bloke etmektedir. Bu durum insektlerin veya akarların merkezi sinir sistemlerinin kontrolsüz aktivitesine ve ölümüne neden olmaktadır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Köpeklerde, spreyin deriye uygulanmasından sonra, fipronilin deriden geçişi son derece düşük, hatta ihmal edilebilir seviyededir. Dozaj yönteminin miktar tayin limitinin 0.25 µg/g olduğu düşünüldüğünde, fipronil tüyler üzerinde çok uzun bir süre kalmaktadır (ortalama 52.5 ± 11.5 gün).

Tüm türlerde, fipronil ağırlıklı olarak kendi sülfon türevi formunda metabolize edilir. Fipronilin bu sülfon türevi de onun gibi insektisit ve akarisit özellikler taşır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Kopovidon
İzopropil alkol
Saf su

6.2 Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

6.4 Muhafaza şartları

30°C'yi geçmeyecek şekilde dondurmadan, orijinal ambalajında saklayınız. Ürünü nemden koruyunuz. Oldukça yanıcıdır. Her türlü alev veya ısı kaynağından uzakta saklayınız.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

100 ml, 250 ml ve 500 ml'lik beyaz renkli yüksek yoğunluklu, 0.5 ml'lik (100 ml'lik takdim şekli) veya 1.5 ml'lik (250 ml ve 500 ml'lik takdim şekli) mekanik sprey başlıklı polietilen şişe içerisinde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

Tüm ambalaj boyutları piyasada bulunmayabilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış tüm veteriner tıbbi ürünler veya bu tür veteriner tıbbi ürünlerinden kaynaklanan atık materyaller; yerel gerekliliklere uygun şekilde imha edilmelidir. Atık su veya drenaj sistemlerine atılarak imha edilmemelidir. Fipronil suda yaşayan organizmaları olumsuz etkileyebilir. Havuzları, su yollarını veya hendekleri ürün veya boş kaplarla kirletmeyiniz.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sok.
Nidakule Levent, No:7-9 Kat:15/16
Şişli-İstanbul
Tel: 0212 329 11 00
Fax: 0212 329 11 01

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

006/0588

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

10.09.1998

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

13.08.2025

Prospektüs, Dış Etiket (100 ml, 250 ml ve 500 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

FRONTLINE

Sprey

Ektoparaziter (İnsektisit-Akarisit)

BİLEŞİMİ

FRONTLINE Sprey, 2.5 mg/ml fipronil içeren renksiz ve berrak sıvıdır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Fipronil, fenilpirazol ailesine ait bir insektisit-akarisittir. Fipronil, ligand kapılı klorür kanallarına özellikle nörotransmitter gamma-aminobütirik asit (GABA) kapılı olanlara etki etmektedir. Böylelikle klorür iyonlarının presinaptik ve postsinaptik geçişini hücre membranları arasında bloke etmektedir. Bu durum insektlerin veya akarların merkezi sinir sistemlerinin kontrolsüz aktivitesine ve ölümüne neden olmaktadır.

Köpeklerde, spreyn deriye uygulanmasından sonra, fipronilin deriden geçişi son derece düşük, hatta ihmal edilebilir seviyededir. Dozaj yönteminin miktar tayin limitinin 0.25 µg/g olduğu düşünüldüğünde, fipronil tüyler üzerinde çok uzun bir süre kalmaktadır (ortalama 52.5 ± 11.5 gün).

Tüm türlerde, fipronil ağırlıklı olarak kendi sülfon türevi formunda metabolize edilir. Fipronilin bu sülfon türevi de onun gibi insektisit ve akarisit özellikler taşır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

5 kg'dan daha ağır kedi ve köpeklerde fipronile duyarlı parazitlerin yol açtığı enfestasyonlar.

Kedilerde ve köpeklerde;

- Pire ve kenelerin neden olduğu enfestasyonların tedavisi ve önlenmesi
- Isırcı bitlerin eliminasyonu

Köpeklerde, yeni pire enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi 60 ile 90 gün arasında değişir. Köpeklerde kene enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi kene türüne bağlı olarak üç ile beş hafta arasında değişmektedir.

Kedilerde, yeni pire enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi yaklaşık 40 gündür. Yeni kene enfestasyonlarına karşı etkinlik süresi ise 2 haftadır.

Pire Alerjik Dermatiti'nin (PAD) kontrolü için tedavi stratejisinin bir parçası olarak da kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Deriye püskürtme yolu ile uygulanır.

Dozaj, her vücut ağırlığı kilogramı için 7.5 mg fipronile ya da kg başına 3 ml çözeltiye (her kg için 6 pompa sıkımı (100 ml'lik takdim şekli) veya 2 pompa sıkımı (250 ml ve 500 ml'lik takdim şekli)) eşdeğerdir.

Tüy uzunluğunu hesaba katmak ve deriden yeterli emilimi sağlamak amacıyla bu dozaj her kg için 15 mg fipronile ya da kg başına 6 ml çözeltiye (her kg için 12 pompa sıkımı (100 ml'lik takdim şekli) veya 4 pompa sıkımı (250 ml ve 500 ml'lik takdim şekli)) kadar arttırılabilir.

Herhangi bir tolerans verisi mevcut değilse, minimum tedavi aralığı 4 haftadır.

Uygulama yöntemi: Şişeyi yaklaşık 10-20 cm mesafede tutarak hayvanın vücut yüzeyinin tamamına püskürtünüz. Tüylere eşit ve homojen bir biçimde ıslatmak amacıyla, ürünü hayvanın vücudunun tamamını kaplayacak şekilde tüylerin uzama yönünün tersine doğru uygulayınız. Ürünün hayvanın derisine kadar penetre olmasını sağlayınız. Uygulama yapılan bölgeyi silmeden kurumaya bırakınız.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ürünün hayvanın gözleri ile temasından kaçınınız. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Zarar görmüş deriye doğrudan püskürtmeyiniz. Tedavi edilen hayvanları iyi havalandırılan bir odada kurumaya bırakınız. Tüylere tamamen kurumadan, hayvanları kapalı bir alana veya hayvan taşıma çantalarına koymayınız. Tolerans ve etkinlik ile ilgili spesifik verilerin mevcut olmadığı durumlarda, ürünün kediler ve köpekler dışındaki diğer türlerde kullanılması önerilmez. Hasarlı ve doku kayıplı deri üzerine uygulama yapılmamalıdır. Ürünün, hayvanın yalayamayacağı bir bölgeye uygulanması ve hayvanların birbirini yalamamasını sağlamak önemlidir. Uygulamayı takip eden 2 gün süresince hayvanların su ile temasından kaçınılmalıdır (Kullanım Sonu İmha Ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar başlıklı bölüme bakınız).

Ürünün uygulanmasından önceki ve ürünün uygulanmasını takip eden 2 gün boyunca hayvanları şampuanla yıkamayınız. Hayvanlara zaman zaman kenelerin tutunduğu gözlemlenebilir. Bu nedenle, eğer koşullar elverişsiz ise, hayvanlara enfeksiyöz hastalık bulaşma olasılığını göz önünde bulundurunuz. Evcil hayvan pireleri, çoğu zaman, hayvanların kutularını, uyuma alanlarını, halı ve koltuklar gibi onların her zamanki dinlenme alanlarını enfeste eder. Büyük bir istila durumunda, bu yerlerin tedavinin başlangıcında uygun bir insektisitle ilaçlanması ve elektrikli süpürgeyle düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Laboratuvar çalışmaları sıçan ve tavşanlarda fipronilin teratojenik etkisine dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. Emziren dişilerin tedavisi sonrasında fipronil yavru köpeklerde iyi tolere edilmektedir. Dişi kedi ve köpeklerin gebelikleri sırasında, dişi kedilerin emzirme dönemlerinde ilacın kullanımıyla ilgili herhangi bir spesifik çalışma bulunmamaktadır. Ürün, veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesinden sonra kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Ürünün yalanması durumunda, yardımcı maddenin doğası gereği hayvanlarda kısa bir süre boyunca aşırı tükürük salgılama (hipersalivasyon) gözlemlenebilir.

Son derece seyrek görülen yan etkiler arasında, kullanımdan sonra geçici deri reaksiyonları, eritem, kaşıntı veya tüy dökülmesi bildirilmiştir.

İstisnai olarak, kullanımdan sonra aşırı tükürük salgılama (hipersalivasyon), geçici nörolojik semptomlar (hiperestezi, keyifsizlik, sinirsel semptomlar), kusma veya solunum semptomları gözlemlenmiştir. Gözlemlenen etkiler 6 aydan küçük yavru köpeklerde daha şiddetli olabilir.

Doz aşımı yapmayınız.

Advers reaksiyonların sıklığı ise aşağıdaki gibi sınıflandırılır.

- çok yaygın (bir tedavi sırasında 10 hayvandan 1'den fazlasında advers reaksiyon görülmesi)
- yaygın (100 hayvanda 1'den fazla, ancak 10 hayvandan az)
- yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla, ancak 10 hayvandan az)
- seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla, ancak 10 hayvandan az)
- çok seyrek (izole bildirimler de dahil 10.000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Etkin madde olarak fipronil içeren diğer ilaçlarla eşzamanlı olarak kullanmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımı durumunda, ilacın yan etkilere yol açma riski artabilir (İstenmeyen etkiler başlıklı bölüme bakınız). Doz aşımı halinde, uygun bir semptomatik tedavi uygulayınız. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Hasta hayvanlarda (sistemik hastalıklar, ateş) veya nekahet dönemindeki hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Bazen ölümcül yan etkileri olabileceğinden tavşanlarda kullanılmamalıdır.

Ürünün etken maddesine veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığın söz konusu olduğu durumlarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Bu ürün mukoza ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, ürünün ağız ve gözlerle temasından kaçınmak gerekir. İnsektisitlere veya alkole karşı bilinen bir aşırı duyarlılığı bulunan hayvanlar veya kullanıcılar ürünle her türlü temastan kaçınmalıdırlar. Ürün içeriğinin el ile temasından kaçınınız. Temas durumunda, ellerinizi su ve sabunla yıkayınız. Gözün ilaca kazara maruz kalması durumunda, gözünüzü suyla dikkatlice durulayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız. Tedavi edilen hayvanları ellemeyiniz ve uygulama bölgesi tamamen kuruyuncaya kadar çocukların tedavi edilen hayvanlarla oynamasına izin vermeyiniz. Bu nedenle, hayvanların

gündüz vakti değil, akşamın erken saatlerinde tedavi edilmeleri ve yakın zamanda tedavi edilen hayvanların sahipleri, özellikle de çocuklar ile uyumasına izin verilmemesi önerilmektedir. Uygulama esnasında sigara kullanmayınız ve bir şey yiyip içmeyiniz. Tüm insektisitlerde olduğu gibi, uygulamaya sırasında eldiven takılması ve hayvanların iyi havalandırılan bir yerde tedavi edilmesi tavsiye edilmektedir. Ürünü solumayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

30°C'yi geçmeyecek şekilde dondurmadan, orijinal ambalajında saklayınız. Ürünü nemden koruyunuz. Oldukça yanıcıdır. Her türlü alev veya ısı kaynağından uzakta saklayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış tüm veteriner tıbbi ürünler veya bu tür veteriner tıbbi ürünlerinden kaynaklanan atık materyaller; yerel gerekliliklere uygun şekilde imha edilmelidir. Atık su veya drenaj sistemlerine atılarak imha edilmemelidir. Fipronil suda yaşayan organizmaları olumsuz etkileyebilir. Havuzları, su yollarını veya hendekleri ürün veya boş kaplarla kirletmeyiniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 ml, 250 ml ve 500 ml'lik beyaz renkli yüksek yoğunluklu, 0.5 ml'lik (100 ml'lik takdim şekli) veya 1.5 ml'lik (250 ml ve 500 ml'lik takdim şekli) mekanik sprey başlıklı polietilen şişe içerisinde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, özel hayvan hastaneleri ve veteriner muayenahanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 13.08.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

10.09.1998 – 006/0588

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Harman 1 Sok.
Nidakule Levent, No:7-9 Kat:15/16
Şişli-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
4 Chemin Du Calquet
31000 Toulouse-Fransa

Seri No:

Son Kull. Ta.:

KDV Dahil Per. Sat. Fi.: