

Prospektüs+ic/dış etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

GABBROCOL

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Gabbrocol, beyaz homojen toz olup, her kg'ında:

Aminosidin sülfat 100 g (70 g aminosidin baza eşdeğer) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Aminosidin (paramomisin), Aminoglikozid grubundan bir antibiyotiktir. Aminosidin (paramomisin) pek çok Gram negatif bakteri ile bazı Gram pozitif bakterilere ve protozoonlara karşı etkilidir. Etkisini ribozomlara irreversible bağlanarak, protein sentezini aksatmak yoluyla gösterir. Etki spektrumuna *Salmonella typhimurium* ve *S. Pullorum*, *E. Coli*, *Streptococcus agalatae*, *S. Equisimilis*, *S.hyicus*, *Diplococcus pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Stapylococci*, *Brucella abortus* ve *B. melitensis* ile daha yüksek konsantrasyonlarda *Mycobacterium tuberculosis* gibi bakteriler ve *Cryptosporidium parvum*, *Entamoeba histolytica*, *Trichomonas sp.*, *Giardia intestinali*, *Leishmania sp.* gibi protozoonlar girer.

Oral yolla alındıktan sonra kısa sürede etkisini gösteren aminosidin, gastrointestinal sistemde kalmakta ve sindirim sisteminden çok az miktarda emilmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki patojenlere karşı yüksek seviyede etki sağlar. Aminosidin özellikle Esherichia Coli, Salmonella ve Cryptosporidium'lar tarafından oluşturulan enteritislerin tedavisinde etkilidir. Diğer antibiyotiklerle kros-rezistans gözlenmez.

ENDİKASYONLARI

Buzağılarda; Esherichia Coli, Salmonella spp. Ve Cryptosporidium parvum tarafından oluşturulan enteritislerin tedavisinde ve korunmasında:

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Buzağılar kolibasillozis ve salmonellozis için 25-50 mg aminosidin sülfat / kg canlı ağırlık, cryptosporidiozis için 50-100 mg aminosidin sülfat / kg canlı ağırlık hesabıyla içme suyuna veya süte katılarak oral yolla kullanılır.

Buzağılarda	Dozu	Kullanım Süresi
Kolibasillozis, Salmonellozis	25-50 g Gabbrocol / 100 kg canlı ağırlık / gün	3-5 gün
Cryptosporidiosis	50-100 g Gabbrocol / 100 kg canlı ağırlık / gün	5 gün

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Rumeni gelişmiş hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uzun süre kullanıldığında sindirim kanalı mikroflorası bozabilir.

Aminoglikozitlerin işitme ve denge organları üzerinde olumsuz etkileri vardır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER

Zehirlenme belirtileri görülmez.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLARI

Belirtilen doz ve aralıklarda kullanıldığında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmada önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğü veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarları ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-20°C) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

250g, 500g ve 1 kg'lık alüminyum kutularda piyasaya sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 14.11.2025

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 30.01.2008-011/0066

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ:

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş

İz Plaza Giz Eski Büyükdere Cd. No:9 Kat: 21 Maslak 34398 İstanbul-Türkiye

ÜRETİM YERİ:

Classpharma Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mahallesi 12. Cadde Medicavet Blok No:1 Tuzla/ İSTANBUL

Üretim Tarihi:

Seri No:

Son Kullanma Tarihi:

Perakende Satış Fiyatı (Kdv Dahil):