

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

MBV-C Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

1 ml'de;

Aktif madde:

Sodyum askorbat(Vitamin C) 250 mg

Yardımcı madde:

Koruyucu:

Benzil alkol (E1519) 15 mg

Antioksidan:

Sodyum metabisülfid (E223) 2 mg

Tam liste için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Çözelti

Açık sarı renkli, berrak, steril bir vitamin çözeltisi

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

At, sığır, manda, koyun, keçi, köpek ve kedi

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

MBV-C, at, sığır, manda, koyun, keçi, köpek ve kedilerde

- C vitamini eksikliği tedavisi,
- Özellikle enfeksiyon ve stres dönemlerinde, halsizliğin destekleyici tedavisinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Ürolitiazis şüphesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanmayınız.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Askorbik asit güçlü bir indirgeyici maddedir ve başlıca idrarda glukoz tayini testi olmak üzere, oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarına dayanan çok sayıda laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Yoktur.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Her kullanımdan önce kapak silinir. Kuru, steril şırınga ve iğne kullanılır. Göze ve deriye temasından kaçınılmalıdır. Kazara maruz kalma halinde bölgeyi bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız. Ürün ile temas ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

Yoktur.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Tavsiye edilen dozlarda bilinen bir yan etkiye sahip değildir. Askorbik asit güçlü bir indirgeyici maddedir ve başlıca idrarda glukoz tayini testi olmak üzere, oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarına dayanan çok sayıda laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Hayvanlar ile ilgili herhangi bir teratojenisite çalışması bulunmadığından, gebelik sırasında C vitamini kullanımı sadece gerekli ise öngörülmelidir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

İdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Tersine bazık ilaçlar, terapötik etkinin azalmasıyla sonuçlanan azalmış emilim gösterebilirler. Demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar ve özellikle bakır olmak üzere, ağır metal tuzlarını içeren ilaçlarla geçimsizdir. Bu nedenle birlikte kullanılmamaları gerekir. Günlük 10 mg üzerinde alınan Vitamin C, kumarin veya inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-bağırsaklardan emilimini azalttığı bildirilmiştir. Uyumluluk çalışmalarının yokluğu sebebiyle MBV-C, başka veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

MBV-C; kas içi (İM) ve ven içi (İV) olarak at, manda, sığır, koyun ve keçilerde 10 - 20 mg/kg vücut ağırlığı, kedi ve köpeklerde 16 mg/kg vücut ağırlığı şeklinde uygulanır. Uygulama, tedavinin gerektirdiği sürece yapılır. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir. Pratik doz tablodaki gibidir:

Hayvan türü	Uygulanacak pratik doz
At - Sığır - Manda	4 - 8 ml / 100 kg v.a.
Koyun - Keçi	1 - 2 ml / 25 kg v.a.
Kedi - Köpek	0.3 ml / 5 kg v.a.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Toksisite riski oldukça düşüktür. Ancak aşırı dozlarda kullanıldığında ve sık sık tekrarlanarak verildiğinde tüm evcil hayvanlarda kusma, ishal, mide sancısı, deride peteşiyal kızarıklık, böbrek tubulüslerinde kalsiyum okzalat kristalleri oluşumuna ve aşırı ürinasyona sebep olabilir. Böyle durumlarla karşılaşıldığında ilaç uygulamasının durdurulması ve hayvana bolca su verilmesi yeterlidir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Sindirim sistemi ve metabolizma, vitaminler

ATC Vet Kodu: QA11GA01

5.1 Farmakodinamik özellikler

Askorbik asit (C vitamini), antioksidan özelliklere sahip bir vitamindir. Özellikle, vitaminleri (A, D ve E) oksidasyondan korur ve vücudun çeşitli enfeksiyöz ajanlara karşı savunmasına katkıda bulunan hidrojen vektörü olarak hücrel redoks reaksiyonlarına katılır.

Birçok fizyolojik sistemde rol oynar: bağ dokusunda, endokrin bezlerde, hematopoezde, krebs döngüsü enzimleri ve demir emilimini ve eritrositler tarafından alımı artırarak demir metabolizması üzerinde etkinlik gösterir. Bu metabolik yollar üzerindeki etkileri sayesinde, C vitamini büyüme süreçlerinde olumlu bir rol oynar.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Evcil hayvanlarda paranteral yolla verilen Vitamin C hızla emilerek hücre içi yapılar da dahil geniş ölçekte tüm vücuda dağılır. Plazma proteinlerine düşük oranda bağlanır. Lökosit ve trombositlerdeki yoğunluğu, plazma ve alyuvarlardakinden daha yüksektir. Vücuttaki bezli yapılarda yüksek, kas ve yağ dokuda düşük oranda bulunur. Vücutta sınırlı ölçüde depolanır. Başta sıçanlar olmak üzere, bütün memelilerde (insanlar hariç) glikozdan başlanarak d-glukuronik asit ve l-glukuronik asit üzerinden Vitamin C sentezlenir. Vitamin C, hayvan vücudundan başlıca karaciğerde olmak üzere, diğer bazı dokularda karbondioksit kadar parçalanır. Dışarıdan alınan ve endojen olarak sentezlenen Vitamin C ve metabolitleri başlıca idrarla ve az oranda da dışkı, süt ve terle vücuttan atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Benzil alkol (E1519)

Sodyum metabisülfid (E223)

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Uyumluluk çalışmalarının yokluğu sebebiyle MBV-C, başka veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

İlk dozun çekilmesinden itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürünün açılmasından itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Ürün açıldıktan sonra, kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmamış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürünler ve bu ürünlerden kalan atıklar yerel kurallara göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15 Küçükçekmece / İSTANBUL

info@mbv.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

030/0042

9. PAZARLAMA İZNİ (İLK VERİLME) TARİHİ

02.11.2021

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

08.10.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MBV-C®
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ

MBV-C Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı renkli, berrak, steril bir vitamin çözeltisi olup her ml'sinde 250 mg sodyum askorbat (vitamin C), koruyucu olarak 15 mg benzil alkol (E1519) ve antioksidan olarak 2 mg sodyum metabisülfid (E223) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Askorbik asit (C vitamini), antioksidan özelliklere sahip bir vitamindir. Özellikle, vitaminleri (A, D ve E) oksidasyondan korur ve vücudun çeşitli enfeksiyöz ajanlara karşı savunmasına katkıda bulunan hidrojen vektörü olarak hücresel redoks reaksiyonlarına katılır.

Birçok fizyolojik sistemde rol oynar: bağ dokusunda, endokrin bezlerde, hematopoezde, Krebs döngüsü enzimleri ve demir emilimini ve eritrositler tarafından alımı artırarak demir metabolizması üzerinde etkinlik gösterir. Bu metabolik yollar üzerindeki etkileri sayesinde, C vitamini büyüme süreçlerinde olumlu bir rol oynar.

Farmakokinetik özellikler

Evcil hayvanlarda paranteral yolla verilen Vitamin C hızla emilerek hücre içi yapılar da dahil geniş ölçekte tüm vücuda dağılır. Plazma proteinlerine düşük oranda bağlanır. Lökosit ve trombositlerdeki yoğunluğu, plazma ve alyuvarlardakinden daha yüksektir. Vücuttaki bezli yapılarda yüksek, kas ve yağ dokuda düşük oranda bulunur. Vücutta sınırlı ölçüde depolanır. Başta sıçanlar olmak üzere, bütün memelilerde (insanlar hariç) glikozdan başlanarak d-glukuronik asit ve l-glukuronik asit üzerinden Vitamin C sentezlenir. Vitamin C, hayvan vücudundan başlıca karaciğerde olmak üzere, diğer bazı dokularda karbondioksit kadar parçalanır. Dışarıdan alınan ve endojen olarak sentezlenen Vitamin C ve metabolitleri başlıca idrarla ve az oranda da dışkı, süt ve terle vücuttan atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

MBV-C, at, sığır, manda, koyun, keçi, köpek ve kedilerde

- C vitamini eksikliği tedavisi,
- Özellikle enfeksiyon ve stres dönemlerinde, halsizliğin destekleyici tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

MBV-C; kas içi (İM) ve ven içi (İV) olarak at, manda, sığır, koyun ve keçilerde 10 - 20 mg/kg vücut ağırlığı, kedi ve köpeklerde 16 mg/kg vücut ağırlığı şeklinde uygulanır. Uygulama, tedavinin gerektirdiği sürece yapılır. Pratik doz tablodaki gibidir:

Hayvan türü	Uygulanacak pratik doz
At - Sığır - Manda	4 - 8 ml / 100 kg v.a.
Koyun - Keçi	1 - 2 ml / 25 kg v.a.
Kedi - Köpek	0.3 ml / 5 kg v.a.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Askorbik asit güçlü bir indirgeyici maddedir ve başlıca idrarda glukoz tayini testi olmak üzere, oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarına dayanan çok sayıda laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Hayvanlar ile ilgili herhangi bir teratojenisite çalışması bulunmadığından, gebelik sırasında C vitamini kullanımı sadece gerekli ise öngörülmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Tavsiye edilen dozlarda bilinen bir yan etkiye sahip değildir. Askorbik asit güçlü bir indirgeyici maddedir ve başlıca idrarda glukoz tayini testi olmak üzere, oksidasyon-indirgeme reaksiyonlarına dayanan çok sayıda laboratuvar test sonuçlarını etkileyebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İdrarda asitleşmeye neden olabileceğinden, idrarda aminoglikozidler, eritromisin gibi bazı antibiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. Tersine bazık ilaçlar, terapötik etkinin azalmasıyla sonuçlanan azalmış emilim gösterebilirler. Demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar ve özellikle bakır olmak üzere, ağır metal tuzlarını içeren ilaçlarla geçimsizdir. Bu nedenle birlikte kullanılmamaları gerekir. Günlük 10 mg üzerinde alınan Vitamin C, kumarin veya inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-bağırsaklardan emilimini azalttığı bildirilmiştir. Uyumluluk çalışmalarının yokluğu sebebiyle MBV-C, başka veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Toksosite riski oldukça düşüktür. Ancak aşırı dozlarda kullanıldığında ve sık sık tekrarlanarak verildiğinde tüm evcil hayvanlarda kusma, ishal, mide sancısı, deride peteşiyal kızarıklık, böbrek tubulüslerinde kalsiyum okzalat kristalleri oluşumuna ve aşırı ürinasyona sebep olabilir. Böyle durumlarla karşılaşıldığında ilaç uygulamasının durdurulması ve hayvana bolca su verilmesi yeterlidir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Ürolitiazis şüphesi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Her kullanımdan önce kapak silinir. Kuru, steril şırınga ve iğne kullanılır. Göze ve deriye temasından kaçınılmalıdır. Kazara maruz kalma halinde bölgeyi bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız. Ürün ile temas ve uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürünün açılmasından itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Ürün açıldıktan sonra, kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürünler ve bu ürünlerden kalan atıklar yerel kurallara göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde; veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 08.10.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
02.11.2021 – 030 /0042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15 34307 Küçükçekmece /
İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

İç Ambalaj Etiketi: 50 ml Flakon

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MBV-C®

Enjeksiyonluk Çözelti

Vitamin

BİLEŞİMİ

Her ml'sinde 250 mg sodyum askorbat (vitamin C), koruyucu olarak 15 mg benzil alkol (E1519) ve antioksidan olarak 2 mg sodyum metabisülfid (E223) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

MBV-C, at, sığır, manda, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; C vitamini eksikliği tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

MBV-C, kas içi (İM) ve ven içi (İV) olarak at, manda, sığır, koyun ve keçilerde 10 - 20 mg/kg vücut ağırlığı; kedi ve köpeklerde 16 mg/kg vücut ağırlığı şeklinde uygulanır.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları: Et ve süt için: 0 (sıfır) gün.

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürünün açılmasından itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Ürün açıldıktan sonra, kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde; veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
02.11.2021 – 030 /0042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

İç Ambalaj Etiketi: 100 ml Flakon

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MBV-C®

Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ

MBV-C Enjeksiyonluk Çözelti, her ml'sinde 250 mg sodyum askorbat (vitamin C), koruyucu olarak 15 mg benzil alkol (E1519) ve antioksidan olarak 2 mg sodyum metabisülfite (E223) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

MBV-C, at, sığır, manda, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; C vitamini eksikliği tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

MBV-C; kas içi (İM) ve ven içi (İV) olarak at, manda, sığır, koyun ve keçilerde 10 - 20 mg/kg vücut ağırlığı, kedi ve köpeklerde 16 mg/kg vücut ağırlığı şeklinde uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Et ve süt için: 0 (sıfır) gün.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürünün açılmasından itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Ürün açıldıktan sonra, kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde; veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

02.11.2021 – 030 /0042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi :

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MBV-C®
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ

MBV-C Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı renkli, berrak, steril bir vitamin çözeltisi olup her ml'sinde 250 mg sodyum askorbat (vitamin C), koruyucu olarak 15 mg benzil alkol (E1519) ve antioksidan olarak 2 mg sodyum metabisülfid (E223) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

MBV-C, at, sığır, manda, koyun, keçi, köpek ve kedilerde; C vitamini eksikliği tedavisi, özellikle enfeksiyon ve stres dönemlerinde, halsizliğin destekleyici tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

MBV-C kas içi (İM) ve ven içi (İV) olarak at, manda, sığır, koyun ve keçilerde 10 - 20 mg/kg vücut ağırlığı, kedi ve köpeklerde 16 mg/kg vücut ağırlığı şeklinde uygulanır. Pratik doz tablodaki gibidir.

Hayvan türü	Uygulanacak pratik doz
At - Sığır - Manda	4 - 8 ml / 100 kg v.a.
Koyun - Keçi	1 - 2 ml / 25 kg v.a
Kedi - Köpek	0.3 ml / 5 kg v.a.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürünün açılmasından itibaren, ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Ürün açıldıktan sonra, kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ve 100 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde; veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIđI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
02.11.2021 – 030 /0042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN VE ADRESİ

MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15

Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3

59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanım Tarihi:

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):