

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Masticure

Kuru Dönem

Meme İçi Antibakteriyel Süspansiyon

BİLEŞİMİ:

Beyaz renkli, homojen, yağlı süspansiyon içeren her 10 g'lık enjektör;

250 mg Sefalekssin'e eşdeğer Sefalekssin monohidrat,

250 mg Neomisin'e eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Sefalekssin birçok gram pozitif (+) ve bazı gram negatif (-) bakteriye karşı etkinlik gösteren, birinci nesil, geniş spektrumlu bir sefalosporindir. Duyarlı bakterilerin hücre duvarı altında yer alan penisilin bağlayıcı proteinlere bağlanarak, bakteri hücre duvarı sentezinin engellenmesi yoluyla etkili olur. Proteinlere bağlanma sonucu bakteri hücresi içinde oluşan yüksek iç ozmotik basınç, bakterinin erimesine yol açar.

Etkili olduğu başlıca bakteri türleri: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Pasteurella multocida, Escherichia coli, Proteus spp., Micrococcus spp., Moraxella spp., Actinobacillus lignieresii, Actinomyces bovis, Haemophilus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp., Salmonella spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp. ve Peptococcus spp.

Sefalosporinlere karşı gelişen bakteriyel direncin en yaygın şekli sefalosporinlerin betalaktamazlar tarafından inaktive edilmesidir. Sefalosporinin meme içi uygulamada sistemik dolaşıma geçişi sınırlıdır. Neomisin bakterisid etkili, aminoglikozid grubundan bir antibakteriyeldir.

Neomisin başlıca gram negatif (-) bakterilere (E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella spp., Proteus vulgaris, Salmonella spp., Shigella spp., H. influenza, N. meningitidis, Vibrio cholerae) ve bazı gram pozitif (+) bakterilere (Staph. aureus, Strep. Faecalis) karşı etkilidir. Klebsiella ve Pseudomonas türlerinin duyarlılığı nispeten azdır. Streptococcus pyogenes ve viridans grubu streptokoklar dirençlidir. Neomisin meme içi uygulamada kan dolaşımına önemsiz oranda geçer.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Kuru dönemdeki ineklerde sefalekssin ve neomisin kombinasyonuna duyarlı etkenlerden kaynaklanan mastit tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.

Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.

Meme başı ve memeye masaj yapılarak verilen ilacın yayılmasına yardım edilir.

Uygulama bir kere yapılır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Sefalosporinlere duyarlı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenebilir.

Akut penisilin alerjisi olan hayvanlar, sefaleksine karşı da hassastır.

KONTRENDİKASYONLAR:

İlaç laktasyon dönemindeki hayvanlarda ve sefalosporinlere veya neomisine duyarlı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Diğer sefalosporinler ile çapraz duyarlılık vardır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Meme dokusunda alerjik belirtiler gözlenebilir. Uygulamanın kesilmesi ile belirtiler kaybolur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Laktasyondaki ineklerde ve kuru dönemin 28 günden kısa olduğu ineklerde kullanılmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 28 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemelidir. Doğumdan sonraki 4 gün boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulamaz. Erken doğum olduğu takdirde 14 gün geçmeden süt tüketime sunulmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Penisilinlere duyarlı olduğu bilinen insanların ürüne teması olmamalıdır. İnsanlardaki penisilin alerjisi halinde yüzde, dudaklarda ve gözlerde şişme ve solunum güçlüğü önemli belirtilerdir. Acil tıbbi müdahale gereklidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır. Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

10 g'lık beyaz opak polietilen enjektörler 50 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 16.12.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIđI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
21.11.2007–019/0030

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ:

Provet Veteriner Ürünleri San.ve Tic A.Ş.
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok
NO:66A İç Kapı No:8 Kartal/İSTANBUL

ÜRETİM YERİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MASTICURE
Kuru Dönem
Meme İçi Antibakteriyel Süspansiyon

BİLEŞİMİ:

Her 10 g'lık enjektör:
250 mg Sefalekssin'e eşdeğer Sefalekssin monohidrat,
250 mg Neomisin'e eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

İneklerde eti için 28 gün, süt için 4 gün. Laktasyondaki ineklerde ve kuru dönemin 28 günden kısa olduğu ineklerde kullanılmamalıdır. Erken doğum olduğu takdirde 14 gün geçmeden süt tüketime sunulmamalıdır.

Uygulama yolu: Meme içi kullanılır.

Üretim Tarihi

Seri no

Son Kullanma Tarihi

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MASTICURE

Kuru Dönem

Meme İçi Antibakteriyel Süspansiyon

BİLEŞİMİ:

Beyaz renkli, homojen, yağlı süspansiyon içeren her 10 g'lık enjektör;
250 mg Sefalekssin' e eşdeğer Sefalekssin monohidrat,
250 mg Neomisin' e eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Kuru dönemdeki ineklerde sefalekssin ve neomisin kombinasyonuna duyarlı etkenlerden kaynaklanan mastit tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kullanmadan önce hasta memeler mutlaka sağılıp sütü boşaltılmalıdır.
Meme başı uygun şekilde temizlendikten sonra her memeye 1 enjektör içeriği verilir.
Meme başı ve memeye masaj yapılarak verilen ilacın yayılmasına yardım edilir.
Uygulama bir kere yapılır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Laktasyondaki ineklerde ve kuru dönemin 28 günden kısa olduğu ineklerde kullanılmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 28 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemelidir. Doğumdan sonraki 4 gün boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulamaz. Erken doğum olduğu takdirde 14 gün geçmeden süt tüketime sunulmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, buzdolabına konmadan ve dondurmadan saklanmalıdır.
Işıktan koruyarak kutusu içinde muhafaza ediniz.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

10 g'lık beyaz opak polietilen enjektörler 50 veya 100 adetlik karton kutularda satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIđI TARİHİ VE NO: 21.11.2007-019/0030

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San.ve Tic A.Ş.

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok

NO:66A İç Kapı No:8 Kartal/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara

Seri No:

Üretim Tar.:

S.K. Tarihi: