

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Medizanid Oral Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir tablet,

Aktif madde:

Oksfendazol.....300 mg

Oksiklozanid..... 600 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Krem renkli ortasından çentikli bolus şeklinde oral tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, Koyun

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Medizanid Oral Tablet sığırların ve koyunların mide - bağırsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia sp. erginlerinin tedavisi ve korunmasında kullanılır.

Karaciğer kelebekleri:

Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin)

Mide bağırsak kıl kurtları:

Mide : Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus axei

İnce bağırsak: T.colubriformis , Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp.,

Bunostomum sp., Gasterophilus spp.

Kalın Bağırsak: Chabertia ovina , Oesophagostomum sp., Trichuris sp.

Akciğer kıl kurtları:

Dictyocaulus spp.

Barsak şeritleri: Moniezia sp.

4.3 Kontrendikasyonlar

Sağaltım güvenliği düşük olduğundan karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmaz

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Biri ilkbahar ve bir sonbahar olmak üzere yılda 2 ilaçlama,

Meraların parazitlerle buluşmasını önlemek için çıkmadan önce bir uygulama,

Ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Bulunmamaktadır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Temas halinde eller iyice yıkanmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Nadiren ishal, sık, pisleme, iştahsızlık gibi etkiler görülebilirse de bunlar geçici olup bir iki saat içinde kaybolur

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Oksfendazol diğer benzimidazoller gibi teratojenik etki potansiyeli taşıdığından gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan ve doğumuna 1 ay kalan hayvanlara uygulanmamalıdır.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Bromsolan grubu antelmintiklerle geçimsizliği olduğundan birlikte kullanıldığında sığırlarda abortus (yavru atma) ve koyunlarda ölümler yapabilir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Koyunda

5-7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol, 15-20 mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid;

Sığırda

5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol, 10-15 mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid şeklinde olup :

Pratik Doz:

Kuzu (20 kg) : Yarım Oral Tablet

Koyun (40 kg) :1 Oral Tablet

Danalara (100-200 kg) :2-3 Oral Tablet

Sığırlara (200-300 kg) :3-4 Oral Tablet şeklindedir.

Sığırlarda 300 kg vücut ağırlık üzerindeki dozlarda sığırlarda 7-9, danalarda 4-5, buzağılarda 2-3 tableti geçmemelidir.

Medizanid Oral Tablet hayvanlarda ve doğrudan doğruya yutularak veya su içinde eriterek içirmek şeklinde verilir. Tabletler gerektiğinde ortasındaki çentiklerden kırılarak yarım oral tablet halinde kullanılabilir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm şekillenebilir.

Sığırlarda ise 30 mg/kg dozda uygulandığında ise bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Veteriner Antihelmintik
ATC-Vet Kodu: QP52AC52

5.1 Farmakodinamik özellikler

Medizanid Oral Tablet, iki ayrı etkin maddenin dengeli kombinasyonu esasıyla hazırlanmış, geniş spektrumlu bir antihelmintik müstahzardır. Oksiklozanid bir salisilanilid türevidir. Etki alanına giren parazitlerde oksidatif fosforizasyonu engelleyip, yoğun enerji açığı oluşturarak parazitin ölümüne sebep olur. Oksiklozanid önerilen dozlarda trematodlardan *F. hepatica* ve *F. gigantica*'nın erginlerine etkisi yüksektir. Bu parazitlerin genç şekillerinin tedavisi içinde oksiklozanid dozunun miktarı yükseltilmelidir

5.2 Farmakokinetik özellikler

Ruminantlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından iyice emilir. Başlıca karaciğer, böbrek, bağırsak ve kaslarda birikir ve glukonid bileşiği halinde safrayla vücuttan atılır. Pik plazma seviyesine oral yolla verilikten 45 saat sonra ulaşır. Oksfendazol bir benzimidazol bileşiği olup, etkinliğini parazitlerin enerji metabolizmasını bozarak gösterir. Antinematodal etkinliğinin yanında anticestoidal etkinliği de vardır. Suda çok az çözünüp sindirim kanalından sınırlı bir şekilde emilir. 5 mg/kg vücut ağırlığı dozunda ağız yoluyla verildiğinde 6 saatte plazma 1,25 – 3 µ/ml'lik doruk noktaya ulaşır. Geviş getirenlerde büyük oranda giata ile atılır. *T. colubriformis*, *Ostertagia* sp. ve *Haemonchus* türlerinde benzimidazol grubu antihelmintiklere karşı dirençli suşlar gelişebilir. Bu iki etkinin bir araya gelmesi ile geniş spekturumlu mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtları, karaciğer kelebekleri ve şeritlerinin tedavisinde kullanılan bir ürün oluşmuştur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat
Sodyum starch glikolat
Magnezyum stearat
PVP K25
Nişasta (mısır)

6.2 Geçimsizlikler

Bilinmemektedir.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Kuru bir yerde muhafaza ediniz. Güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içinde; 10 ve 20 adet oral tablet içeren blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI 11/1073

9. PAZARLAMA İZNİNİN (İLK VERİLME)TARİHİ 17.07.2002

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

25.02.2026

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MEDİZANİD
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Medizanid Oral Tablet; krem renkli ortasından çentikli bolus şeklinde tablet olup; her tablet 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

MEDİZANİD Oral Tablet, iki ayrı etkin maddenin dengeli kombinasyonu esasıyla hazırlanmış, geniş spektrumlu bir antihelmintik müstahzardır. Oksiklozanid bir salisilanilid türevidir. Etki alanına giren parazitlerde oksidatif fosforizasyonu engelleyip, yoğun enerji açığı oluşturarak parazitin ölümüne sebep olur. Oksiklozanid önerilen dozlarda trematodlardan *F. hepatica* ve *F. gigantica*'nın erginlerine etkisi yüksektir. Bu parazitlerin genç şekillerinin tedavisi içinde oksiklozanid dozunun miktarı yükseltilmelidir

Ruminantlara ağız yoluyla verildiğinde sindirim kanalından iyice emilir. Başlıca karaciğer, böbrek, bağırsak ve kaslarda birikir ve glukonid bileşiği halinde safrayla vücuttan atılır. Pik plazma seviyesine oral yolla verilikten 45 saat sonra ulaşır. Oksfendazol bir benzamidazol bileşiği olup, etkinliğini parazitlerin enerji metabolizmasını bozarak gösterir. Antinematodal etkinliğinin yanında anticestoidal etkinliği de vardır. Suda çok az çözünüp sindirim kanalından sınırlı bir şekilde emilir. 5 mg/kg vücut ağırlığı dozunda ağız yoluyla verildiğinde 6 saatte plazma 1,25 – 3 µ/ml'lik doruk noktaya ulaşır. Geviş getirenlerde büyük oranda giata ile atılır. *T. colubriformis*, *Ostertagia* sp. ve *Haemonchus* türlerinde benzimidazol grubu antihelmintiklere karşı dirençli suşlar gelişebilir. Bu iki etkinin bir araya gelmesi ile geniş spekturumlu mide, bağırsak ve akciğer kıl kurtları, karaciğer kelekleri ve şeritlerinin tedavisinde kullanılan bir ürün oluşmuştur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Medizanid Oral Tablet sığırların ve koyunların mide - bağırsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer keleklerinin erginlerinin ve *Moniezia* sp. erginlerinin tedavisi ve korunmasında kullanılır.

Karaciğer kelekleri:

Fasciola hepatica ve *Fasciola gigantica* (ergin)

Mide bağırsak kıl kurtları:

Mide : *Haemonchus* sp., *Ostertagia* sp., *Trichostrongylus axei*

İnce bağırsak: *T.colubriformis* , *Trichostrongylus* sp., *Nematodirus* sp., *Cooperia* sp.,

Bunostomum sp., *Gaigeria pachyscelis*

Kalın Bağırsak: *Chabertia ovina* , *Oesophagostomum* sp., *Trichuris* sp.

Akciğer kıl kurtları:

Dictyocaulus spp.

Barsak şeritleri: *Moniesia* sp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Koyunda 5 -7,5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol, 15-20 mg/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid; Sığırdı 5 mg/kg vücut ağırlığı Oksfendazol , 10-15 m/kg vücut ağırlığı Oksiklozanid şeklinde olup :

Pratik Doz:

Kuzu (20 kg) : Yarım Oral Tablet

Koyun (40 kg) :1 Oral Tablet

Danalara (100-200 kg) :2-3 Oral Tablet

Sığırlara (200-300 kg) :3-4 Oral Tablet şeklindedir. Sığırlarda 300 kg vücut ağırlık üzerindeki dozlarda sığırlarda 7-9, danalarda 4-5, buzağılarda 2-3 tableti geçmemelidir.

Medizanid Oral Tablet hayvanlarda ve doğrudan doğruya yutularak veya su içinde eriterek içirmek şeklinde verilir. Tabletler gerektiğinde ortasındaki çentiklerden kırılarak yarım oral tablet halinde kullanılabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilmektedir.

Biri ilkbahar ve bir sonbahar olmak üzere yılda 2 ilaçlama,

Meraların parazitlerle buluşmasını önlemek için çıkmadan önce bir uygulama,

Ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

Gebelikte, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım: Oksfendazol diğer benzimidazoller gibi teratojenik etki potansiyeli taşıdığından gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan ve doğumuna 1 ay kalan hayvanlara uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Nadiren ishal, sık, pisleme, iştahsızlık gibi etkiler görülebilirse de bunlar geçici olup bir iki saat içinde kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bromsolan grubu antelmintiklerle geçimsizliği olduğundan birlikte kullanıldığında sığırlarda abortus (yavru atma) ve koyunlarda ölümler yapabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Oksiklozanid koyunlara 60 mg/kg ve üzeri dozlarda uygulandığında ölüm şekillenebilir.

Sığırlarda ise 30 mg/kg dozda uygulandığında ise bazı zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Sağaltım güvenliği düşük olduğundan karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Temas halinde eller iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Kuru bir yerde muhafaza ediniz. Güneş ışığından koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde 10 ve 20 adet oral tablet içeren blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 25.02.2026

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO:
17.07.2002-11/1073

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Arion İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No.8 34959
Tepeören, Tuzla/İstanbul

Dış ambalaj etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MEDİZANİD

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Her tablet 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Medizanid Oral Tablet sığırların ve koyunların mide - bağırsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer keleklerinin erginlerinin ve Moniezia sp. erginlerinin tedavisi ve korunmasında kullanılır.

Pratik dozu kuzularda 20 kg vücut ağırlığı için yarım tablet, koyunlarda 40 kg vücut ağırlığı için 1 tablet, sığırlarda 200-300 kg vücut ağırlığı için 3-4 tablettir.

Gebelikte, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım:Oksfendazol diğer benzimidazoller gibi teratojenik etki potansiyeli taşıdığından gebeliğin ilk 1/3'ünde bulunan ve doğumuna 1 ay kalan hayvanlara uygulanmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzakta bulundurunuz Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Kuru bir yerde muhafaza ediniz. Güneş ışığından koruyunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde 10 ve 20 adet oral tablet içeren blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO:
17.07.2002-11/1073

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Arion İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No.8 34959
Tepeören, Tuzla/İstanbul

Seri no :

Üretim tarihi :

Son kullanma tarihi :

Perakende satış fiyatı (KDV dahil):

.....
İç etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

MEDİZANİD

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

300 mg Oksfendazol

600 mg Oksiklozanid

IPM LOGO

Seri no :

Üretim Tarihi

Son kullanma tarihi