

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Metfenak Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

1 ml'de;

Aktif madde:

Diklofenak sodyum 50 mg
(46,6 mg Diklofenak baz'a eşdeğer)

Yardımcı madde:

Koruyucu:

Benzil alkol (E 1519) 80 mg
Sodyum metabisülfid (E 223) 2 mg

Tüm yardımcı maddeler için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Çözelti

Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

At, sığır

4.2 Her bir Hedef tür için kullanım alanı

Diklofenak, çeşitli sistem patolojilerinde anti-inflamatuvar, analjezik ve antipiretik olarak kullanılır. Yüksek ateşte, ister basit ister bakteriyel ajanlarla komplike solunum sisteminin (bronkopnömoni gibi), genital-meme içi sistemin (metritis, mastitis gibi), akut ve kronik topallama da dahil olmak üzere iskelet-kas sisteminin (arthritis, ligament yangısı (desmitis), tendinitis ve miyozitis gibi) yangısal ve dejeneratif hastalıklarının tedavisinde endikedir.

4.3 Kontrendikasyonlar

Diklofenak veya yardımcı maddelere aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gastroenterik bozukluklarda, özellikle ülseratif lezyonlarda kullanılmamalıdır. Bu durumda diklofenak semptomların artmasına ve hemorajiye neden olabilir. Diklofenak böbrek veya karaciğer yetmezliği veya kanama durumlarında kontrendikedir. Bu ürün ile tedavi edilen hayvanların etleri ve sütü, doğal hayattaki yabani hayvan türlerine yedirilmemeli ve bu hayvanlarda kullanılacak yem veya diğer gıdalara ilave edilmemelidir. Ürün hedef türler dışında kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Tedavi süresi ve önerilen doz aşılmamalıdır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Tedavi edilen hayvanlar, ancak yasal arınma süresinin sonunda (sığır eti ve sakatatlar için 15 gün) otlamaya çıkarılabilir. Atlar son tedaviden 28 gün geçmeden meraya çıkarılmamalıdır. Tedavi edilen hayvanların ölmesi durumunda, leş yiyen hayvanların ulaşamayacağı şekilde imha edilmelidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Ürün ile çalışan kişiler deri veya mukozanın, ürün ile temasından kaçınılmalıdır. Kazara temas edilmesi durumunda, etkilenen bölgenin akan su ile yıkanması gerekir. Kazara enjeksiyon durumlarında hemen doktorunuza danışınız ve doktora ambalaj veya prospektüsü gösteriniz. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Tıbbi ürün uygulanırken bir şey yenilmemeli, tütün ve tütün mamulleri içilmemelidir.

(iii) Diğer uyarılar

Yoktur.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Mide-barsak sisteminde (kusma, kanama ve diyare), böbreklerde (nefropatiler), karaciğerde (klinik bulgu ya da hepatik fonksiyon bozukluğu, karaciğer hücrelerinde hasar ve safra yollarında tıkanma olmaksızın karaciğer enzimlerinde meydana gelen artışlar) ve bazı kan bileşenlerinde (trombosit fonksiyonunun bozulması) istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Alerjik reaksiyonlar görülebilir (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi). Sığırlarda, kas içi uygulama esnasında enjeksiyon yerinde hafif ağrı ve geçici bir şişlik ihtimali göz ardı edilemez. Atlarda önerilen dozda bile kullanımından sonra iştahsızlık rapor edilmiştir. Enjeksiyon yerinde hemoraji ve geçici bir şişlik ihtimali göz ardı edilemez.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

İleri derecede gebe hayvanlarda doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer anti-inflamatuvar ilaçlarla, glukokortikosteroidlerle eş zamanlı kullanımı istemeyen reaksiyonların görülmesine neden olabilir. Diğer NSAID'ler, diüretikler, antikoagülanlar, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanım toksik etkilere neden olabilir. Potansiyel olarak nefrotoksik olan ürünlerle eş zamanlı kullanılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Sığır : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı/gün (2.3 mg diklofenak/kg vücut ağırlığı /gün dozuna eşdeğer) dozunda 1- 3 gün kullanılır. Akut topallıkta 2.5 ml/100 kg vücut ağırlığı /gün (1.15 mg diklofenak/kg vücut ağırlığı) dozunda 3 gün kullanılır. Uygulama kas içi yapılmalıdır.

At : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı / gün (2.3 mg diklofenak/kg vücut ağırlığı /gün dozuna eşdeğer) dozunda 3- 5 gün kullanılır. Kas içi uygulama önerilmektedir. Acil durumlarda yavaş ven içi uygulama da yapılabilir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Atlarda önerilen dozun iki mislinde, mide-bağırsakta kanama ve karaciğer rahatsızlıkları görülebilir. Tüm NSAID'lerde olduğu gibi ülserojenik etki, mide mukozasını koruyan etken maddelerle ve H2-antihistaminik ilaçlarla (simetidin, ranitidin) engellenebilir.

4.11 İlaç Kalıntı Arınma Süresi (ik.a.s.):

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 144 saat (12 sağımlı) geçmeden elde edilecek süt insan tüketiminde kullanılmamalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Non-steroidal antiinflatuvar ve anti romatizmal İlaç,
ATCVet Kodu: M01AB05

5.1 Farmakodinamik özellikler

Diklofenak non-steroidal anti-inflatuvar bir madde (NSAID) olup analjezik, antispastik ve antipiretik özelliklere sahiptir. Prostaglandinlerin, prostasiklinlerin ve tromboksanların sentezinden sorumlu olan siklo-oksijenaz enzimini inhibe ederek arasıdonik asit metabolizması üzerinde etki gösterir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Sığırlarda kas içi yolla uygulandığında, emilme hızlı olur ve pik konsantrasyona (C_{max} 7009 ug eşdeğer / kg), ilk uygulamadan iki saat sonra ulaşılır. Diklofenak 24-48 saat boyunca dolaşımında kalır.

Atlarda kas içi yolla uygulandığında, diklofenak yaklaşık 1 saat içinde kanda pik seviyeye (C_{max} 1.9 ug / ml) ulaşır ve 36-48 saat boyunca dolaşımında kalır.

Diklofenak güçlü bir bağ ile, plazma proteinlerine bağlanan ve çok yüksek olmayan belirgin dağılım hacmi ile karakterize edilir, bu da daha çok merkezi bölmesinde devam ettiğini göstermektedir. Yangı, membran geçirgenliğini değiştirerek, yangılı bölgeye diklofenak geçişine izin verir. Diklofenak karaciğerde metabolize edilir ve atılımı diklofenak ve metabolitleri şeklinde esas olarak böbrek ve safra yolları ile gerçekleşir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Benzil alkol (E 1519)
Propilen glikol
Sodyum metabisülfid (E 223)
Sodyum hidroksit
Hidroklorik asit
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 3 yıl
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün
Tıpa 30 kezden fazla delinmemelidir.

6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliđi ve kompozisyonu

Karton kutu ierisinde gri bromobutil kauuk tıpa ve řeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmıř 50 ml ve 100 ml’lik tip II renksiz cam flakonlarda satıřa sunulmuřtur.

6.6 Kullanılmıř veya arta kalan rnn imhasına iliřkin zel nlemler

Kullanılmıř veya arta kalan rn ilgili mevzuata gre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

MBV İla San. ve Tic. Ltd. řti.

İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15 Kkekmece / İSTANBUL

info@mbv.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 033/0010**9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ: 11.06.2026****10. METİN DEĞİřİKLİK TARİHİ**

Prospektüs:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Metfenak

Enjeksiyonluk Çözelti

Non-steroid Antiinflamatuvar

BİLEŞİMİ

Berrak, renksiz veya soluk sarı renkli bir çözelti olan Metfenak Enjeksiyonluk Çözelti; her ml'sinde 46,6 mg diklofenak baz'a eşdeğer 50 mg diklofenak sodyum, koruyucu olarak 80 mg benzil alkol (E 1519) ve 2 mg sodyum metabisülfid (E 223) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ**Farmakodinamik özellikler**

Diklofenak non-steroidal anti-inflamatuvar bir madde (NSAID) olup analjezik, antispastik ve antipiretik özelliklere sahiptir. Prostaglandinlerin, prostasiklinlerin ve tromboksanların sentezinden sorumlu olan siklo-oksijenaz enzimini inhibe ederek arasıdonik asit metabolizması üzerinde etki gösterir.

Farmakokinetik özellikler

Sığırlarda kas içi yolla uygulandığında, emilme hızlı olur ve pik konsantrasyona (C_{max} 7009 ug eşdeğer / kg), ilk uygulamadan iki saat sonra ulaşılır. Diklofenak 24-48 saat boyunca dolaşımda kalır.

Atlarda kas içi yolla uygulandığında, diklofenak yaklaşık 1 saat içinde kanda pik seviyeye (C_{max} 1.9 ug / ml) ulaşır ve 36-48 saat boyunca dolaşımda kalır.

Diklofenak güçlü bir bağ ile, plazma proteinlerine bağlanan ve çok yüksek olmayan belirgin dağılım hacmi ile karakterize edilir, bu da daha çok merkezi bölmesinde devam ettiğini göstermektedir. Yangı, membran geçirgenliğini değiştirerek, yangılı bölgeye diklofenak geçişine izin verir. Diklofenak karaciğerde metabolize edilir ve atılımı diklofenak ve metabolitleri şeklinde esas olarak böbrek ve safra yolları ile gerçekleşir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Diklofenak, çeşitli sistem patolojilerinde anti-inflamatuvar, analjezik ve antipiretik olarak kullanılır. At ve sığırlarda, yüksek ateşte, ister basit ister bakteriyel ajanlarla komplike solunum sisteminin (bronkopnömoni gibi), genital-meme içi sistemin (metritis, mastitis gibi), akut ve kronik topallama da dahil olmak üzere iskelet-kas sisteminin (arthritis, ligament yangısı (desmitis), tendinitis ve miyozitis gibi) yangısal ve dejeneratif hastalıklarının tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sığır : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı/gün (2.3 mg diklofenak/kg vücut ağırlığı /gün dozuna eşdeğer) dozunda 1- 3 gün kullanılır. Akut topallıkta 2.5 ml/100 kg vücut ağırlığı /gün (1.15 mg diklofenak/kg vücut ağırlığı) dozunda 3 gün kullanılır. Uygulama kas içi yapılmalıdır.

At : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı / gün (2.3 mg diklofenak/kg vücut ağırlığı /gün dozuna eşdeğer) dozunda 3- 5 gün kullanılır. Kas içi uygulama önerilmektedir. Acil durumlarda yavaş ven içi uygulama da yapılabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Tedavi süresi ve önerilen doz aşılmalıdır.

Tedavi edilen hayvanlar, ancak yasal arınma süresinin sonunda (sığır eti ve sakatatlar için 15 gün) otlamaya çıkarılabilir. Atlar son tedaviden 28 gün geçmeden meraya çıkarılmamalıdır.

Tedavi edilen hayvanların ölmesi durumunda, leş yiyen hayvanların ulaşamayacağı şekilde imha edilmelidir

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: İleri derecede gebe hayvanlarda doğum mekanizmasını etkileyebileceğinden kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Mide-barsak sisteminde (kusma, kanama ve diyare), böbreklerde (nefropatiler), karaciğerde (klinik bulgu ya da hepatik fonksiyon bozukluğu, karaciğer hücrelerinde hasar ve safra yollarında tıkanma olmaksızın karaciğer enzimlerinde meydana gelen artışlar) ve bazı kan bileşenlerinde (trombosit fonksiyonunun bozulması) istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Alerjik reaksiyonlar görülebilir (kaşıntı, ödem, bronşlarda spazm ve rinit gibi). Sığırlarda, kas içi uygulama esnasında enjeksiyon yerinde hafif ağrı ve geçici bir şişlik ihtimali göz ardı edilemez. Atlarda önerilen dozda bile kullanımından sonra iştahsızlık rapor edilmiştir. Enjeksiyon yerinde hemoraji ve geçici bir şişlik ihtimali göz ardı edilemez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer anti-inflamatuvar ilaçlarla, glukokortikosteroidlerle eş zamanlı kullanımı istemeyen reaksiyonların görülmesine neden olabilir. Diğer NSAID'ler, diüretikler, antikoagülanlar, aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanım toksik etkilere neden olabilir. Potansiyel olarak nefrotoksik olan ürünlerle eş zamanlı kullanılmamalıdır. Diğer veteriner tıbbi ürünler ile karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Atlarda önerilen dozun iki mislinde, mide-bağırsakta kanama ve karaciğer rahatsızlıkları görülebilir. Tüm NSAID'lerde olduğu gibi ülserojenik etki, mide mukozasını koruyan etken maddelerle ve H2-antihistaminik ilaçlarla (simetidin, ranitidin) engellenebilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 144 saat (12 saım) geçmeden elde edilecek süt insan tüketiminde kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Diklofenak veya yardımcı maddelere aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Gastroenterik bozukluklarda, özellikle ülseratif lezyonlarda kullanılmamalıdır. Bu durumda diklofenak semptomların artmasına ve hemorajiye neden olabilir. Diklofenak böbrek veya karaciğer yetmezliği veya kanama durumlarında kontrendikedir. Bu ürün ile tedavi edilen hayvanların etleri ve sütü, doğal hayattaki yabani hayvan türlerine yedirilmemeli ve bu hayvanlarda kullanılacak yem veya diğer gıdalara ilave edilmemelidir. Ürün hedef türler dışında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Son kullanım tarihi geçen ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Ürün ile çalışan kişiler deri veya mukozanın, ürün ile temasından kaçınılmalıdır. Kazara temas edilmesi durumunda, etkilenen bölgenin akan su ile yıkanması gerekir. Kazara enjeksiyon

durumlarında hemen doktorunuza danışınız ve doktora ambalaj veya prospektüsü gösteriniz. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Tıbbi ürün uygulanırken bir şey yenilmemeli, tütün ve tütün mamulleri içilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 3 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Tıpa 30 kezden fazla delinmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ml ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 11.06.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
11.06.2026 – 033/0010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 15 Küçükçekmece /
İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Metfenak

Enjeksiyonluk Çözelti

Non-steroid Antiinflamatuvar

Her ml'de 46,6 mg diklofenak baz'a eşdeğer 50 mg diklofenak sodyum, koruyucu olarak 80 mg benzil alkol (E 1519) ve 2 mg sodyum metabisülfid (E 223) içerir.

Metfenak Enjeksiyonluk Çözelti, çeşitli sistem patolojilerinde anti-inflamatuvar, analjezik ve antipiretik olarak kullanılır.

Sığır : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı/gün dozunda 1- 3 gün kullanılır. Akut topallıkta 2.5 ml/100 kg vücut ağırlığı /gün dozunda 3 gün kullanılır. Uygulama kas içi yapılmalıdır.

At : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı / gün dozunda 3- 5 gün kullanılır. Kas içi uygulama önerilmektedir. Acil durumlarda yavaş ven içi uygulama da yapılabilir.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 144 saat (12 sağı) geçmeden elde edilecek süt insan tüketiminde kullanılmamalıdır.

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, dondurulmadan ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
11.06.2026 – 033/0010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Metfenak

Enjeksiyonluk Çözelti

Non-steroid Antiinflamatuvar

BİLEŞİMİ

Her ml'de 46,6 mg diklofenak baz'a eşdeğer 50 mg diklofenak sodyum, koruyucu olarak 80 mg benzil alkol (E 1519) ve 2 mg sodyum metabisülfid (E 223) içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR

At ve sığırlarda yüksek ateşte, ister basit ister bakteriyel ajanlarla komplike solunum sisteminin (bronkopnömoni gibi), genital-meme içi sistemin (metritis, mastitis gibi), akut ve kronik topallama da dahil olmak üzere iskelet-kas sisteminin (arthritis, ligament yangısı (desmitis), tendinitis ve miyozitis gibi) yangısal ve dejeneratif hastalıklarının tedavisinde endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sığır : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı/gün dozunda 1- 3 gün kullanılır. Akut topallıkta 2.5 ml/100 kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3 gün kullanılır. Uygulama kas içi yapılmalıdır.

At : 5 ml/100 kg vücut ağırlığı / gün dozunda 3- 5 gün kullanılır. Kas içi uygulama önerilmektedir. Acil durumlarda yavaş ven içi uygulama da yapılabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 144 saat (12 sağımlı) geçmeden elde edilecek süt insan tüketiminde kullanılmamalıdır.

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, dondurulmadan ve ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 3 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ml ve 100 ml'lik tip II renksiz cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
11.06.2026 – 033/0010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: MBV İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):