

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1.VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Otimix Kedi ve Köpekler İçin Kulak Damlası ve Deri Süspansiyonu

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

1 ml şunları içerir:

Aktif maddeler:

Mikonazol nitrat	23.0 mg
Polimiksin B sülfat	5,500 IU
Prednizolon asetat	5.0 mg

Yardımcı maddeler:

Kolloidal silika susuz	10 mg
Sıvı parafin	1 ml

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Kulak damlası ve deri süspansiyonu

Beyaz süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür:

Köpek ve kedi

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

Köpek ve kedilerde Polimiksin B ve mikonazole duyarlı aşağıdaki mikroorganizmaların neden olduğu otitis eksterna ve dermatitisin tedavisi:

Gram – pozitif bakteriler

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Gram – negatif bakteriler

Pseudomonas spp.

Escherichia coli

Mayalar ve mantarlar

Microsporum spp.

Trichophyton spp.

Candida spp.

Malassezia pachydermatis

Mikonazol ve Polimiksin B duyarlı patojenler ile eşzamanlı enfeksiyon bulunan *Otodectes cynotis* infestasyonların tedavisinde kullanılır.

4.3.Kontrendikasyonlar

Mikonazol, Polimiksin B, prednizolona veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanmayınız.

Polimiksin B'nin potansiyel bir ototoksik ajan olduđu bilindiğinden, perfore kulak zarı (membrana timpani) olan hayvanlarda kullanmayınız.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar

Polimiksin B ve kolistin arasında ve ayrıca mikonazol ve diğeri imidazol antifungaller arasında çapraz direnç vardır.

4.5.Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Ürünün kullanımı, ekim sonucuna ve hayvandan izole edilen mikroorganizmaların duyarlılığının belirlenmesine dayanmalıdır. Bu mümkün değilse, tedavi, hedef patojenlerin duyarlılığı hakkında yerel (bölgesel) epidemiyolojik bilgilere dayanmalıdır. Ürünü kullanırken resmi ve yerel antimikrobiyal politikaları dikkate alınız. Polimiksin B, AMEG sınıflandırmasına göre B kategorisine aittir. Bu antimikrobiyaller yalnızca C veya D kategorilerinde etkili olabilecek antimikrobiyallerin bulunmadığı klinik durumların tedavisi için düşünülmelidir. Ürünün verilen talimatların dışında kullanılması, polimiksin B ve mikonazole dirençli bakterilerin prevalansını artırabilir ve olası çapraz direnç nedeniyle polimiksinler ve imidazol antifungaller grubundan diğeri maddelerle tedavinin etkinliğini azaltabilir. *Otodectes cynotis* (kulak akarı) enfestasyonu vakalarında, uygun bir akarisit ile sistemik tedavi düşünülmelidir. Prednizolonun sistemik etkileri, ürün kullanılırken, özellikle geçirimsiz bir bandaj altında, geniş deri lezyonlarında, deride kan dolaşımı arttığında veya ürün bir hayvan tarafından yutulduğunda ortaya çıkabilir. Ürünü uygulamadan önce kulak zarının (*membrana timpani*) sağlam olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Prednizolon, polimiksin B veya mikonazole karşı aşırı duyarlılığı olduđu bilinen kişiler veteriner tıbbi ürün ile temastan kaçınmalıdır. Hamile ve emziren kadınlar ürünü dikkatle uygulamalıdır. Ürün cilt ve göz tahrişine neden olabilir, bu nedenle ürünün cilt ve gözlerle temasından ve kazara yutulmasından kaçınınız. Veteriner tıbbi ürünü kullanırken, koruyucu eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Cilde temas etmesi halinde, bölgeyi derhal bol su ve sabunla yıkayınız. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Göz veya cilt tahrişi devam ederse veya ürünün kazara yutulması durumunda, derhal tıbbi yardım alın ve prospektüsü veya etiketi doktora gösteriniz.

Ürünü kullanırken sigara içmeyiniz, yiyecek ve içecek tüketmeyiniz. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Bu ilacın kullanımında (özellikle daha yaşlı köpeklerde), çok nadir olarak sağırılık görülebilir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. Kortikosteroid içeren topikal preparatların uzun süreli ve yoğun kullanımının, enfeksiyon riskinde artış, epidermal inceleme ve gecikmiş iyileşme, telenjiyektazi ve kanamaya karşı cilt hassasiyetinde artış dahil olmak üzere lokal immünosupresyonu ve adrenal fonksiyonun baskılanması dahil sistemik etkileri tetiklediği bilinmektedir. Kortikosteroidlerin geleneksel yan etkileri ortaya çıkabilir (artmış kortizol ve hepatik enzim seviyeleri gibi biyokimyasal parametrelerin bozulması).

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon sırasında değerlendirilmemiştir. Yalnızca veteriner hekim tarafından fayda/risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

4.8 Diğeri tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğeri etkileşim şekilleri

Bilinmemektedir.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu

Kulak ve deride kullanılır.

Kullanmadan önce çalkalayınız.

Kulak: Kulak kanalını temizledikten sonra günde iki kez 3 ila 5 damla ürünü kulağa uygulayınız. Ürünün optimum dağılımını sağlamak için kulak tabanına iyice masaj yapınız. Klinik belirtilerin kaybolmasından sonra en az 7-10 gün, en fazla 14 gün olmak üzere birkaç gün daha tedaviye ara vermeden devam ediniz.

Deri: Günde iki kez birkaç damla ürünü tüm lezyonu kaplayacak şekilde uygulayınız ve eldiven takarak etkilenen bölgeye sürünüz. Klinik belirtilerin kaybolmasından sonra birkaç gün daha, 14 güne kadar tedaviye ara vermeden devam ediniz.

Bazı inatçı vakalarda 2-3 haftalık bir tedavi süresi önerilir. Mantar enfeksiyonu durumunda, eğer endike ise, kortikosteroid olmayan preparatlarla tedaviye devam edilmelidir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar acil prosedürler, antidotlar(gerekli ise)

Bilinmemektedir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

Gıda değeri olan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

5.-FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Diğer terapötik ürünler

ATCvet kodu: QV03AX

5.1. Farmakodinamik özellikler

Mikonazol, antifungal aktiviteye sahip sentetik bir imidazol türevidir ve gram-pozitif bakterilere karşı da aktivite gösterir. Mikonazol, maya ve mantarların hücre zarının temel bir bileşeni olan ergosterol sentezini seçici olarak inhibe eder. Mikonazolün fungistatik bir etki mekanizması vardır, ancak yüksek konsantrasyonların fungisidal etkileri olduğu bulunmuştur. Şimdiye kadar aşağıdaki direnç mekanizmaları bilinmektedir: mikonazolün bakteriler tarafından alımının azalması, mikonazolün hedef enzimlere bağlanma afinitesinin azalması, sterol biyosentezinde değişiklik, ergosterol sentezinin artmasına yol açan genlerin aşırı ekspresyonu, çıkış. Tüm imidazol antifungaller arasında çapraz direnç mümkündür.

Polimiksin B, gram-negatif bakterilere karşı bakterisidal etkiye sahip bir antibiyotiktir. Polimiksin B sitoplazmik membranın fosfolipidlerine bağlanır ve böylece geçirgenliğini bozmaktadır. Sonuç olarak bakteriler etkisiz hale getirilir. Gram-negatif patojenlerde direnç gelişimi, kromozomal mutasyonların veya *mcr-1* geninin yatay transferinin sonucudur. Direnç mekanizması şu prensibe dayanır: lipopolisakkaritin değiştirilmesi veya aşırı üretimi yoluyla bakteri membranının modifikasyonu; diğer bir mekanizma ise çıkış pompaları ve yüzey yapılarının-porinlerin değişmesidir. *Proteus* cinsinin tüm üyeleri polimiksin B'ye doğal olarak dirençlidir. Polimiksin B ve kolistin arasında tam çapraz direnç gösterilmiştir.

Prednizolon, anti-enflamatuar, anti-pruritik, anti-eksüdatif ve anti-proliferatif özelliklere sahip bir kortikosteroiddir. Prednizolonun anti-enflamatuar etki mekanizması, kapiller geçirgenliğin azaltılmasına, kan dolaşımının iyileştirilmesine ve fibroblast aktivitesinin inhibisyonuna dayanır.

Akarisidal etkinin kesin mekanizması bilinmemektedir. Yağ yardımcı maddelerinin akarları boğduğuna veya hareketsiz hale getirdiğine inanılmaktadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Laboratuvar hayvanlarında ve insanlarda yapılan çok sayıda çalışma göstermiştir ki:

- Mikonazolün topikal uygulamasından sonra, deri veya mukoza zarları yoluyla neredeyse hiç sistemik emilim gerçekleşmez,
- Polimiksin B'nin emilimi sağlam deri ve mukozadan gerçekleşmez. Yaralar yoluyla önemli derecede emilim vardır,
- Prednizolonun sınırlı ve gecikmeli emilimi, sağlam deriye topikal uygulamadan sonra meydana gelir. Deri bariyer fonksiyonunun bozulduğu durumlarda (örn. deri lezyonu) prednizolonun daha fazla emilmesi beklenir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.Yardımcı maddeler

Kolloidal silika susuz

Sıvı parafin

6.2. Geçimsizlikler

Bu veteriner tıbbi ürün diğer veteriner tıbbi ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 aydır.

İç ambalajın açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 aydır.

6.4. Muhafaza şartları

Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan, güneş ışığından korunarak 25°C' nin altında muhafaza ediniz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutuda beyaz, opak HDPE vidalı kapaklı; beyaz, opak LDPE damlatma kabı.

Ambalaj büyüklüğü: 1 x 15 ml

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İntermed Ecza Deposu İthalat İhracat Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.

Sağlık Sk. No: 32/4 Yenışehir Çankaya/ANKARA

Tel: (312) 435 95 60

Faks: (312) 435 73 51

intermed@interhas.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 016/0035

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ: 11.08.2026

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Otimix

Kedi ve Köpekler İçin Kulak Damlası Ve Deri Süspansiyonu
Köpek ve kediler için Veteriner Otolojik, Kortikosteroid ve Antienfektif

Bileşimi:

1 ml şunları içerir:

Aktif maddeler:

Mikonazol nitrat	23.0 mg
Polimiksin B sülfat	5,500 IU
Prednizolon asetat	5.0 mg

Yardımcı maddeler:

Kolloidal silika susuz	10 mg
Sıvı parafin	1 ml

Beyaz süspansiyon

Farmakolojik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Otolojikler, kortikosteroidler ve anti-enfektifler kombinasyonu

ATCvet kodu: QS02CA01

Farmakodinamik özellikler

Mikonazol, antifungal aktiviteye sahip sentetik bir imidazol türevidir ve gram-pozitif bakterilere karşı da aktivite gösterir. Mikonazol, maya ve mantarların hücre zarının temel bir bileşeni olan ergosterol sentezini seçici olarak inhibe eder. Mikonazolün fungistatik bir etki mekanizması vardır, ancak yüksek konsantrasyonların fungisidal etkileri olduğu bulunmuştur. Şimdiye kadar aşağıdaki direnç mekanizmaları bilinmektedir: mikonazolün bakteriler tarafından alımının azalması, mikonazolün hedef enzimlere bağlanma afinitesinin azalması, sterol biyosentezinde değişiklik, ergosterol sentezinin artmasına yol açan genlerin aşırı ekspresyonu, çıkış. Tüm imidazol antifungaller arasında çapraz direnç mümkündür.

Polimiksin B, gram-negatif bakterilere karşı bakterisidal etkiye sahip bir antibiyotiktir. Polimiksin B sitoplazmik membranın fosfolipidlerine bağlanır ve böylece geçirgenliğini bozmaktadır. Sonuç olarak bakteriler etkisiz hale getirilir. Gram-negatif patojenlerde direnç gelişimi, kromozomal mutasyonların veya *mcr-1* geninin yatay transferinin sonucudur. Direnç mekanizması şu prensibe dayanır: lipopolisakkaritin değiştirilmesi veya aşırı üretimi yoluyla bakteri membranının modifikasyonu; diğer bir mekanizma ise çıkış pompaları ve yüzey yapılarının-porinlerin değişmesidir. *Proteus* cinsinin tüm üyeleri polimiksin B'ye doğal olarak dirençlidir. Polimiksin B ve kolistin arasında tam çapraz direnç gösterilmiştir.

Prednizolon, anti-enflamatuar, anti-pruritik, anti-eksüdatif ve anti-proliferatif özelliklere sahip bir kortikosteroiddir. Prednizolonun anti-enflamatuar etki mekanizması, kapiller geçirgenliğin azaltılmasına, kan dolaşımının iyileştirilmesine ve fibroblast aktivitesinin inhibisyonuna dayanır.

Akarisidal etkinin kesin mekanizması bilinmemektedir. Yağ yardımcı maddelerinin akarları boğduğuna veya hareketsiz hale getirdiğine inanılmaktadır.

Farmakokinetik özellikler

Laboratuvar hayvanlarında ve insanlarda yapılan çok sayıda çalışma göstermiştir ki:

- Mikonazolün topikal uygulamasından sonra, deri veya mukoza zarları yoluyla neredeyse hiç sistemik emilim gerçekleşmez,
- Polimiksin B'nin emilimi sağlam deri ve mukozadan gerçekleşmez. Yaralar yoluyla önemli derecede emilim vardır,
- Prednizolonun sınırlı ve gecikmeli emilimi, sağlam deriye topikal uygulamadan sonra meydana gelir. Deri bariyer fonksiyonunun bozulduğu durumlarda (örn. deri lezyonu) prednizolonun daha fazla emilmesi beklenir.

Kullanım Sahası / Endikasyonlar

Köpek ve kedilerde Polimiksin B ve mikonazole duyarlı aşağıdaki mikroorganizmaların neden olduğu otitis eksterna ve dermatitisin tedavisi:

Gram – pozitif bakteriler

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

Gram – negatif bakteriler

Pseudomonas spp.

Escherichia coli

Mayalar ve mantarlar

Microsporum spp.

Trichophyton spp.

Candida spp.

Malassezia pachydermatis

Mikonazol ve Polimiksin B duyarlı patojenler ile eşzamanlı enfeksiyon bulunan *Otodectes cynotis* infestasyonların tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Köpek ve kedilerde kulak ve deride kullanılır.

Kullanmadan önce çalkalayınız.

Kulak: Kulak kanalını temizledikten sonra günde iki kez 3 ila 5 damla ürünü kulağa uygulayınız. Ürünün optimum dağılımını sağlamak için kulak tabanına iyice masaj yapınız. Klinik belirtilerin kaybolmasından sonra en az 7-10 gün, en fazla 14 gün olmak üzere birkaç gün daha tedaviye ara vermeden devam ediniz.

Deri: Günde iki kez birkaç damla ürünü tüm lezyonu kaplayacak şekilde uygulayınız ve eldiven takarak etkilenen bölgeye sürünüz. Klinik belirtilerin kaybolmasından sonra birkaç gün daha, 14 güne kadar tedaviye ara vermeden devam ediniz.

Bazı inatçı vakalarda 2-3 haftalık bir tedavi süresi önerilir. Mantar enfeksiyonu durumunda, eğer endike ise, kortikosteroid olmayan preparatlarla tedaviye devam edilmelidir.

Özel Klinik Bilgiler Ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar

Polimiksin B ve kolistin arasında ve ayrıca mikonazol ve diğer imidazol antifungaller arasında çapraz direnç vardır.

Ürünün kullanımı, ekim sonucuna ve hayvandan izole edilen mikroorganizmaların duyarlılığının belirlenmesine dayanmalıdır. Bu mümkün değilse, tedavi, hedef patojenlerin duyarlılığı hakkında yerel (bölgesel) epidemiyolojik bilgilere dayanmalıdır. Ürünü

kullanırken resmi ve yerel antimikrobiyal politikaları dikkate alınız. Polimiksin B, AMEG sınıflandırmasına göre B kategorisine aittir. Bu antimikrobiyaller yalnızca C veya D kategorilerinde etkili olabilecek antimikrobiyallerin bulunmadığı klinik durumların tedavisi için düşünülmelidir. Ürünün verilen talimatların dışında kullanılması, polimiksin B ve mikonazole dirençli bakterilerin prevalansını artırabilir ve olası çapraz direnç nedeniyle polimiksinler ve imidazol antifungaller grubundan diğer maddelerle tedavinin etkinliğini azaltabilir. *Otodectes cynotis* (kulak akarı) enfestasyonu vakalarında, uygun bir akarisit ile sistemik tedavi düşünülmelidir. Prednizolonun sistemik etkileri, ürün kullanılırken, özellikle geçirimsiz bir bandaj altında, geniş deri lezyonlarında, deride kan dolaşımı arttığında veya ürün bir hayvan tarafından yutulduğunda ortaya çıkabilir. Ürünü uygulamadan önce kulak zarının (*membrana timpani*) sağlam olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon sırasında değerlendirilmemiştir.

Yalnızca veteriner hekim tarafından fayda/risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

İstenmeyen Etkiler

Bu ilacın kullanımında (özellikle daha yaşlı köpeklerde), çok nadir olarak sağırılık görülebilir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. Kortikosteroid içeren topikal preparatların uzun süreli ve yoğun kullanımının, enfeksiyon riskinde artış, epidermal incelme ve gecikmiş iyileşme, telenjiyektazi ve kanamaya karşı cilt hassasiyetinde artış dahil olmak üzere lokal immünosupresyonu ve adrenal fonksiyonun baskılanması dahil sistemik etkileri tetiklediği bilinmektedir. Kortikosteroidlerin geleneksel yan etkileri ortaya çıkabilir (artmış kortizol ve hepatik enzim seviyeleri gibi biyokimyasal parametrelerin bozulması).

İlaç Etkileşimleri

Uyumluluk çalışmalarının mevcut olmaması halinde, bu veteriner tıbbi ürün diğer veteriner tıbbi ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler Ve Antidot

Bilinmemektedir.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

Uygulanabilir değil.

Kontrendikasyonlar

Mikonazol, Polimiksin B, prednizolona veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda kullanmayınız.

Polimiksin B'nin potansiyel bir ototoksik ajan olduğu bilindiğinden, perfore kulak zarı (*membrana timpani*) olan hayvanlarda kullanmayınız.

Genel Uyarılar

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler Ve Hekimler İçin Öneriler

Prednizolon, polimiksin B veya mikonazole karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişiler veteriner tıbbi ürün ile temastan kaçınmalıdır. Hamile ve emziren kadınlar ürünü dikkatle uygulamalıdır. Ürün cilt ve göz tahrişine neden olabilir, bu nedenle ürünün cilt ve gözlerle

temasından ve kazara yutulmasından kaçınınız. Veteriner tıbbi ürünü kullanırken, koruyucu eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Cilde temas etmesi halinde, bölgeyi derhal bol su ve sabunla yıkayınız. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Göz veya cilt tahrişi devam ederse veya ürünün kazara yutulması durumunda, derhal tıbbi yardım alın ve prospektüsü veya etiketi doktora gösteriniz.

Ürünü kullanırken sigara içmeyiniz, yiyecek ve içecek tüketmeyiniz. Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Muhafaza Şartları Ve Raf Ömrü

Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan, güneş ışığından korunarak 25°C' nin altında muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 aydır.

İç ambalajın açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 aydır.

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

Ticari Takdim Şekilleri

Karton kutuda beyaz, opak HDPE vidalı kapaklı; beyaz, opak LDPE damlatma kabı.

Ambalaj büyüklüğü: 1 x 15 ml

Satış Yeri Ve Şartları

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenecilerinde sadece veteriner hekimlere satılır (VHR-VH). Sadece veteriner hekimler tarafından kullanılabilir.

Prospektüsün Onay Tarihi:11.08.2026

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No:11.08.2026- 016/0035

Pazarlama İzni Sahibinin Adı Ve Adresi:

İntermed Ecza Deposu İthalat İhracat Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.

Sağlık 1 Sk. No: 32/4 Yenışehir Çankaya/ANKARA

Tel: (312) 435 95 60

Faks: (312) 435 73 51

intermed@interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Bioveta a.s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Çekya

Otimix Kedi ve Köpekler İçin Kulak Damlası Ve Deri Süspansiyonu
15 ml Dış Ambalaj Etiketi (1 x 15 ml)

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
OTİMİX

KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN KULAK DAMLASI VE DERİ SÜSPANSİYONU

Köpek ve kediler için Veteriner Otolojik, Kortikosteroid ve Antienfektif

Bileşimi:

Her 1 ml’de

Aktif Madde:

Mikonazol nitrat	23.0 mg
Polimiksin B sülfat	5,500 IU
Prednizolon asetat	5.0 mg

Kullanım Şekli ve Dozu

Köpek ve kedilerde kulak ve deride kullanılır.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

Uygulanabilir değil.

Genel Uyarılar

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Muhafaza Şartları Ve Raf Ömrü

Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan, güneş ışığından korunarak 25°C’ nin altında muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 aydır.

İç ambalajın açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 aydır.

Ticari Takdim Şekilleri

Karton kutuda beyaz, opak HDPE vidalı kapaklı; beyaz, opak LDPE damlatma kabı.

Ambalaj büyüklüğü: 1 x 15 ml

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzin Tarihi Ve No: 11.08.2026- 016/0035

Pazarlama İzin Sahibinin Adı ve Adresi:

İntermed Ecza Deposu İthalat İhracat Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.

Sağlık 1 Sk. No: 32/4 Yenışehir Çankaya/ANKARA

Tel: (312) 435 95 60

Üretim Yerinin Adı Ve Adresi:

Bioveta a.s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Çekya

K.D.V. Dahil Perakende Satış Fiyatı:

Seri Numarası:

Üretim Tarihi:

Son kullanma Tarihi:

Otimix kedi ve köpekler için kulak damlası ve deri süspansiyon 1x15 ml el ile sıkılan damlatma kabı (damlalık) etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Otimix

Kedi Ve Köpekler İçin Kulak Damlası Ve Deri Süspansiyonu

Bileşimi:

Her 1 ml’de;

Mikonazol nitrat 23.0 mg

Polimiksin B sülfat 5,500 IU

Prednizolon asetat 5.0 mg

Köpek ve kedilerde kulak ve deride kullanılır.

Satışa sunulmuş haliyle üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 aydır.

İç ambalajın açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 aydır.

Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

İntermed Ecza Deposu İth. İhr. Tic. ve Taah. Ltd. Şti.

Bioveta a.s., Çekya

Seri No:

S.K.T: