

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

OXY-T Deri Antibakteriyeli Sprey

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml'si

Aktif madde:

34,74 mg Oksitetrasiklin'e eşdeğer 37,50 mg Oksitetrasiklin HCl içerir.

Yardımcı maddeler:

2,0 mg Solvent Blue 45 renklendirici madde içerir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKLİ

Deri Spreyi

Mavi renkli süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür

Sığır, koyun, keçi, at, tavşan

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

Sığır, koyun, keçi, at ve tavşanlarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana gelen deri, meme, tırnak enfeksiyonları ve yaralanmalarda tedavi amacıyla kullanılır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Tetrasiklinlere aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Göze uygulanmamalıdır.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar

-

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

-

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Yanıcı olduğundan, uygulama sırasında sigara içilmemelidir.

Ateşe ve sıcak maddelere doğru püskürtmeyiniz.

Tamamen boşalttıktan sonra uygun şekilde imha edilmelidir.

Boş kutular ateşe atılmamalı ve zorla açılmamalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

-

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Aşırı duyarlı hayvanlarda geçici bir lokal duyarlılık görülebilir.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

-

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Penisilinler, sefalosporinler ve kinolonlarla birlikte kullanılmamalıdır.

4.9. Dozaj ve Kullanım yolu

Uygulanacak bölge tamamen temizlendikten sonra 15-20 cm uzaklıktan enfekte bölge üzerine püskürtülerek uygulanır. Günde 1-2 uygulama yapılır.

İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.

Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Sadece topikal uygulama içindir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

-

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Gerekli değildir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Topikal kullanım için antibiyotikler, tetrasiklinler

ATC Vet Kodu: QD06AA03

5.1 Farmakodinamik özellikler

Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup çoğu gram pozitif, gram negatif ve anaerob bakterilere karşı etkinlik gösterir. Hücre içinde bakteriyel ribozomun 30S alt birimindeki reseptörlere geri dönülemez şekilde bağlanır ve burada aminosil transfer RNA'nın habercisi RNA ribozom kompleksi üzerinden alıcı bölgeye bağlanmasına müdahale eder. Protein sentezini inhibe ederek, uzayan peptid zincirine amino asitlerin eklenmesi etkili bir şekilde önler.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Oksitetrasiklin deriden emilmediği için topikal olarak etkir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Tween 80

Aerosil 200

Solvent Blue 45

Alcoter*

İzopropil Alkol

Likit Petrol Gazı

6.2 Geçimsizlikler

-

6.3 Raf ömrü

Belirtilen koşullarda muhafaza edilen ilacın raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

6.4 Muhafaza şartları

25 °C'nin altında, güneş ışığından korunarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır. Isı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

200 ml'lik alüminyum tüplerde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok NO:66A İç Kapı No:8
Kartal/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

14/029

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:

30.12.2004

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:

22.06.2026

Prospektüs-İç- Dış Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

OXY-T

Deri Antibakteriyeli

Sprey

BİLEŞİMİ:

200 ml'lik alüminyum şişede bulunan mavi renkli süspansiyonun her ml'si;
34,74 mg Oksitetrasiklin'e eşdeğer 37,50 mg Oksitetrasiklin HCl içerir. Renklendirici madde olarak 2,0 mg Solvent Blue 45 içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Farmakodinamik özellikleri: Oksitetrasiklin, tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup çoğu gram pozitif, gram negatif ve anaerob bakterilere karşı etkinlik gösterir.

Hücre içinde bakteriyel ribozomun 30S alt birimindeki reseptörlere geri dönülemez şekilde bağlanır ve burada aminosil transfer RNA'nın habercisi RNA ribozom kompleksi üzerinden alıcı bölgeye bağlanmasına müdahale eder. Protein sentezini inhibe ederek, uzayan peptid zincirine amino asitlerin eklenmesi etkili bir şekilde önler.

Farmakokinetik özellikleri: Oksitetrasiklin deriden emilmediği için topikal olarak etkir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Sığır, koyun, keçi, at ve tavşanlarda oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana gelen deri, meme, tırnak enfeksiyonları ve yaralanmalarda tedavi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Uygulanacak bölge tamamen temizlendikten sonra 15-20 cm uzaklıktan enfekte bölge üzerine püskürtülerek uygulanır. Günde 1-2 uygulama yapılır.

İyileşme tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.

Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Sadece topikal uygulama içindir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Aşırı duyarlı hayvanlarda geçici bir lokal duyarlılık görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Penisilinler, sefalosporinler ve kinolonlarla birlikte kullanılmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Gerekli değildir.

KONTRENDİKASYONLAR:

Tetrasiklinlere aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Göze uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Yanıcı olduğundan, uygulama sırasında sigara içilmemelidir.
Ateşe ve sıcak maddelere doğru püskürtmeyiniz.
Tamamen boşalttıktan sonra uygun şekilde imha edilmelidir.
Boş kutular ateşe atılmamalı ve zorla açılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25°C'nin altında, güneş ışığından korunarak, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, orijinal ambalajında saklanmalıdır. Isı kaynaklarından ve yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

200 ml'lik alüminyum tüplerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.06.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
30.12.2004 - 14/029

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

TOPKİM - Topkapı İlaç Premiks San. ve Tic. A.Ş.
Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi A Blok NO:66A İç Kapı No:8
Kartal/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Provet Veteriner Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çekirdeksiz Org. San. Böl. 210. Cad. No: 7 Polatlı / Ankara



YANICI MADDE