

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Paraminod Oral Çözelti Tozu

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Her gram:

Aktif madde:

70 mg Paromomisin baza (Aminosidin baz) eşdeğer 100 mg Paromomisin Sülfat içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Beyaz homojen oral çözelti tozu

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Buzağılar

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Paraminod Oral Çözelti Tozu, buzağılarda; *E.coli*, *Salmonella* ve *Cryptosporidium parvum* tarafından oluşturulan enteritiserin tedavisinde kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Belirtilen doz ve aralıklarda kullanıldığında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Rumen faaliyetleri başlamış ruminantlarda kullanılması tavsiye edilmez.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar.

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar:

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar:

(iii) Diğer uyarılar:

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Uzun süre kullanıldığında sindirim kanalı mikroflorasını bozabilir. Aminoglikozitlerin işitme ve denge organları üzerinde olumsuz etkileri vardır.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Paraminod Oral Çözelti Tozu kontrendike değildir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Beta-laktam antibiyotikler ve basitrasın gibi hücre duvarına etkili antibiyotiklerle sinerjik etkileşim gösterir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Farmakolojik Dozu:

Kolibasilloz ve Salmonellozis için 25-50 mg Aminosidin sülfat/ kg vücut ağırlığı, Kriptosporidiozis için 50-100 mg Aminosidin sülfat/kg vücut ağırlığıdır.

Pratik Dozu:

Buzağılarda	Dozu (100 kg vücut ağırlığı/gün)	Kullanım Süresi
Kolibasilloz ve Salmonellozis	25-50 g Paraminod	3 - 5 Gün
Kriptosporidiozis	50-100 g Paraminod	5 Gün

İçme suyuna veya süte katılarak oral yolla kullanılır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Zehirlenme belirtileri görülmez.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 30 gün geçmeden sığırlar, kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaması önerilir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup: Veteriner Antibakteriyel / Antiprotozoal

ATC Vet Kodu: QA07AA06.

5.1 Farmakodinamik Özellikler

Paraminod Oral Çözelti Tozu'nun etkin maddesini oluşturan Paromomisin sülfat, aminoglikozid yapılı antibiyotiktir. Paromomisin (Aminosidin), aminoglikozid grubundan bir antibiyotiktir. Pek çok Gram (-) bakteri ile bazı Gram (+) bakteri ve protozoalara karşı etkilidir. Etkisini ribozomlara irreverisiblen bağlanarak, protein sentezini aksatmak yoluyla gösterir. Etki spektrumuna *Salmonella typhimurium* ve *S.pullorum*, *E. coli*, *Streptococcus agalactiae*, *S. equisimilis*, *S.hyicus*, *Diplococcus pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus sp.*, *Brucella abortus* ve *B. melitensis* ile daha yüksek konsantrasyonlarda *Mycobacterium tuberculosis* gibi bakteriler ve *Cryptosporidium parvum*, *Entamoeba histolytica*, *Trichomonas sp.*, *Giardia intestinalis*, *Leishmania sp.* gibi protozoalar girer. Aminosidin, özellikle *Salmonella*, *E. coli* ve *Cryptosporidium* tarafından oluşturulan enteritislerin tedavisinde etkilidir. Diğer antibiyotiklerle çapraz direnç gözlenmez.

5.2 Farmakokinetik Özellikler

Paraminod Oral Çözelti Tozu hayvanlara Oral yolla uygulandıktan sonra kısa sürede etkisini gösteren aminosidin, gastrointestinal sistemde kalmakta ve sindirim sisteminden çok az miktarda emilmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki patojenlere karşı yüksek seviyede etki sağlar.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Laktoz Monohidrat

Silika Kolloidal anhidrus (Aerosil)

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizlik yoktur.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: Raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 ay

Sulandırıldıktan sonraki raf ömrü:48 saat

Süt ile seyreltilmiş ürünün raf ömrü: 24 saat

6.4 Muhafaza Şartları

Orijinal paketinde, 25 °C altında, güneş ışığından koruyarak saklayınız. Dondurmayınız ve buzdolabında saklamayınız.

6.5 Birincil Ambalajın Niteliği ve Kompozisyonu

Yüksek yoğunluklu polietilen opak beyaz kilitli, sıvalı kapakla kapatılmış, 1 kg' lık yüksek yoğunluklu polietilen opak beyaz kavanozlarda kutusuz satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Medicavet Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. Medicavet Blok No:1 Tuzla/İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

025/0076

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

23.03.2012

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

31.03.2026

Prospektüs/Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Paraminod

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyel / Antiprotozoal

BİLEŞİMİ

Paraminod, beyaz homojen toz olup, her gramında 70 mg Paromomisin baza (Aminosidin baz) eşdeğer 100 mg Paromomisin Sülfat (Aminosidin Sülfat) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Paromomisin (Aminosidin), aminoglikozid grubundan bir antibiyotiktir. Pek çok Gram (-) bakteri ile bazı Gram (+) bakteri ve protozalara karşı etkilidir. Etkisini ribozomlara irreversible bağlanarak, protein sentezini aksatmak yoluyla gösterir. Etki spektrumuna *Salmonella typhimurium* ve *S.pullorum*, *E. coli*, *Streptococcus agalactiae*, *S. equisimilis*, *S.hyicus*, *Diplococcus pneumoniae*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus sp.*, *Brucella abortus* ve *B. melitensis* ile daha yüksek konsantrasyonlarda *Mycobacterium tuberculosis* gibi bakteriler ve *Cryptosporidium parvum*, *Entamoeba histolytica*, *Trichomonas sp.*, *Giardia intestinalis*, *Leishmania spp.* gibi protozoalar girer. Oral yolla alındıktan sonra kısa sürede etkisini gösteren aminosidin, gastrointestinal sistemde kalmakta ve sindirim sisteminden çok az miktarda emilmektedir. Dolayısıyla bu noktadaki patojenlere karşı yüksek seviyede etki sağlar. Aminosidin, özellikle *Salmonella*, *E. coli* ve *Cryptosporidium spp.* tarafından oluşturulan enteritiserin tedavisinde etkilidir. Diğer antibiyotiklerle çapraz direnç gözlenmez.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Paraminod buzağılarda: *E.coli*, *Salmonella spp.* ve *Cryptosporidium parvum* tarafından oluşturulan enteritiserin tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik Dozu:

Kolibasilloz ve Salmonellozis için 25-50 mg Aminosidin sülfat/ kg canlı ağırlık, Kriptosporidiozis için 50-100 mg Aminosidin sülfat/kg canlı ağırlıktır.

Pratik Dozu:

Buzağılarda	Dozu(100 kg canlı ağırlık/gün)	Kullanım Süresi
Kolibasilloz ve Salmonellozis	25-50 g Paraminod	3-5 Gün
Kriptosporidiozis	50-100 g Paraminod	5 gün

İçme suyuna veya süte katılarak oral yolla kullanılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Rumen faaliyetleri başlamış ruminantlarda kullanılması tavsiye edilmez.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uzun süre kullanıldığında sindirim kanalı mikroflorasını bozabilir. Aminoglikozitlerin işitme ve denge organları üzerinde olumsuz etkileri vardır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Beta-laktam antibiyotikler ve basitrasin gibi hücre duvarına etkili antibiyotiklerle sinerjik etkileşim gösterir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Zehirlenme belirtileri görülmez.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra Ruminasyonu başlatmamış buzağılar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Belirtilen doz ve aralıklarda kullanıldığında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

“Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.”

“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.”

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.”

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal paketinde oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü 36 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Yüksek yoğunluklu polietilen opak beyaz kilitli, sıvalı kapakla kapatılmış, 1 kg’ lık yüksek yoğunluklu polietilen opak beyaz kavanozlarda kutusuz satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile, veteriner muayenahanelerinde, eczanelerde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 31.03.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO.

23.03.2012- 025/0076

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Medicavet Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. Medicavet Blok No:1 Tuzla/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Classpharma Tarım Hayvancılık İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. Medicavet Blok No:1 Tuzla/İstanbul

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı:

Üretim Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi: