ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
Pendistrepto Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her ml:
Aktif madde:
Benzilpenisilin prokain……...200 mg
Dihidrostreptomisin sülfat……..250 mg

Yardımcı maddeler:
Sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) 3.7 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk süspansiyon
Çalkalandığında beyaz renkli,kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Hedef tür
Sığır, koyun, at

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Kombinasyona duyarlı aşağıdaki mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisi;
Arcanobacterium pyogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae
Klebsiella pneumoniae
Listeria spp
Mannheimia haemolytica
Pasteurella multocida
Staphylococcus spp (penisilinaz üretmeyen)
Streptococcus spp
Salmonella spp

4.3 Kontrendikasyonlar
Betalaktamlara duyarlı hayvanlarda kullanılmaz.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Böbrek rahatsızlığı veya fonksiyonel bozukluğu olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Tavşan ve küçük rodentlerde kullanılmaz.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Tavsiye edilen dozu aşmamaya özen gösteriniz. Aminoglikozidler penislinlerden daha dar güvenlik marjına sahiptir.
Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakterilere ait duyarlılık sonuçlarına göre kullanınız. Bu mümkün değilse, tedavi bölgesel epidemiyolojik verilere dayandırılmalıdır. Bu ürünün

kullanım talimatından farklı şekilde kullanılması, betalaktam veya aminoglikozidlere dirençli bakterilerin gelişmesine ve çapraz direnç nedeniyle diğer bakterilere karşı etkinliğin azalmasına neden olabilir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Kazara kendinize enjeksiyondan kaçınmak için gerekli önlemleri alınız. Böyle bir durumda derhal tıbbi destek alınız.
Penislin ve sefalosporinler, deriye temas, ağız yolu ile alma, solunum yoluyla alma veya enjeksiyon sonrasında aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonlarına neden olabilir. Penisilinler ile sefelosporinler arasında karşılıklı çapraz reaksiyon söz konudur. Alerjik reaksiyonlar nadiren çok ciddi olabilir.
1- Duyarlı iseniz veya bu tür ürünlerle temas etmemeniz gerektiği söylenmişse kesinlikle ürünü kullanmayınız.
2-Ürünün uygulanması sırasında maruziyeti engellemek için gerekli önlemleri alınız.
3-Maruziyet sonrası deride kızarıklık gibi belirtiler görürseniz derhal etiket ve prospektüs ile birlikte doktora başvurunuz. Yüz, göz veya dudaklarda şişme veya nefes almada zorluk gibi belirtiler çok daha ciddi belirtilerdir ve çok acil tıbbi müdahale gerektirir.
Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Atlarda kas içi enjeksiyon sonrası geçici lokal reaksiyon gözlenebilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar bölgesel şişliklerden anafilaksi ve ölüme kadar uzanabilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda, işitme ve denge bozuklukları, böbrek fonksiyonlarında bozulma oluşabilir. Dihidrostreptomisinin nöromuskuler blokaj etkisi nedeniyle kramp ve nefes almada güçlük görülebilir. Yan etki görülmesi halinde tedavi kesilerek görülen yan etkiye göre tedavi yapılması önerilir. Aminoglikozidlerin nöromuskuler blokaj etkileri kalsiyum ve neostigmin uygulaması ile kısmen giderilebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Ürünün gebe hayvanlarda güvenilir kullanımına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Gebe hayvanlarda kullanımı Veteriner Hekimin fayda/risk değerlendirmesine tabidir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Diğer aminoglikozidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Vaskuler depresyon riski nedeniyle pentobarbital ve diğer inhalasyon anesteziklerle kullanılmamalıdır.
Nöromuskuler blokajı artıran diğer ürünlerle birlikte (kas gevşeticiler) ve ototoksisite riskini artırması nedeniyle diüretiklerle birlikte kullanılmaz.
Heparin, kalsiyum glukonat, riboflavin ve triamkinolon ile birlikte uygulanmaz. Prokainin etkisini azaltması nedeniyle, sülfonamidlerle birlikte kullanılmaz.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.
Derin kas içi uygulanır.
Sığır, koyun ve at: 8 mg/kg vücut ağırlığı benzil penisilin prokain ve 10 mg/kg vücut ağırlığı dihidrostreptomisin sülfat dozunda, pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. Atlarda bir bölgeye en fazla 15, sığırlarda 6, koyunlarda 3 ml uygulanmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar
Dihidrostreptomisinin aşırı dozda uygulanması, nöromuskuler blokaj ve diğer etkiler nedeniyle kaslarda zayıflık ve solunum arrestine neden olabilir. Prokain zehirlenmesi, çırpınma, hipotansiyon ve psikoza neden olabilir. Atlar prokainin yan etkilerine en etkili türdür. Kaslarda zayıflık, inkoordinasyon, dengesizlik, heyecan, çırpınma gibi diğer sinir sistemi bulguları diğer hayvanlarda görülmüştür.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 64 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 120 saat (10 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapotik grup: Sistemik amaçlı antibakteriyeller, Antibakteriyel kombinasyonları
ATC Vet Kodu: QJ01RA01

5.1 Farmakodinamik özellikler
Penisilin G beta-laktam grubu bir antibiyotiktir ve yapısında diğer penisilinler gibi tiazolidin ve beta-laktam halkaları bulunur. Beta-laktamlar, duyarlı Gram pozitif bakterilerde bakteri hücre duvarının gelişmesini, peptidoglikan sentezini final aşamadan engelleyerek etki gösterir. Transpeptidaz enzimini inhibe eder. Bakterisidal etki gösterir ve gelişen hücrelerin lizisine neden olur.
Dihidrostreptomisin Gram negatif bakterilere karşı etkili aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Bakteriyel ribozomlarda 30S alt ünitesi üzerindeki reseptörlere bağlanarak etki gösterir. Bunun sonucunda mRNA üzerindeki kodlar yanlış okunur ve bakteriyostasis gelişir. Aminoglikozidler betalaktamlar ile sinerjik etki gösterir.

5.2 Farmakokinetik özellikler
Enjeksiyondan sonra prokain penisilin enjeksiyon bölgesinden hızla emilir, uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra plazma maksimum seviyesi elde edilir. (At, koyun ve domuzlarda 1-2 µg/ml, sığırlarda 0.5 µg/ml).
Penisilinin eliminasyon yarılanma ömrü koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, sığırlarda 5 saat, atlarda 11 saattir.
Dİhidrostreoptomisin benzer oranlarda emilir, plazma maksimum seviyeleri domuz, koyun ve sığırlarda yaklaşık 23 µg/ml, atlarda 15 µg/ml'dir. Eliminasyon yarılanma ömrü sığır, koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, atlarda 4 saattir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Prokain hidroklorid
Sodyum sitrat dihidrat
Karboksimetilselüloz sodyum
Polivinilpirolidon
Sodyum formaldehit sülfoksilat
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler
Bu ürün diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

6.4 Muhafaza şartları
25 ° C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şiselerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Ataturk Mah. Ertugrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Ataşehir İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:009/0890

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ
11.04.2005-009/0890

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
10.09.2026

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pendistrepto
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik
Penisilin G beta-laktam grubu bir antibiyotiktir ve yapısında diğer penisilinler gibi tiazolidin ve beta-laktam halkaları bulunur. Beta-laktamlar, duyarlı Gram pozitif bakterilerde bakteri hücre duvarının gelişmesini, peptidoglikan sentezini final aşamadan engelleyerek etki gösterir. Transpeptidaz enzimini inhibe eder. Bakterisidal etki gösterir ve gelişen hücrelerin lizisine neden olur.
Dihidrostreptomisin Gram negatif bakterilere karşı etkili aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Bakteriyel ribozomlarda 30S alt ünitesi üzerindeki reseptörlere bağlanarak etki gösterir. Bunun sonucunda mRNA üzerindeki kodlar yanlış okunur ve bakteriyostasis gelişir. Aminoglikozidler betalaktamlar ile sinerjik etki gösterir.

Farmakokinetik özellikler
Enjeksiyondan sonra prokain penisilin enjeksiyon bölgesinden hızla emilir, uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra plazma maksimum seviyesi elde edilir (At, koyun ve domuzlarda 1-2 µg/ml, sığırlarda 0.5 µg/ml).
Penisilinin eliminasyon yarılanma ömrü koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, sığırlarda 5 saat, atlarda 11 saattir.
Dihidrostreoptomisin benzer oranlarda emilir, plazma maksimum seviyeleri domuz, koyun ve sığırlarda yaklaşık 23 µg/ml, atlarda 15 µg/ml'dir. Eliminasyon yarılanma ömrü sığır, koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, atlarda 4 saattir.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR
Sığır, koyun ve atlarda kullanılır.
Kombinasyona duyarlı aşağıdaki mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisi;
Arcanobacterium pyogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae
Klebsiella pneumoniae
Listeria spp
Mannheimia haemolytica
Pasteurella multocida
Staphylococcus spp (penisilinaz üretmeyen)
Streptococcus spp
Salmonella spp

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.
Derin kas içi uygulanır.

Sığır, koyun ve at: 8 mg/kg vücut ağırlığı benzil penisilin prokain ve 10 mg/kg vücut ağırlığı dihidrostreptomisin sülfat dozunda, pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. Atlarda bir bölgeye en fazla 15, sığırlarda 6, koyunlarda 3 ml uygulanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Böbrek rahatsızlığı veya fonksiyonel bozukluğu olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Tavşan ve küçük rodentlerde kullanılmaz.
Tavsiye edilen dozu aşmamaya özen gösteriniz. Aminoglikozidler penisilinlerden daha dar güvenlik marjına sahiptir.
Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakterilere ait duyarlılık sonuçlarına göre kullanınız. Bu mümkün değilse, tedavi bölgesel epidemiyolojik verilere dayandırılmalıdır. Bu ürünün kullanım talimatından farklı şekilde kullanılması, betalaktam veya aminoglikozidlere dirençli bakterilerin gelişmesine ve çapraz direnç nedeniyle diğer bakterilere karşı etkinliğin azalmasına neden olabilir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı
Ürünün gebe hayvanlarda güvenilir kullanımına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Gebe hayvanlarda kullanımı Veteriner Hekimin fayda/risk değerlendirmesine tabidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Atlarda kas içi enjeksiyon sonrası geçici lokal reaksiyon gözlenebilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar bölgesel şişliklerden anafilaksi ve ölüme kadar uzanabilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda, işitme ve denge bozuklukları, böbrek fonksiyonlarında bozulma oluşabilir. Dihidrostreptomisinin nöromuskuler blokaj etkisi nedeniyle kramp ve nefes almada güçlük görülebilir. Yan etki görülmesi halinde tedavi kesilerek görülen yan etkiye göre tedavi yapılması önerilir. Aminoglikozidlerin nöromuskuler blokaj etkileri kalsiyum ve neostigmin uygulaması ile kısmen giderilebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer aminoglikozidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Vaskuler depresyon riski nedeniyle pentobarbital ve diğer inhalasyon anesteziklerle kullanılmamalıdır.
Nöromuskuler blokajı artıran diğer ürünlerle birlikte (kas gevşeticiler) ve ototoksisite riskini artırması nedeniyle diüretiklerle birlikte kullanılmaz.
Heparin, kalsiyum glukonat, riboflavin ve triamkinolon ile birlikte uygulanmaz. Prokainin etkisini azaltması nedeniyle, sülfonamidlerle birlikte kullanılmaz.
Bu ürün diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER ve ANTİTOD

Dihidrostreptomisinin aşırı dozda uygulanması, nöromuskuler blokaj ve diğer etkiler nedeniyle kaslarda zayıflık ve solunum arrestine neden olabilir. Prokain zehirlenmesi, çırpınma, hipotansiyon ve psikoza neden olabilir. Atlar prokainin yan etkilerine en etkili türdür. Kaslarda zayıflık, inkoordinasyon, dengesizlik, heyecan, çırpınma gibi diğer sinir sistemi bulguları diğer hayvanlarda görülmüştür.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 64 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 120 saat

(10 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI
Betalaktamlara duyarlı hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Kazara kendinize enjeksiyondan kaçınmak için gerekli önlemleri alınız. Böyle bir durumda derhal tıbbi destek alınız.
Penislin ve sefalosporinler, deriye temas, ağız yolu ile alma, solunum yoluyla alma veya enjeksiyon sonrasında aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonlarına neden olabilir. Penisilinler ile sefelosporinler arasında karşılıklı çapraz reaksiyon söz konudur. Alerjik reaksiyonlar nadiren çok ciddi olabilir.
1- Duyarlı iseniz veya bu tür ürünlerle temas etmemeniz gerektiği söylenmişse kesinlikle ürünü kullanmayınız.
2-Ürünün uygulanması sırasında maruziyeti engellemek için gerekli önlemleri alınız.
3-Maruziyet sonrası deride kızarıklık gibi belirtiler görürseniz derhal etiket ve prospektüs ile birlikte doktora başvurunuz. Yüz, göz veya dudaklarda şişme veya nefes almada zorluk gibi belirtiler çok daha ciddi belirtilerdir ve çok acil tıbbi müdahale gerektirir.
Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 ° C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şiselerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.
Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde, Veteriner Hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 10.09.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ.İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Ataşehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Laboratorios Syva, S.A.U
1. Üretim Yeri Adresi:
Parque Tecnológico de León
Calle Nicostrato Vela,M15-M16 Parcelas 15-16
24009 León Spain
2. Kalite Kontrol ve Seri Serbest Bırakma Adresi:
Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 León Spain

Dış etiket (50 ml, 100 ml ve 250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pendistrepto
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR
Sığır, koyun ve atlarda kullanılır.
Kombinasyona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.
Derin kas içi uygulanır.
Sığır, koyun ve at : pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. **Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.**

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır ve koyun eti için 64 gün, inek sütü için 120 saat(10 sağım), insan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 ° C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şiselerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.
Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde, Veteriner Hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ.İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Ataşehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Laboratorios Syva, S.A.U
1. Üretim Yeri Adresi:
Parque Tecnológico de León
Calle Nicostrato Vela,M15-M16 Parcelas 15-16
24009 León Spain
2. Kalite Kontrol ve Seri Serbest Bırakma Adresi:
Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 León Spain

Seri no:
Üretim tarihi:
Son.kul.tarihi:

KDV dahil PSF:

İç etiket (100 ml ve 250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pendistrepto
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR
Sığır, koyun ve atlarda kullanılır.
Kombinasyona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.
Derin kas içi uygulanır.
Sığır, koyun ve at : pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. **Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.**

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır ve koyun eti için 64 gün, inek sütü için 120 saat(10 sağım), insan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 ° C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şiselerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.
Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde, Veteriner Hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ. İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Atasehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Laboratorios Syva, S.A.U
León-İspanya

Seri no:
Üretim tarihi:
Son.kul.tarihi:

İç etiket (50 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Pendistrepto
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ
Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR
Pratik olarak; Sığır, koyun ve atlarda 1 ml/25 kg, kedi ve köpeklerde 0,5 ml/5 kg 'dır.
Sığır,koyun,at, kedi ve köpeklerde kullanılır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Et için:64 gün
İnek sütü için:120 saat(10 sağım)
İnsan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 ° C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şiselerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.
Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ. İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ataşehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Laboratorios Syva, S.A.U
León-İspanya

Seri no:
Üretim tarihi:
Son.kul.tarihi: