

Prospektüs, İç ve Dış Ambalaj Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

PIPERVET

Oral Toz

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

PIPERVET Oral Toz beyaz kristalize, suda kolayca çözünebilen toz olup her gramında 500 mg Piperazin diklorhidrat (270 mg Piperazin baza eşdeğer) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

PIPERVET Oral Toz etkin maddesi olan Piperazin dietilendiamid türevi antinematodal bir antihelmintiktir. Nematodların kas sinir bağlantısında kolinerjik etki ile önce hiperpolarizasyon, bunu takiben reversabl gevşek felç meydana getirir, enerjisini yitiren parazit barsak peristaltığı ile yer değiştirir, dışkı ile atılır. Dar spektrumlu bir antihelmintiktir. Piperazin barsakların ön bölümünden hızla ve tama yakın oranda emilir. 1-8 saat içinde kanda en yüksek konsantrasyona erişir. Esas olarak idrarla kısmen, kısmen de dışkı ile atılır. Kısmen metabolize olur. Kanatlılarda %70'ten fazlası ilk 24 saat içinde tamamı 3 gün içinde vücuttan atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

PIPERVET Oral Toz, tavuklarda yaşayan *Ascaridia galli* ve *Heterakis gallinarum* ile kedi ve köpeklerde görülen *Toxocara canis* ve *Ancylostoma duodenale* türlerinin mücadelesinde tedavi amaçlı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

PIPERVET Oral Toz'un pratik dozları; 4-8 haftalık civciv için günlük 0.1 - 0.2 g hesabıyla 2 gün, 8-12 haftalık her piliç için günlük 0.2-0.6 g hesabıyla 2 gün, 12-20 haftalık her piliç için günlük 0.4-0.6 g hesabıyla 2 gün, 20 haftalıktan büyük her piliç için günlük 0.5-1g hesabıyla 2 gün uygulanır.

Kedi ve köpekler için günlük 100-150 mg/kg vücut ağırlığı ile hesaplanır. İlaç, hayvanların içme sularına katılarak 2 gün boyunca uygulanır. Ortalama 7 veya 14 gün sonra uygulama tekrarlanır. Kullanılacak ilaçlı su günlük olarak hazırlanmalıdır.

Hayvan Türü	Doz (PIPERVET Toz)	Tedavi Süresi
Tavuklar		
4-8 haftalıklar	0.1-0.2 g/civciv/gün	2 gün
8-12 haftalıklar	0.2-0.6 g/piliç/gün	2 gün
12-20 haftalıklar	0.4-0.6 g/piliç/gün	2 gün
20 haftalıktan büyükler	0.5-1 g/tavuk/gün	2 gün
Kedi ve köpekler	100-150 mg/kg vücut ağırlığı/gün	2 gün

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

İlaçlı içme suyunun kısa sürede ve tam olarak tüketilmesini sağlamak için, ilaçlı içme suyu verilmeden önce hayvanların 2 - 3 saat süreyle susuz bırakılması önerilir. Hazırlanan ilaçlı su tümüyle bitene kadar (en fazla 48 saat) hayvanların önünde tutulmalı ve bu sürede başka su verilmemelidir. Nematodlar barsakta ergin halde bulunur, burada yumurtlar.PIPERVET Oral Toz, kokusuz ve lezzetsiz olduğundan suyun tadını bozmaz.

Gebelikte ve Doğum Sonrasında Kullanımı: Gebelikte ilacın güvenli kullanımı konusunun tam aydınlanmaması nedeniyle gebelikte kullanılmaması tavsiye edilir. Emziren kedi ve köpeklerde kullanılmaması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Yüksek sağıltım dozları özellikle köpek ve kedilerde nörotoksik etki yaparak kusma, ishal ve koordinasyon bozukluğuna neden olabilir. Çok yoğun askarit invazyonlarında ilacın etkisi ile felç olan askaritler, barsaklardan atılmaları sırasında yumak haline gelerek barsak lumenini tıkayabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Piperazin, fenotiyazin ile beraber kullanıldığında kramplara ve aşırı duyarlılığa neden olabilir. Levamizol, pirantel ve morantel gibi kolinerjik antihelmintiklerle bir arada kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Uzun süreli ve aşırı yüksek dozlarda kullanılması durumunda bulantı, kusma, ishal, koordinasyon bozukluğu görülebilir.Bu durumda ilaçla tedaviye son verilir ve bol sıvı uygulamasıyla böbreklerden atılım sağlanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tavuk eti ve yumurta için ilaç kalıntı arınma süresi sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

“Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.”

“Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.”

“Gıdalarla bir arada bulundurmayınız.”

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Piperazine duyarlılığı olan kişilerin ağız, deri ve solunum yoluyla ilaca maruz kalmaktan sakınması gerekir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-30 °C), kuru yerde ve güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Raf ömrü 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde; 1 kg polietilen poşetlerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle eczane, veteriner hekim kliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ

03.03.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.

05.07.1985-005/0488

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. MEDICAVET BLOK NO:1 Tuzla/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

CLASSPHARMA TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. MEDICAVET BLOK NO:1 Tuzla/İSTANBUL

Üretim tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi:

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı: