

Prospektüs-İç Ve Dış Ambalaj Etiketleri (1 Kg)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

PREVENTIUM %45

Oral Çözelti Tozu

Veteriner Sistemik Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu, her g'ında 450 mg Tiamulin hidrojen fumarat içeren, suda çözünen beyaz-açık krem renkli oral çözelti tozudur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu'nun etken maddesi olan Tiamulin hidrojen fumarate (veya 14-desoxy-14[(2-diethylamino-ethyl) mercaptoacetoxy]), yarı sentetik olarak türetilmiş pleuromutin grubu bir antibiyotiktir. Patojen mikoplazma ve bakterilerin protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Aşağıda belirtilen patojenik Mycoplasma türlerine, gram pozitif ve bazı gram negatif bakterilere karşı klinik olarak etkinlik gösterir: *Mycoplasma* spp.: *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *Ureaplasma* spp., *M. hyopneumoniae* (syn. *M. suisneumonia*), *M. hyorhinis*, *M. hyosynoviae*, *M. dispar*, *M. bovirhinis*, *M. bovis*. Gram-pozitif: *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Erysipelothrix* spp., *Corynebacterium pyogenes*. Gram-negatif: *Pasteurella* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides* spp., *Campylobacter* (Vibrio) coli *Treponema*: *Serpulina* (treponema) *hyodysenteriae*. *Leptospira*: *Leptospira* spp.

Farmakokinetik özellikler

Memeliler ve kanatlılarda yapılan farmakokinetik çalışmalar, tiamulinin oral ya da enjeksiyon yoluyla alınmasından sonra hızlı ve hemen hemen tamamen emildiğini ve ilacın klirensinin klasik farmakokinetik modelleri takip ettiğini göstermektedir. Oral uygulamanın ardından, gastro-intestinal yoldan hızla absorbe olur ve 2-4 saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Uygulamanın ardından tiamulin, 24 saat içinde çok az ya da hiç biyolojik aktiviteye sahip olmayan metabolitlerine hızla dönüşür. Çoğunluğu safradan dışkı ile, az bir kısmı da idrarla atılır.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu; etçi ve damızlık tavuk ve hindilerde tiamuline duyarlı mikroorganizmalardan kaynaklanan enfeksiyonlarda kullanılır. Başlıca *Mycoplasma gallisepticum* ve *Mycoplasma synoviae* kaynaklı hastalıkların, solunum sistemi (Kronik solunum hastalığı) ve artiküler sistem enfeksiyonların (enfeksiyöz sinovitis) tedavisinde etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kronik Solunum Hastalığının (CRD) ve Hava kesesi Yangısının (air sacculitis) ve enfeksiyöz sinüzit tedavisinde farmakolojik doz ortalama 30-60 mg Tiamulin / kg vücut ağırlığı/ gündür.

Tavuklarda ve Hindilerde Pratik Doz:

750 kg vücut ağırlığı için 100 g **PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu** yeterlidir. Tedaviye 3-5 gün devam edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Su alımı azalmış ve/veya zayıf durumdaki hayvanlar parenteral olarak tedavi edilmelidir. Kuşlarda tiamulin uygulaması sırasında su alımı azalabilir. Kanatlıların genel performansı veya veteriner tıbbi ürünün etkinliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur, ancak özellikle sıcak havalarda su alımı sık aralıklarla izlenmelidir.

Ürünün kullanımı, hayvandan izole edilen bakterilerin duyarlılık testlerine dayanmalıdır. Bu mümkün değilse, tedavi hedef bakterilerin duyarlılığı hakkında yerel (bölgesel, çiftlik düzeyinde) epidemiyolojik bilgilere dayanmalıdır. Veteriner tıbbi ürünün yanlış kullanımı, tiamuline dirençli bakteri prevalansını artırabilir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebelikte kullanımı kontrendike değildir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Tavsiye edilen doz oranının maksimum beş katına kadar dozaj uygulanan hayvanlarda hiçbir istenmeyen etki belirlenmemiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

PREVENTIUM %45 Oral Çözelti Tozu tedavi sırasında, tedaviden önce veya sonra en az yedi gün boyunca monensin, salinomycin veya narasin iyonoforlarını içeren ürünler kullanılmamalıdır. Kullanılması durumunda, büyümede depresyon veya ölüm oluşabilir. Diğer sık kullanılan yem katkıları ile bir etkileşim saptanmamıştır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Önerilen dozlarda hedef türlerde kullanımı güvenlidir.

GIDALARDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar ve hindiler 3 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuk ve hindilerde kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Önerilen doz ve süre içinde kullanıldığında herhangi bir kontrendikasyona sahip değildir.

GENEL UYARILAR

“Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

“Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.”

“Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.”

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Kullanım sırasında eldiven ve gözlük takılmalı, karıştırırken, deri ve mukozalar ile direkt temastan kaçınılmalıdır. Deri ya da göz ile temas etmesi halinde derhal bol su ile 15 dakika yıkayınız ve bir doktora başvurunuz. Yutulması halinde derhal bol miktarlarda süt, yumurta akı, jelatin solüsyonu ya da bunları bulamazsanız su içiniz ve etiketli bir ürün ambalajı ile derhal doktora başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında, güneş ışığından ve nemden korunarak muhafaza edilir. Dondurmayınız ve buzdolabında saklamayınız. Açıldıktan sonraki saklama koşulları satışa sunulmuş haliyle aynıdır. Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay. İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 ay. İlaçlı içme suyunun raf ömrü: 24 saat.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ile ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Yüksek yoğunluklu polietilen opak, kilitli sıvalı kapakla kapatılmış 1kg'lık yüksek yoğunluklu polietilen şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:02.03.2026**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.**

13.04.2009-021 /0024

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

MEDICAVET TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. MEDICAVET BLOK NO:1 Tuzla/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

CLASSPHARMA TARIM HAYVANCILIK İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
Tepeören İTOSB Mah. 12. Cad. MEDICAVET BLOK NO:1 Tuzla/İSTANBUL

Üretim Tarihi ve Seri No:

Son Kullanma Tarihi :

KDV Dahil Perakende Satış Fiyatı: