

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Vermguard Oral Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 tablet içeriği (0,7 g):

Aktif madde:

Fenbendazol	150 mg
Pirantel pamoat	144 mg
Prazikuantel	50 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKLİ

Oral Tablet

Açık sarı renkte tabletler.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Kedi ve köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Kedi ve köpeklerde aşağıdaki yuvarlak kurt ve şerit kaynaklı paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum* ve *Taenia spp.* için ergin ve olgunlaşmamış geç evreleri; *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* ve *Trichuris vulpis* için ergin evreleri; *Toxocara cati*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.* tüm evreleri.

4.3 Kontrendikasyonları

Intraoküler sistiserkoz ve spinal nörosistiserkozis, karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Piperazin ya da diğer antiparaziter ilaçlar ile bir arada verilmemelidir. Etkin maddelere ya da herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Aynı gruptan sık ve tekrarlanan antihelmintik kullanımı sonucu, herhangi bir antihelmintik grubuna karşı parazit direnci meydana gelebilir.

Parazit mücadelesinin doğru yapılabilmesi ve hem hayvan hem de insan sağlığı yönünden risk oluşturmaması için 3 aylık aralıklarla düzenli olarak **VERMGUARD Oral Tablet** verilmesi tavsiye edilir. Ayrıca ekinokok bulaşma riski yüksekse 3 aylık aralıklar yerine 1,5-2 ayda bir ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Tedavinin başarılı sonuçlanması için hayvanların canlı ağırlığının doğru hesaplanarak doğru doz uygulaması yapılmalıdır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar: Gebe hayvanlarda dozaj doğru takip edilmelidir. Olası yan etkiler veteriner hekim ile konuşulmalıdır. Bu ürün bağırsak parazit hastalığından başka hastalıkları olan hayvanlara uygulanmamalıdır.

(ii) Ürünü uygulamaya ilişkin özel uyarılar: İlaç uygulaması esnasında bir şeyler yiyip içilmemeli ve sigara içilmemelidir. Kazara yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve bu

prospektüsü doktorunuza gösterin. Fenbendazol, pirantel pamoat, prazikuantel ya da diğer herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen insanlar, bu ürünle temastan kaçınmalıdır. Ürünün endikasyonlarında yer alan ekinokokkozis ve askariasis gibi zoonoz hastalıkların bulaşmasına karşı dikkatli olunmalı ve uygulama gerekli koruyucu önlemler (eldiven, maske vb) alınarak yapılmalıdır. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar: -

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Uygulamadan birkaç saat sonra aşırı salya salgılama, kusma, yarı sıvı dışkı, ürtiker ve/veya ateş görülebilir. Bu etken maddeye karşı değil, ölen kurtlardan salınan proteinlere karşı bir reaksiyondur. Ürün hayvanda uyuşukluğa sebep olabilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebeliğin ilk 2/3' lük döneminde kullanılmamalıdır. Bu süreden sonra, laktasyon döneminde ve damızlık hayvanlarda kullanımı, yalnızca sorumlu veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesi ile sınırlı olmalı ve gebe hayvanlarda kullanım gerektiren durumlarda dozaj dikkatle ve doğru olarak ayarlanmalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Fenbendazol, yavru atmaya sebep olabileceğinden bromsalanlarla (hilomid) birlikte kullanılmamalıdır. Pirantel ve piperazin birbirlerinin antelmintik etkilerini zayıflatabileceğinden, piperazin türevleri ile birlikte kullanmayın. Aynı sebepten dolayı organik fosfat esterleri ve dietilkarbamazin birlikte kullanılmamalıdır. Benzer etki mekanizması ve toksikolojik özellikleri nedeniyle, morantel veya morantel içeren tıbbi ürünler ile birlikte kullanılmamalıdır. Süt içeren gıdalarla birlikte verilmemelidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Tabletler oral yolla uygulanır. Önerilen doz 5 mg/kg prazikuantel, 14,4 mg/kg pirantel pamoat ve 15 mg/kg fenbendazol' dır (Her 10 kg vücut ağırlığı için 1 tablet).

Pratik Doz Tablosu:

Kediler ve küçük köpekler	2 - 5 kg vücut ağırlığı	1/2 tablet
Orta büyüklükte köpekler	5 - 10 kg vücut ağırlığı	1 tablet
Büyük köpekler	Her 10 kg vücut ağırlığı	1 tablet

Yavrularda, uygulamanın 3 haftalık yaşta başlaması ve 12 haftalık olana kadar her 3 haftada bir düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Daha sonra 3 aylık periyotlarla kullanılmalıdır. Ağırlığı 2 kg'dan az olan kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.

VERMGUARD Oral Tablet, tek başına verilebilir, ezilebilir veya yiyeceklerle karıştırılabilir. Tedavi sırasında hayvanların aç olması gerekmez. Doz bölünmeden bir defada verilmelidir. Doğru dozu sağlamak için, hayvanın canlı ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru şekilde belirlenmelidir. Doz bir veteriner hekim tarafından belirlenmelidir. Yeniden enfestasyonu önlemek için hayvanın çevresi dikkatlice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Hedef türlerdeki tolerans çalışmalarında 3 gün boyunca, önerilen dozun 5 katına kadarki uygulamada; klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu üründe, geniş terapötik indeksi nedeniyle doz aşımı yaşanması nadirdir. Doz aşımından kaynaklanan toksisite belirtileri olması durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Özellikle gebelerde olmak üzere tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

ATC Vet Kodu: QP52AC30

Grup: Anthelmintikler; benzimidazoller ve ilgili maddelerin kombinasyonu.

5.1 Farmakodinamik özellikler

Fenbendazol, benzimidazol grubu geniş spektrumlu bir antihelmintik olup, nematodlara, akciğer helmintlerine, bazı şerit ve sestod çeşitlerine karşı etkilidir. Fenbendazol, parazitler tarafından ağız yoluyla alınır. Etkisini sinir aksonlarının içindeki yapısal tubulin proteininin polimerazasyonunu bloke ederek, parazitin emilim fonksiyonuna sahip hücrelerinin taşıma özelliğini etkileyerek gösterir. Fenbendazol, duyarlı helmintlerin hem erişkin hem genç formlarına karşı etkilidir.

Pirantel pamoat, tetrahidropirimidin türevi geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*'un neden olduğu paraziter hastalıkların tedavisinde etkilidir. Ganglionlarda kolinerjik nikotinik reseptörler üstünde antagonist olarak etki eder ve parazitlerde spastik nöromusküler felce sebep olur. Pirantel pamoat bağırsaktaki duyarlı helmintlerin hem ergin hem genç formlarına karşı etki gösterir, fakat dokulardaki göç fazlarına karşı etkili değildir.

Prazikuantel, suda az çözünen sentetik bir izokinolin pirazin türevidir. Benzersiz etki spektrumunu schistosoma enfeksiyonlarının tedavisindeki etkinliği ile gösterir; ayrıca karaciğer trematodu ve şeritlere karşı etkilidir. *Fasciola hepatica* ve hidatidozise karşı etki göstermez. Prazikuantel, hücre zarının kalsiyum iyon geçirgenliğini artırır, bu da parazitin kaslarının kasılmasına sebep olur. Nöromusküler kolinesterazın depolarize olmasını inhibe ederek kas felcine sebep olur. Ayrıca, vücut yüzeyinin vakuolizasyonuna ve bozulmasına sebep olarak paraziti öldürür. Hayvanların şistosoma infestasyonları üzerinde, prazikuantel hem ergin hem de genç helmintlere karşı etkinlik gösterir.

Fenbendazol ve pirantel pamoat kombinasyonu, kuvvetli bir sinerjik etki taşır. Pirantel pamoat en fazla %75, fenbendazol %45 etkiliyken; iki maddenin kombinasyonu %90'dan fazla etkinliğe ulaşır. Üründeki üç maddenin kombinasyonu ise daha geniş spektrumdaki parazitler için mücadele imkanı sağlar.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Fenbendazol sindirim sisteminden yavaşça emilir ve uygulanan dozun büyüklüğüne bağlı olarak, maksimum kan plazma konsantrasyonlarına ulaşır: 5 mg/kg dozunda 24 saat, 100-150 mg/kg dozunda birkaç saat içinde en yüksek yoğunluğa ulaşır. Fenbendazol ve metabolitleri esas olarak dışkı yoluyla vücuttan atılır, idrarla sadece %10' u atılır.

Pirantel pamoat, sindirim sisteminden yavaşça emilir ve maksimum plazma yoğunluğa 1-3 saatte ulaşır. Uygulanan dozun neredeyse yarısı değişmeden dışkı yoluyla, %15' inden azı değişmemiş formda veya metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

Prazikuantel hızla emilir ve oral uygulamadan sonra biyoyararlanımı %80 civarındadır. Terapötik dozun uygulanmasından 1-3 saat sonra, serumda değişmemiş maksimum yoğunluğa ulaşılır. Beyin-omurilik sıvısındaki prazikuantel konsantrasyonu, kan plazmasındaki değerlerin %14-20'sini oluşturur. Safradaki etken madde konsantrasyonu, venöz kandaki konsantrasyondan neredeyse üç kat daha yüksektir. İlacın çoğu karaciğerin ilk geçişinde hızlı bir şekilde inaktif mono ve polihidroksi ürünlerine metabolize olur. Prazikuantelin plazma yarı ömrü 1-1.5 saatken, ana metabolitlerin yarı ömrü 4-6 saattir. Atılım, ağırlıklı olarak böbreklerde metabolitler şeklinde meydana gelir. 24 saat içinde, uygulanan dozun %70' i, 4 gün içinde de %80' i atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

CMC Kalsiyum
Magnezyum Stearat
PVP K 30
Mısır Nişastası

6.2 Geçimsizlikler

Ürünün bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3 Raf ömrü

Veteriner tıbbi ürünün satışa hazır haldeki raf ömrü: 2 yıl.

İç ambalajın ilk açıldıktan sonraki raf ömrü: 9 hafta

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajında 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan alevden ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Bölünmüş tabletler yeniden orijinal ambalajına koyulmalıdır. Bölünmüş tabletlerin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 9 haftadır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

1 ve 5'li alüminyum ambalajlar 50 adetlik karton kutular içerisinde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Herhangi bir kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu ürünlerin atık materyalleri, yerel yasalara uygun şekilde imha edilmelidir. Kullanım dışı her türlü artık/atık ürün atık su ve drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Malıköy Başkent OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 69
Sincan / ANKARA

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

029/0092

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

05.05.2021

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

28.03.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VERMGUARD

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli, yuvarlak, 2 çentikli 1 tablet; 150 mg fenbendazol, 144 mg pirantel pamoat, 50 mg prazikuantel içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik özellikler

Fenbendazol, benzimidazol grubu geniş spektrumlu bir antihelmintik olup, nematodlara, akciğer helmintlerine, bazı şerit ve sestoð çeşitlerine karşı etkilidir. Fenbendazol, parazitler tarafından ağız yoluyla alınır. Etkisini sinir aksonlarının içindeki yapısal tubulin proteininin polimerazasyonunu bloke ederek, parazitin emilim fonksiyonuna sahip hücrelerinin taşıma özelliğini etkileyerek gösterir. Fenbendazol, duyarlı helmintlerin hem erişkin hem genç formlarına karşı etkilidir.

Pirantel pamoat, tetrahidopirimidin türevi geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*'un neden olduğu parazitler hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Ganglionlarda kolinerjik nikotinik reseptörler üstünde antagonist olarak etki eder ve parazitlerde spastik nöromüsküler felce sebep olur. Pirantel pamoat bağırsaktaki duyarlı helmintlerin hem ergin hem genç formlarına karşı etki gösterir, fakat dokulardaki göç fazlarına karşı etkili değildir.

Prazikuantel, suda az çözünen sentetik bir izokinolin pirazin türevidir. Benzersiz etki spektrumunu schistosoma enfeksiyonlarının tedavisindeki etkinliği ile gösterir; ayrıca karaciğer trematodu ve şeritlere karşı etkilidir. Fasciola hepatica ve hidatidozise karşı etki göstermez. Prazikuantel, hücre zarının kalsiyum iyon geçirgenliğini artırır, bu da parazitin kaslarının kasılmasına sebep olur. Nöromüsküler kolinesterazın depolarize olmasını inhibe ederek kas felcine sebep olur. Ayrıca, vücut yüzeyinin vakuolizasyonuna ve bozulmasına sebep olarak paraziti öldürür. Hayvanların şistosoma infestasyonları üzerinde, prazikuantel hem ergin hem de genç helmintlere karşı etkinlik gösterir.

Fenbendazol ve pirantel pamoat kombinasyonu, kuvvetli bir sinerjik etki taşır. Pirantel pamoat en fazla %75, fenbendazol %45 etkiliyken; iki maddenin kombinasyonu %90'dan fazla etkinliğe ulaşır. Üründeki üç maddenin kombinasyonu ise daha geniş spektrumdaki parazitler için mücadele imkanı sağlar.

Farmakokinetik özellikler

Fenbendazol sindirim sisteminden yavaşça emilir ve uygulanan dozun büyüklüğüne bağlı olarak, maksimum kan plazma konsantrasyonlarına ulaşır: 5 mg/kg dozunda 24 saat, 100-150 mg/kg dozunda birkaç saat içinde en yüksek yoğunluğa ulaşır. Fenbendazol ve metabolitleri esas olarak dışkı yoluyla vücuttan atılır, idrarla sadece %10' u atılır.

Pirantel pamoat, sindirim sisteminden yavaşça emilir ve maksimum plazma yoğunluğa 1-3 saatte ulaşır. Uygulanan dozun neredeyse yarısı değişmeden dışkı yoluyla, %15' inden azı değişmemiş formda veya metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

Prazikuantel hızla emilir ve oral uygulamadan sonra biyoyararlanımı %80 civarındadır. Terapötik dozun uygulanmasından 1-3 saat sonra, serumda değişmemiş maksimum yoğunluğa ulaşılır. Beyin-omurilik sıvısındaki prazikuantel konsantrasyonu, kan plazmasındaki değerlerin %14-20'sini oluşturur. Safradaki etken madde konsantrasyonu, venöz kandaki konsantrasyondan neredeyse üç kat daha yüksektir. İlacın çoğu karaciğerin ilk geçişinde hızlı bir şekilde inaktif mono ve polihidroksi ürünlerine metabolize olur. Prazikuantelin plazma yarı ömrü 1-1.5 saatken, ana metabolitlerin yarı ömrü 4-6 saattir. Atılım, ağırlıklı olarak böbreklerde metabolitler şeklinde meydana gelir. 24 saat içinde, uygulanan dozun %70' i, 4 gün içinde de %80' i atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Kedi ve köpeklerde aşağıdaki yuvarlak kurt ve şerit kaynaklı paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum* ve *Taenia spp.* için ergin ve olgunlaşmamış geç evreleri; *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* ve *Trichuris vulpis* için ergin evreleri; *Toxocara cati*, *Multiceps multiceps*, *Mesocostoides spp.* tüm evreleri.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tabletler oral yolla uygulanır. Önerilen doz 5 mg/kg prazikuantel, 14,4 mg/kg pirantel pamoat ve 15 mg/kg fenbendazol' dür (Her 10 kg vücut ağırlığı için 1 tablet).

Pratik Doz Tablosu:

Kediler ve küçük köpekler	2 - 5 kg vücut ağırlığı	1/2 tablet
Orta büyüklükte köpekler	5 - 10 kg vücut ağırlığı	1 tablet
Büyük köpekler	Her 10 kg vücut ağırlığı	1 tablet

Yavrularda, uygulamanın 3 haftalık yaşta başlaması ve 12 haftalık olana kadar her 3 haftada bir düzenli olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Daha sonra 3 aylık periyotlarla kullanılmalıdır. Ağırlığı 2 kg'dan az olan kedi ve köpeklerde kullanılmamalıdır.

VERMGUARD Oral Tablet, tek başına verilebilir, ezilebilir veya yiyeceklerle karıştırılabilir. Tedavi sırasında hayvanların aç olması gerekmez. Doz bölünmeden bir defada verilmelidir. Doğru dozu sağlamak için, hayvanın canlı ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru şekilde belirlenmelidir. Doz bir veteriner hekim tarafından belirlenmelidir. Yeniden enfestasyonu önlemek için hayvanın çevresi dikkatlice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aynı gruptan sık ve tekrarlanan antihelmintik kullanımı sonucu, herhangi bir antihelmintik grubuna karşı parazit direnci meydana gelebilir.

Parazit mücadelesinin doğru yapılabilmesi ve hem hayvan hem de insan sağlığı yönünden risk oluşturmaması için 3 aylık aralıklarla düzenli olarak **VERMGUARD Oral Tablet** verilmesi tavsiye edilir. Ayrıca ekinokok bulaşma riski yüksekse 3 aylık aralıklar yerine 1,5-2 ayda bir ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Tedavinin başarılı sonuçlanması için hayvanların canlı ağırlığının doğru hesaplanarak doğru doz uygulaması yapılmalıdır.

Gebe hayvanlarda dozaj doğru takip edilmelidir. Olası yan etkiler veteriner hekim ile konuşulmalıdır. Bu ürün bağırsak parazit hastalığından başka hastalıkları olan hayvanlara uygulanmamalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Gebeliğin ilk 2/3' lük döneminde kullanılmamalıdır. Bu süreden sonra, laktasyon döneminde ve damızlık hayvanlarda kullanımı, yalnızca sorumlu veteriner hekimin fayda/risk değerlendirmesi ile sınırlı olmalı ve gebe hayvanlarda kullanım gerektiren durumlarda dozaj dikkatle ve doğru olarak ayarlanmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uygulamadan birkaç saat sonra aşırı salya salgılama, kusma, yarı sıvı dışkı, ürtiker ve/veya ateş görülebilir. Bu etken maddeye karşı değil, ölen kurtlardan salınan proteinlere karşı bir reaksiyondur. Ürün hayvanda uyusukluğa sebep olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenbendazol, yavru atmaya sebep olabileceğinden bromsalanlarla (hilomid) birlikte kullanılmamalıdır. Pirantel ve piperazin birbirlerinin antelmintik etkilerini zayıflatabileceğinden, piperazin türevleri ile birlikte kullanmayın. Aynı sebepten dolayı organik fosfat esterleri ve dietilkarbamazin birlikte kullanılmamalıdır. Benzer etki mekanizması ve toksikolojik özellikleri nedeniyle, morantel veya morantel içeren tıbbi ürünler ile birlikte kullanılmamalıdır. Süt içeren gıdalarla birlikte verilmemelidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Hedef türlerdeki tolerans çalışmalarında 3 gün boyunca, önerilen dozun 5 katına kadarki uygulamada; klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu üründe, geniş terapötik indeksi nedeniyle doz aşımı yaşanması nadirdir. Doz aşımından kaynaklanan toksisite belirtileri olması durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Özellikle gebelerde olmak üzere tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Intraoküler sistiserkoz ve spinal nörosistiserkozis, karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Piperazin ya da diğer antiparaziter ilaçlar ile bir arada verilmemelidir. Etkin maddelere ya da herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıdalardan uzakta saklayınız. Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlaç uygulaması esnasında bir şeyler yiyip içilmemeli ve sigara içilmemelidir. Kazara yutulması halinde derhal tıbbi yardım alın ve bu prospektüsü doktorunuza gösterin. Fenbendazol, pirantel pamoat, prazikuantel ya da diğer herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı hassasiyeti olduğu bilinen insanlar, bu ürünle temastan kaçınmalıdır. Ürünün endikasyonlarında yer alan ekinokokkozis ve askariasis gibi zoonoz hastalıkların bulaşmasına karşı dikkatli olunmalı ve uygulama gerekli koruyucu önlemler (eldiven, maske vb) alınarak yapılmalıdır. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan alevden ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Bölünmüş tabletler yeniden orijinal ambalajına koyulmalıdır. Bölünmüş tabletlerin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 9 haftadır. Ürünün raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Herhangi bir kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu ürünlerin atık materyalleri, yerel yasalara uygun şekilde imha edilmelidir. Kullanım dışı her türlü artık/atık ürün atık su ve drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 ve 5'li alüminyum ambalajlar 50 adetlik karton kutular içerisinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenahaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ

28.03.2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:05.05.2021-029/0092

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Malıköy Başkent OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 69
Sincan / ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

Albafarma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) No: 11
Tuzla / İSTANBUL

İç Ambalaj Etiketi (BLİSTER)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VERMGUARD

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ:

Her bir tablet; 150 mg fenbendazol, 144 mg pirantel pamoat, 50 mg prazikuantel içerir.

SERİ NO

SON KULLANMA TARİHİ

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VERMGUARD

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli, yuvarlak, 2 çentikli 1 tablet; 150 mg fenbendazol, 144 mg pirantel pamoat, 50 mg prazikuantel içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Kedi ve köpeklerde aşağıdaki yuvarlak kurt ve şerit kaynaklı paraziter hastalıkların tedavisinde kullanılır: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum* ve *Taenia spp.* için ergin ve olgunlaşmamış geç evreleri; *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* ve *Trichuris vulpis* için ergin evreleri; *Toxocara cati*, *Multiceps multiceps*, *Mesocostoides spp.* tüm evreleri.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tabletler oral yolla uygulanır. Önerilen doz 5 mg/kg prazikuantel, 14,4 mg/kg pirantel pamoat ve 15 mg/kg fenbendazol' dür (Her 10 kg vücut ağırlığı için 1 tablet).

Pratik Doz Tablosu:

Kediler ve küçük köpekler	2 - 5 kg vücut ağırlığı	1/2 tablet
Orta büyüklükte köpekler	5 - 10 kg vücut ağırlığı	1 tablet
Büyük köpekler	Her 10 kg vücut ağırlığı	1 tablet

Doğru kullanım önerileri için prospektüsü okuyunuz.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıdalardan uzakta saklayınız. Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında 25 °C'nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan alevden ve güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Bölünmüş tabletler yeniden orijinal ambalajına koyulmalıdır. Bölünmüş tabletlerin aynı muhafaza şartlarında raf ömrü 9 haftadır. Ürünün raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 ve 5'li alüminyum ambalajlar 50 adetlik karton kutular içerisinde satışa sunulmuştur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Herhangi bir kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu ürünlerin atık materyalleri, yerel yasalara uygun şekilde imha edilmelidir. Kullanım dışı her türlü artık/atık ürün atık su ve drenaj sistemlerine atılmamalıdır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; eczane; veteriner muayenehaneleri ve poliklinikleri ile hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO

05.05.2021 - 029/0092

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Malıköy Başkent OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 69
Sincan / ANKARA

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

Albafarma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) No: 11
Tuzla / İSTANBUL

SERİ NO**ÜRETİM TARİHİ****SON KULLANMA TARİHİ****PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL)**