



## 1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Hektavit-C Enjeksiyonluk Çözelti

## 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml'de:

Aktif maddeler:

Vitamin C (askorbik asit) 200 mg

Yardımcı maddeler:

Metil paraben 0,80 mg

Propil paraben 0,20 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

## 3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Çözelti

## 4. KLİNİK ÖZELLİKLER

### 4.1 Hedef tür

Gıda değeri olan hayvanlar: Sığır, Koyun, Keçi

Gıda değeri olmayan hayvanlar: At, Kedi, Köpek

### 4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

### 4.3 Kontrendikasyonlar

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

### 4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalit kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

### 4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar: Bulunmamaktadır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar: Tüm uygulamalarda asepti-antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

### 4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi yoktur.

### 4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Gebelikte kullanılabilir.

#### 4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Askorbik asit ağır metal tuzlarını (bakır tuzları, demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar) içeren ilaçlarla geçimsiz olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Günlük 10 mg üzerinde alınan askorbik asit kumarin ve inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini azaltmaktadır. Askorbik asit idrarda asitleşmeye neden olabileceğinden üro-genital sistemde aminoglikozidler ve makrolitler gibi antibakteriyel ilaçların etkinliğini azaltabilir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

#### 4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

| Hedef tür | Farmakolojik doz | Pratik doz       | Uygulama şekli                | Açıklama                          |
|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sığır     | 4-6 mg/kg        | 7 - 12 ml /gün   | Kas içi, deri altı, damar içi | Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle |
| Dana      | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı, damar içi | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |
| Koyun     | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı            | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |
| Keçi      | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı            | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |
| At        | 5-10 mg/kg       | 10 -20 ml /gün   | Kas içi, damar içi            | İstenen etki sağlanana kadar      |
| Kedi      | 25-75 mg/kg      | 0,3 - 0,6 ml/gün | Kas içi, damar içi            | İstenen etki sağlanana kadar      |
| Köpek     | 25-500 mg/kg     | 0,3 – 2,5 ml/gün | Kas içi, damar içi            | İstenen etki sağlanana kadar      |

#### 4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Bununla birlikte yüksek dozlarda ve sık uygulanan askorbik asit hayvanlarda kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalat kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

#### 4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

**İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i.k.a.s): Et ve süt için sıfır “0” gündür.**

### 5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

#### 5.1 Farmakodinamik özellikler

Askorbik asit (C vitamini) insan ve hayvanlarda, çoğunlukla oksidasyon içeren biyokimyasal reaksiyonlar pek çok fizyolojik fonksiyonları için gereklidir. Muhtemelen hidroksiprolin için prolin dönüşüm de dahil olmak üzere, kollajen oluşumunda yer almaktadır. İnsan, primatlar ve kobaylar hariç tüm memeliler endojen L-askorbik asit sentezleyebilmektedirler. İnsanlar muhtemeldir ki karaciğerde L-askorbik asitin in vivo sentezi gerekli içinde son adım eksikliği nedeniyle (L-askorbik asit, L-gulonolactone dönüştürmek için gerekli enzimler) sentezlenememektedir. Vitamin C'nin sulu çözeltilerinin pH'sı asidiktir (pH 3 dolayında) ve asit şartlarda daha dayanıklıdır. Alkali şartlarda havaya maruz kalınca ve ortamda bakır bulunduğunda hızla parçalanır. Çözeltileri fosfatla pH 6-6,5 arasına tamponlanabilir. İçine % 0,005 yoğunlukta tiyoüre katılarak dayanıklılığı artırılabilir. Vitamin C toz veya sulu çözelti halinde havayla temasa gelince hızla yükseltgenir; ama, kuru toz halinde hava veya oksijenin

etkisinden korunabilirse, uzun süre dayanabilir. Kuru ot, tahıllar ve yemlerde bulunmamasının asıl sebebi yükseltgenmeye karşı bu denli dayanıksızlığıdır. Vitamin C ağırlık esasına göre değerlendirilir ve 0,05 mg'ı 1 IU'e denktir; yani 1 mg'ı 20 IU'dur.

## 5.2 Farmakokinetik özellikler

Vitamin C (askorbik asit) turunçgiller, domates, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve sütte önemli miktarda bulunur; yalnız, sütün pastörizasyonu sırasında büyük ölçüde parçalanır. Portakal ve limon öz suyunun ml'sinde yaklaşık 0,5 gr vitamin C bulunur; bu sebeple, anılan özsular sağaltım amacıyla kullanılabilir. Tahıl ve kuru otlarda vitamin C bulunmaz. Hayvanların (insan dahil, kobay, maymun, yarası hariç) günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde sindirim kanalında vitamin C sentezlenir. Bu madde sentetik olarak da hazırlanmıştır. Vitamin C glukoz ve heksozlara çok benzeyen 6 karbonlu bir maddedir. Vücutta dönüşümlü olarak dehidro-askorbik asite yükseltgenir; anılan madde vitamin C'nin tüm etkinliğini gösterir. Aslında vitaminin fizyolojik görevleri bu yükseltgenme-indirgenme sistemiyle ilgilidir. Vitamin C indirgenmiş halde yemlerde yaygın şekilde bulunur. Diğer bir yükseltgenme ürünü de diketo-uronik asittir; bu maddenin oluşumuna götüren tepkime dönüşümsüzdür; hızla oluşur ve şekillenen madde etkisizdir. Bu durum özellikle ısıtma-piştirme işlemleri sırasında görülür. Vitamin C optikçe etkindir; L-izomerin etkinliği daha fazladır; ama, iki izomerinin de yükseltgenme- indirgenme özelliği vardır. Bu sebeple, ikisi de et konservelerinde nitritlerden nitrozamin şekillenmesini önlemek için kullanılır. Vitamin C'nin D-izomerinin (eritorbik asit, D-arabo askorbik asit) skorbütü önleyici etkisinin zayıf olmasının sebebi muhtemelen dokuların askorbik asiti depoladığı ölçüde bunu depolayamamasıdır. İnsanlarda kan plazmasındaki askorbik asit miktarı %1 mg kadardır; fazla miktarda askorbik asit alınmasından sonra %1,5 mg olan böbrek eşiğini aşabilir. Ağız yoluyla 9 gram askorbik asit alınmasından sonra idrarla atılan oksalik asit iki katına çıkar; askorbik asit insanda oksalata çevrilebilir ve idrarla atılan oksalatın kalsiyum tuzu böbrek taşları oluşturabilir. Askorbik asit, bazı oksidoredüksiyon olaylarında kosubstrat olarak görev alır; tirozin metabolizmasında dopaminden noradrenalin sentezi, tirozin metabolizmasında p-hidroksi fenil pirüvatın homogentizata oksidasyonu ve homogentizatin maleoylasetoasetata oksidasyonu, karnitin biyosentezi, kolesterolden primer safra asitlerinin sentezi, kollajen sentezinde prolinin hidroksilasyonu, folik asidin H4-folata enzimatik indirgenmesi olaylarında etkilidir.

## 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

### 6.1 Yardımcı maddeler

Metil paraben  
Propil paraben  
Sodyum hidroksit  
Enjeksiyonluk su

### 6.2 Geçimsizlikler

Askorbik asit ağır metal tuzlarını (bakır tuzları, demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar) içeren ilaçlarla geçimsiz olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Günlük 10 mg üzerinde alınan askorbik asit kumarin ve inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini azaltmaktadır. Askorbik asit idrarda asitleşmeye neden olabileceğinden üro-genital sistemde aminoglikozidler ve makrolitler gibi antibakteriyel ilaçların etkinliğini azaltabilir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

### 6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 24 saat

İlaçlı içme suyunun raf ömrü: -

İlaçlı süt ikame gıdası raf ömrü: -

### 6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajında ışıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (25 °C'nin altında) muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır ve buzdolabına konulmamalıdır.

### 6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

### 6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

## 7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mahk y Bařkent OSB Mahallesi Atat rk Bulvarı No: 69

Sincan / ANKARA

## 8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

027/0092

## 9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

07.03.2018

## 10. METİN DEĞİŐİKLİK TARİHİ

08.04.2025

## (Prospektüs)

### Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır HEKTAVİT-C

Enjeksiyonluk Çözelti  
Veteriner Vitamin

#### BİLEŞİMİ

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril çözelti olup her ml'sinde 200 mg askorbik asit ile koruyucu olarak metil paraben ve propil paraben içerir.

#### FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

HEKTAVİT-C Askorbik asit bir monosakkarit türevi olup yapıca glikoza ve diğer altı karbonlu monosakkaritlere benzer. Çok hafif kendine has kokulu, ekşi tatlı ve asit reaksiyondadır. C vitamini (askorbik asit) omurilik, akciğer ve göz gibi pek çok hayvansal dokunun sulu bölümlerinde oldukça yüksek yoğunlukta bulunur. Biyolojik sistemlerde askorbik asidin rolü, C vitamininin in vivo fonksiyon ve gerekleri iki faktörle birlikte ele alınmalıdır: Birincisi, C vitamininin hem antioksidan hem de bir enzim kofaktörü olarak hareket etme yeteneği dahil biyokimyasal özellikleridir. İkincisi, bağırsakta emilmeyi, serum konsantrasyonunu, hücrel dağılımını, kullanımını ve dışarı atılımını içeren farmakokinetiğidir. Askorbik asit vücutta birçok yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde hidrojen taşıyıcısı olarak rol alır. Hayvanlarda doğrudan karıştığı tepkimelerin önemli bir kısmı mezenşimal kökenli dokuların yapımı ve bütünlüğünün korunmasıyla ilgilidir. Böylelikle kemiklerin ve dişlerin matriksi ile kapiller endotel hücreleri arasında bağlayıcı dokuların oluşumuna katılan kollagen, proteoglikan ve diğer organik maddelerin sentezi gerçekleşir. Bu etkinliği ile askorbik asit skorbüt hastalığının tedavisinde ve koruyucu olarak kullanılır. Aynı zamanda stres etkilerine karşı direnci artırır, bağışıklık sistemini destekler, üreme performansını güçlendirir. A ve E vitaminlerinin in vivo etkilerini destekler, sinerjik etkileşime girer. Evcil hayvanlara parenteral olarak verilen askorbik asit, vücuda alındıktan birkaç saat sonra ince bağırsaktan emilerek kana geçer. Bu esnada kandaki düzeyi kısa süre için yükselir. Kan dolaşımı ile dokulara taşınır ve fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Gereğinden fazla alınan askorbik asidin bir bölümü de monosakkaritlerde olduğu gibi karbondioksit ve suya okside olur.

#### KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

#### KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

| Hedef tür | Farmakolojik doz | Pratik doz    | Uygulama şekli                | Açıklama                          |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sığır     | 4-6 mg/kg        | 7 - 12 ml/gün | Kas içi, deri altı, damar içi | Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle |
| Dana      | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün  | Kas içi, deri altı, damar içi | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |

|       |              |                  |                    |                                 |
|-------|--------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Koyun | 4-6 mg/kg    | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı | Haftada iki kez 3 hafta süreyle |
| Keçi  | 4-6 mg/kg    | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı | Haftada iki kez 3 hafta süreyle |
| At    | 5-10 mg/kg   | 10 -20 ml /gün   | Kas içi, damar içi | İstenen etki sağlanana kadar    |
| Kedi  | 25-75 mg/kg  | 0,3 - 0,6 ml/gün | Kas içi, damar içi | İstenen etki sağlanana kadar    |
| Köpek | 25-500 mg/kg | 0,3 – 2,5 ml/gün | Kas içi, damar içi | İstenen etki sağlanana kadar    |

### ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalit kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

### İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi yoktur.

### İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Askorbik asit ağır metal tuzlarını (bakır tuzları, demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar) içeren ilaçlarla geçimsiz olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Günlük 10 mg üzerinde alınan askorbik asit kumarin ve inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini azaltmaktadır. Askorbik asit idrarda asitleşmeye neden olabileceğinden üro-genital sistemde aminoglikozidler ve makrolitler gibi antibakteriyel ilaçların etkinliğini azaltabilir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

### DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Bununla birlikte yüksek dozlarda ve sık uygulanan askorbik asit hayvanlarda kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalit kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

### GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için sıfır “0” gündür.

### KONTRENDİKASYONLAR

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

**Gebelikte kullanım:** Gebelikte kullanılabilir.

### GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

### KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

### MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında ışıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (25 °C'nin altında) muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır ve buzdolabına konulmamalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açıldıktan sonra raf ömrü 24 saattir.

### TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehane, poliklinik ve eczanelerde satılmaktadır (VHR).

**PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ**

08.04.2025

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO:**

07.03.2018 - 027/0092

**PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Malıköy Başkent OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 69  
Sincan / ANKARA

**ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ**

Arion İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 8  
Tuzla / İSTANBUL

(Dış etiket 50 ml - 100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır  
**HEKTAVİT-C**  
Enjeksiyonluk Çözelti  
Veteriner Vitamin

**BİLEŞİMİ**

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril çözelti olup her ml'sinde 200 mg askorbik asit ile koruyucu olarak metil paraben ve propil paraben içerir.

**KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR**

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcak, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde HEKTAVİT-C enjeksiyonluk çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

| Hedef tür | Farmakolojik doz | Pratik doz       | Uygulama şekli                | Açıklama                          |
|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sığır     | 4-6 mg/kg        | 7 - 12 ml /gün   | Kas içi, deri altı, damar içi | Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle |
| Dana      | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı, damar içi | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |
| Koyun     | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı            | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |
| Keçi      | 4-6 mg/kg        | 2 - 4 ml/gün     | Kas içi, deri altı            | Haftada iki kez 3 hafta süreyle   |
| At        | 5-10 mg/kg       | 10 -20 ml /gün   | Kas içi, damar içi            | İstenen etki sağlanana kadar      |
| Kedi      | 25-75 mg/kg      | 0,3 - 0,6 ml/gün | Kas içi, damar içi            | İstenen etki sağlanana kadar      |
| Köpek     | 25-500 mg/kg     | 0,3 – 2,5 ml/gün | Kas içi, damar içi            | İstenen etki sağlanana kadar      |

**GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI**

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için sıfır "0" gündür.

**GENEL UYARILAR**

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Orijinal ambalajında ışıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (25 °C'nin altında) muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır ve buzdolabına konulmamalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açıldıktan sonra raf ömrü 24 saattir.



**TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

**SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI**

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehane, poliklinik ve eczanelerde satılmaktadır (VHR).

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO:**  
07.03.2018 - 027/0092

**PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Malıköy Başkent OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 69  
Sincan / ANKARA

**ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ**

Arion İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 8  
Tuzla / İSTANBUL

Seri no :  
Üretim tarihi :  
Son kullanma tarihi :  
Perakende satış fiyatı (KDV dahil) :

(İç etiket 50 ml, 100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır  
**HEKTAVİT-C**  
Enjeksiyonluk Çözelti  
Veteriner Vitamin

### **BİLEŞİMİ**

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril çözelti olup her ml'sinde 200 mg askorbik asit ile koruyucu olarak metil paraben ve propil paraben içerir.

### **KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR**

HEKTAVİT-C Enjeksiyonluk çözelti, sığır, koyun, keçi, at, köpek ve kedilerde askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır.

### **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde HEKTAVİT-C enjeksiyonluk çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır. Farmakolojik dozu sığır, koyun ve keçide 4-6 mg/kg; atta 5-10 mg/kg; kedide 25-75 mg/kg; köpekte 25-500 mg/kg'dır.

### **GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI**

**İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için sıfır "0" gündür.**

### **GENEL UYARILAR**

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

### **MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Orijinal ambalajında ışıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (25 °C'nin altında) muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır ve buzdolabına konulmamalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açıldıktan sonra raf ömrü 24 saattir.

### **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ**

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli Tip II cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehane, poliklinik ve eczanelerde satılmaktadır (VHR).

**GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO**  
07.03.2018 - 027/0092

### **PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

Arma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Malıköy Başkent OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 69  
Sincan / ANKARA

**ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ**

Arion İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 8  
Tuzla / İSTANBUL

**Seri no** :

**Üretim tarihi** :

**Son kullanma tarihi** :