

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml:

Aktif madde:

Rikobendazol.....100 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Çözelti,

Sarı renkli, steril çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, koyun

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda etki spektrumuna giren mide-bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfeksiyonları (Anaplocephaliasis) ve kronik kelebek enfestasyonunun (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir. Rizal Enjeksiyonluk Çözelti'nin etki spektrumuna aşağıdaki parazitler girmektedir.

Mide-Bağırsak Kıl Kurtları (Gastrointestinal nematodlar, genç ve erginler); Ostertagia sp. (benzimidazole rezistant inhibe larvalar L4 dahil), Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Capillaria sp., Chabertia sp., Nematodirus sp., Bunostomum phlebotomum., Strongyloides papillosus., Oesophagostomum radiatum

Akciğer Kıl Kurtları (Akciğer nematodları, genç, L4 ve erginler); Dictyocaulus viviparus, D. filaria

Karaciğer Kelebeği; Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin evreler)

Şeritler: Moniezia sp.

Cysticercus Bovis (Son konakçısı insan olan T.saginata'nın sığırlardaki ara formu): Sığırlara kesimden 30 ve 60 gün önce uygulandığında Cysticercus bovis'i öldürür ve enfestasyonları önler.

4.3 Kontrendikasyonlar

Rikobendazol'e aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

- Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılması, ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
- İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.
-

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Dozu belirlerken hayvanın vücut ağırlığının dikkatli değerlendirilmesi gerekir.

Kaşıktık ve ağır stres altındaki hayvanlarda yapılan uygulamalar dikkatle izlenmelidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Cilde doğrudan temas minimum düzeyde tutulmalıdır.

Geçirgen olmayan kauçuk eldivenler dahil olmak üzere koruyucu giysi giyilmelidir.

Kullandıktan sonra eller yıkanmalıdır.

Evcil hayvanlarda benzimidazollere karşı çok sık direnç gelişebileceğinden, sık tekrarlanan ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalı ve doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Sığır ve koyunlarda önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Benzimidazol grubu antihelmintikler teratojenite ve embriyotoksik etkileri nedeniyle gebeliğin ilk 1/3'lük döneminde ve koç katımı sırasında kullanılmamalıdır

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

İlacın prazikuantel, deksametazon ile birlikte kullanılması yasaktır, çünkü bu, hayvanın kanındaki ricobendazol konsantrasyonunun artmasına neden olacaktır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

"Veteriner Hekim Tarafından Başka Şekilde Önerilmediği Takdirde"

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda deri altı yolla uygulanır.

Rikobendazol'un sığır ve koyunlarda Farmakolojik Dozu;

Mide-Bağırsak ve Akciğer Kıl Kurtları için: 3,75 mg/kg vücut ağırlığı (1,5 ml/40 kg c.a.)

Şeritler için: 5 mg/kg vücut ağırlığı (2 ml/40 kg c.a.)

Karaciğer Kelebekleri ve Ostertagia ostertagi'nin inhibe larvaları için: 7,5 mg/kg vücut ağırlığı (3 ml/40 kg c.a.) oranındadır.

Pratik Doz Tablosu:

Hayvan Türü	Vücut Ağırlık (kg)	Mide-Bağırsak Kıl Kurtları (3,75 mg/kg c.a.)	Şeritler (5 mg/kg c.a.)	Karaciğer Kelebekleri-Ostertagi İnhibe Larvaları (7,5 mg/kg c.a.)
Koyun	20 kg	0,75 ml	1 ml	1,5 ml
	40 kg	1,5 ml	2 ml	3 ml
	60 kg	2,25 ml	3 ml	4,5 ml
Sığır	80 kg	3 ml	4 ml	6 ml
	160 kg	6 ml	8 ml	12 ml
	240 kg	9 ml	12 ml	18 ml
	320 kg	12 ml	16 ml	24 ml
	480 kg	18 ml	24 ml	36 ml

10 ml'yi aşan yüksek hacimli uygulama gerektiren hayvanlarda dozun bölünerek uygulanması önerilir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Zehirlenme halinde klinik belirtilere göre semptomatik olarak müdahale edilmelidir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 saım) süreyle elde edilen sığır ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Anthelmintikler, Benzimidazoller ve ilgili maddeler;

ATCvet kodu: QP52AC

5.1 Farmakodinamik özellikler

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti bileşimindeki Rikobendazol benzimidazol karbamat türevi geniş spektrumlu bir anthelmintiktir. Rikobendazol aktivite spektrumuna giren parazitlerin mikrotübulinlerinin polimerizasyonunu inhibe etmek sureti ile enerji metabolizmasını bozar ve parazitin açıklıktan ölümüne neden olur. Parazit mikrotübulinlerinin olmamasından dolayı bağırsak hücrelerinde gıda absorpsiyonu yapamaz. Glikojenin azalması sonucu uygulamadan 24 saat sonra açıklıktan ölür.

Rikobendazol ergin parazitlere etkili olan dozundan daha düşük dozlarda endike olduğu parazitlerin yumurtalarına da etkilidir. Rizal Enjeksiyonluk Çözelti dişi parazitlerin anaerobik enerji metabolizmasını bozmak sureti ile yumurtalara da ovisidal etki gösterir. Rikobendazol'ün büyük çoğunluğu dışkı ile atılır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Rizal uygulamadan 9 gün sonra idrarda rikobendazol metabolitlerinin %47 oranında tespit edildiği bildirilmiştir. Rikobendazol'ün sistemik biyoyararlanımı koyunlarda SC uygulamada (%96), intraruminal (İR) uygulamadakinin (%27) daha yüksektir. SC uygulama sonucu elde edilen C_{max} ($2,09 \pm 0,24 \mu\text{g/ml}$), İR uygulamadan elde edilenden ($0,44 \pm 0,10 \mu\text{g/ml}$) daha yüksek ve T_{max} zamanı da yine SC uygulamada ($3,81 \pm 0,45 \text{ h}$), İR uygulamaya göre ($7,31 \pm 0,65 \text{ h}$) daha kısadır. Rikobendazol'ün sığırlarda SC uygulama sonucu elde edilen C_{max} ($1,9 \pm 0,41 \mu\text{g/ml}$), İR uygulamadan elde edilenden ($1,7 \pm 0,54 \mu\text{g/ml}$) daha yüksek ve T_{max} zamanı da yine SC uygulamada ($9,3 \pm 2,12 \text{ h}$), İR uygulamaya göre ($11,6 \pm 1,05 \text{ h}$) daha kısadır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Etil Alkol

Propilen Glikol

Hidroklorik Asit

6.2 Geçimsizlikler

Diğer tıbbi ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına ve derin dondurucuya konulmadan muhafaza edilmelidir. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

Ürün tapası en fazla 30 kez delinebilir.

6.5 Birincil ambalajın niteliđi ve kompozisyonu

Karton kutu ierisinde 50 ve 100 ml’lik flip-off kapaklı amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Verano İla San. ve Tic. A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Tekfen No: 209 İç Kapı No: 6 34394 Şişli/İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

18-002

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

05.04.2007

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

24.10.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

RİZAL

Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sarı renkli steril pirojensiz bir çözelti olup beher ml'sinde 100 mg Rikobendazol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti bileşimindeki Rikobendazol benzimidazol karbamat türevi geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Rikobendazol aktivite spektrumuna giren parazitlerin mikrotübulinlerinin polimerizasyonunu inhibe etmek sureti ile enerji metabolizmasını bozar ve parazitin ağızdan ölümüne neden olur. Parazit mikrotübulinlerinin olmamasından dolayı bağırsak hücrelerinde gıda absorpsiyonu yapamaz. Glikojenin azalması sonucu uygulamadan 24 saat sonra ağızdan ölür.

Rikobendazol ergin parazitlere etkili olan dozundan daha düşük dozlarda endike olduğu parazitlerin yumurtalarına da etkilidir. Rizal Enjeksiyonluk Çözelti dışı parazitlerin anaerobik enerji metabolizmasını bozmak sureti ile yumurtalara da ovisidal etki gösterir. Rikobendazol'un büyük çoğunluğu dışkı ile atılır.

Farmakokinetik özellikler

Rizal uygulamadan 9 gün sonra idrarda rikobendazol metabolitlerinin %47 oranında tespit edildiği bildirilmiştir. Rikobendazol'un sistemik biyoyararlanımı koyunlarda SC uygulamada (%96), intraruminal (İR) uygulamadakinden (%27) daha yüksektir. SC uygulama sonucu elde edilen C_{max} ($2,09 \pm 0,24 \mu\text{g/ml}$), İR uygulamadan elde edilenden ($0,44 \pm 0,10 \mu\text{g/ml}$) daha yüksek ve T_{max} zamanı da yine SC uygulamada ($3,81 \pm 0,45 \text{ h}$), İR uygulamaya göre ($7,31 \pm 0,65 \text{ h}$) daha kısadır. Rikobendazol'un sığırlarda SC uygulama sonucu elde edilen C_{max} ($1,9 \pm 0,41 \mu\text{g/ml}$), İR uygulamadan elde edilenden ($1,7 \pm 0,54 \mu\text{g/ml}$) daha yüksek ve T_{max} zamanı da yine SC uygulamada ($9,3 \pm 2,12 \text{ h}$), İR uygulamaya göre ($11,6 \pm 1,05 \text{ h}$) daha kısadır.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda etki spektrumuna giren mide-bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfeksiyonları (Anaplocephaliasis) ve kronik kelebek enfestasyonunun (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir. Rizal Enjeksiyonluk Çözelti'nin etki spektrumuna aşağıdaki parazitler girmektedir.

Mide-Bağırsak Kıl Kurtları (Gastrointestinal nematodlar, genç ve erginler); Ostertagia sp. (benzimidazole rezistant inhibe larvalar L4 dahil), Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Capillaria sp., Chabertia sp., Nematodirus sp., Bunostomum phlebotomum., Strongyloides papillosus., Oesophagostomum radiatum

Akciğer Kıl Kurtları (Akciğer nematodları, genç, L4 ve erginler); Dictyocaulus viviparus, D. filaria

Karaciğer Kelebeği; Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin evreler)

Şeritler: Moniezia sp.

Cysticercus Bovis (Son konakçısı insan olan T.saginata'nın sığırlardaki ara formu): Sığırlara kesimden 30 ve 60 gün önce uygulandığında Cysticercus bovis'i öldürür ve enfestasyonları önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner Hekim Tarafından Başka Şekilde Önerilmediği Takdirde"

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda deri altı yolla uygulanır.

Rikobendazol'un sığır ve koyunlarda Farmakolojik Dozu;
Mide-Bağırsak ve Akciğer Kıl Kurtları için: 3,75 mg/kg vücut ağırlığı (1,5 ml/40 kg c.a.)
Şeritler için: 5 mg/kg vücut ağırlığı (2 ml/40 kg c.a.)
Karaciğer Kelebekleri ve Ostertagia ostertagi'nin inhibe larvaları için: 7,5 mg/kg vücut ağırlığı (3 ml/40 kg c.a.) oranındadır.

Pratik Doz Tablosu:

Hayvan Türü	Vücut Ağırlık (kg)	Mide-Bağırsak Kıl Kurtları (3,75 mg/kg c.a.)	Şeritler (5 mg/kg c.a.)	Karaciğer Kelebekleri-Ostertagia Larvaları (7,5 mg/kg c.a.)
Koyun	20 kg	0,75 ml	1 ml	1,5 ml
	40 kg	1,5 ml	2 ml	3 ml
	60 kg	2,25 ml	3 ml	4,5 ml
Sığır	80 kg	3 ml	4 ml	6 ml
	160 kg	6 ml	8 ml	12 ml
	240 kg	9 ml	12 ml	18 ml
	320 kg	12 ml	16 ml	24 ml
	480 kg	18 ml	24 ml	36 ml

10 ml'yi aşan yüksek hacimli uygulama gerektiren hayvanlarda dozun bölünerek uygulanması önerilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

- Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.
- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılması, ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
- İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.
- Dozu belirlerken hayvanın vücut ağırlığının dikkatli değerlendirilmesi gerekir.
- Kaşektik ve ağır stres altındaki hayvanlarda yapılan uygulamalar dikkatle izlenmelidir.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Benzimidazol grubu antihelmintikler teratojenite ve embriyotoksik etkileri nedeniyle gebeliğin ilk 1/3'lük döneminde ve koç katımı sırasında kullanılmamalıdır

İSTENMEYEN ETKİLER

Sığır ve koyunlarda önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İlacın prazikuantel, deksametazon ile birlikte kullanılması yasaktır, çünkü bu, hayvanın kanındaki ricobendazol konsantrasyonunun artmasına neden olacaktır.
Diğer tıbbi ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Zehirlenme halinde klinik belirtilere göre semptomatik olarak müdahale edilmelidir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 sağım) süreyle elde edilen sığır ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Rikobendazol'e aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmalıdır. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Cilde doğrudan temas minimum düzeyde tutulmalıdır.

Geçirgen olmayan kauçuk eldivenler dahil olmak üzere koruyucu giysi giyilmelidir.

Kullandıktan sonra eller yıkanmalıdır.

Evcil hayvanlarda benzimidazollere karşı çok sık direnç gelişebileceğinden, sık tekrarlanan ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalı ve doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına ve derin dondurucuya konulmadan muhafaza edilmelidir. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

Üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

Ürün tapası en fazla 30 kez delinebilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde 50 ve 100 ml'lik flip-off kapaklı amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenahanelerinde ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ 24.10.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.

05.04.2007/18-002

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Verano İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Tekfen No: 209 İç Kapı No: 6 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

FDN İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyükkayacak O.S.B. Mahallesi İnsu Sokak No:3 42250-Selçuklu/KONYA

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

RİZAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Beher ml'sinde 100 mg rikobendazol içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda etki spektrumuna giren mide-bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfeksiyonları (Anaplocephaliasis) ve kronik kelebek enfestasyonunun (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner Hekim Tarafından Başka Şekilde Önerilmediği Takdirde"

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda deri altı yolla uygulanır.

Rikobendazol'un sığır ve koyunlarda Farmakolojik Dozu;

Mide-Bağırsak ve Akciğer Kıl Kurtları için: 3,75 mg/kg vücut ağırlığı (1,5 ml/40 kg c.a.)

Şeritler için: 5 mg/kg vücut ağırlığı (2 ml/40 kg c.a.)

Karaciğer Kelebekleri ve Ostertagia ostertagi'nin inhibe larvaları için: 7,5 mg/kg vücut ağırlığı (3 ml/40 kg c.a.) oranındadır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 sağımlı) süreyle elde edilen sığır ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına ve derin dondurucuya konulmadan muhafaza edilmelidir. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

Üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

Ürün tapası en fazla 30 kez delinebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde 50 ve 100 ml'lik flip-off kapaklı amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenahanelerinde ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.

05.04.2007-18/002

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Verano İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

FDN İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 42250 Selçuklu/Konya

Seri No:

Üretim Ta.:

Son Kul. Ta.:

Dış Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

RİZAL

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti, beher ml'sinde 100 mg rikobendazol içerir.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda etki spektrumuna giren mide-bağırsak kıl kurtlarının neden olduğu klinik ve subklinik gastroenteritis, akciğer nematodlarının neden olduğu parazitik bronşitis, şerit enfeksiyonları (Anaplocephaliasis) ve kronik kelebek enfestasyonunun (Fascioliasis) tedavi ve kontrolünde endikedir

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

"Veteriner Hekim Tarafından Başka Şekilde Önerilmediği Takdirde"

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sığır ve koyunlarda deri altı yolla uygulanır.

Rikobendazol'un sığır ve koyunlarda Farmakolojik Dozu;

Mide-Bağırsak ve Akciğer Kıl Kurtları için: 3,75 mg/kg vücut ağırlığı (1,5 ml/40 kg c.a.)

Şeritler için: 5 mg/kg vücut ağırlığı (2 ml/40 kg c.a.)

Karaciğer Kelebekleri ve Ostertagia ostertagi'nin inhibe larvaları için: 7,5 mg/kg vücut ağırlığı (3 ml/40 kg c.a.) oranındadır.

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 saım) süreyle elde edilen sığır ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında, buzdolabına ve derin dondurucuya konulmadan muhafaza edilmelidir. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz.

Üretim tarihinden itibaren raf ömrü: 24 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

Ürün tapası en fazla 30 kez delinebilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Karton kutu içerisinde 50 ve 100 ml'lik flip-off kapaklı amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehanelerinde ve polikliniklerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.:

05.04.2007-18/002

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Verano İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

FDN İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. 42250 Selçuklu/Konya

Seri No:

Üretim Ta.:

Son Kul. Ta.:

KDV Da. P.S.F.: