ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
SAHRAMED Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her ml:
Aktif madde:
Sefkuinom 25 mg
(Sefkuinom sülfat olarak)

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk süspansiyon

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür
Sığır, Buzağı

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Sığır ve buzağılarda sefkuinoma duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Sığır:
- *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları
- Dijital dermatitis, enfeksiyöz bulbar nekrosis ve akut interdigital nekrobasillosis (ayak çürüğü)
- Sistemik belirtiler gösteren akut E.coli mastitisi

Buzağı:
- Buzağılarda E.coli septisemisi

4.3 Kontrendikasyonlar
Beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Vücut ağırlığı 1,25 kg'dan az olan hayvanlara uygulanmamalıdır.
Antimikrobiyal direncin insanlara yayılma riski nedeniyle kanatlı hayvanlarda (yumurtacılar dahil) kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Hedef türlerde özel uyarı yoktur.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Alerjik reaksiyon oluşması durumunda tedavi durdurulmalıdır.
Sefkuinom kullanımı, hedef hayvan türünde etiketinde belirtilen endikasyonlara uygun kullanımla sınırlandırılmalıdır.

Geniş spektrumlu beta-laktamaz taşıyan bakterilerin dirençli suşlarına seçicidir. Bu suşlar örneğin gıda yoluyla insanlara yayıldığı takdirde insan sağlığı için risk oluşturabilir. Bu nedenle, birinci basamak tedaviye zayıf yanıt veren veya zayıf yanıt vermesi beklenen (bakteriyolojik tanı olmadan tedaviye başlanması gereken çok akut vakalarda) vakalarda kullanılmalıdır.
Uygulamada resmi, ulusal ve bölgesel antimikrobiyal politikalar dikkate alınmalıdır. Ürünün prospektusunda verilen kullanım talimatlarına uyulmaması da dahil olmak üzere, artan kullanım, bu tür direncin yaygınlığını artırabilir. Mümkün olduğunca, duyarlılık testine dayalı olarak kullanılmalıdır. Ürünün uygunsuz kullanımı, sefkuinoma dirençli bakterilerin yaygınlığını artırabilir ve çapraz direnç potansiyeli nedeniyle diğer beta laktam antibiyotiklerle yapılan tedavinin etkinliğini azaltabilir.
Ürün, sadece hasta hayvanların tedavisi için kullanılır. Hastalık önleme veya sürü sağlığı programlarının bir parçası olarak kullanılmamalıdır. Hayvan gruplarının tedavisi, onaylanmış kullanım koşullarına göre yalnızca devam eden hastalık salgınlarıyla sınırlı olmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon, yutma veya cilt teması sonrasında aşırı duyarlılığa (alerjiye) neden olabilir. Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler. Bu maddelere karşı alerjik reaksiyonları bazen ciddi seyredebilir. Sefkuinom sülfata karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan kişiler, ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler.
Ürünü gereken tüm önlemleri alarak ve maruz kalmaktan kaçınarak büyük bir özenle kullanılmalıdır.
Ürüne maruz kalma sonrasında deri döküntüsü gibi belirtiler gelişirse, derhal tıbbi yardım alınmalı ve ve doktora ürünün prospektusu veya etiketi gösterilmelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.
Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar
Yoktur.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Kas içi enjeksiyondan sonra enjeksiyon yerinde bir iki hafta içinde kendiliğinden iyileşen bir şişlik oluşabilir. Nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Sıçan ve tavşanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları, teratojenik, embriyotoksik veya maternotoksik etkilere dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. İneklerde gebelik dönemindeki kullanımı araştırılmadığından sadece veteriner hekimin fayda-risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Bakteriostatik antibiyotiklerle birlikte kullanımları ise antagonistik bir etkileşime yol açabilir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Kas içi (İM) yolla uygulanır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Hayvan türü	Endikasyon	Dozaj	Sıklık
Sığır	*Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları, Dijital dermatitis, enfeksiyöz bulbar nekrosis ve akut interdigital nekrobasillosis (ayak çürüğü)	1 mg sefkuinom/kg canlı ağırlık (2 ml/50 kg canlı ağırlık)	Ardışık 3-5 gün, günde 1 defa uygulanır
	Sistemik belirtiler gösteren akut E.coli mastitisi	1 mg sefkuinom/kg canlı ağırlık (2 ml/50 kg canlı ağırlık)	24 saat arayla 2 defa uygulanır
Buzağı	E.coli septisemisi	2 mg sefkuinom/kg canlı ağırlık (4 ml/50 kg canlı ağırlık)	Ardışık 3-5 gün, günde 1 defa uygulanır

Kuru, steril bir iğne ve enjektör kullanılmalıdır. İkinci ve sonraki enjeksiyonların farklı enjeksiyon bölgelerine yapılması önerilmektedir. Tercih edilen enjeksiyon bölgesi, boynun orta kısmındaki kas dokusudur.
Doğru dozajı sağlamak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar
Sığırlarda 20 mg/kg/gün doz aşımı tolere edilmiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün (2 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapotik grup: Sistemik amaçlı antibakteriyeller, dördüncü nesil sefalosporinler
ATCvet kodu: QJ01DE90

5.1 Farmakodinamik özellikler
Sefkuinom hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki eden dördüncü kuşak geniş spektrumlu bir sefalosporin antibakteriyeldir. Bakterisidal etkilidir. Penisilinazlara ve beta-laktamazlara karşı gösterdiği yüksek stabilitesi ve terapötik spektrumunun geniş olması ile karakterizedir.

İnvitro test bulgularına göre *Escherichia coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Haemophilus somnus, Arcanobacterium pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium*

spp., Prevotella spp., Actinobacillus spp. ve *Erysipelothrix rhusiopathiae* dahil çok sayıda Gram pozitif ve Gram negatif bakteriye karşı etkilidir.

Dördüncü nesil sefalosporin olan sefkuinom, yüksek hücresel penetrasyonu ve β-laktamaz stabilitesini bir araya getirir. Önceki nesil sefalosporinlerin aksine, sefkuinom, kromozomal olarak kodlanmış Amp-C tipi sefalosporinazlar veya bazı enterobakteriyel türlerin plazmit aracılı sefalosporinazları tarafından hidrolize edilmez. Bununla birlikte, bazı geniş spektrumlu beta-laktamazlar (ESBL), sefkuinomu ve diğer nesil sefalosporinleri hidrolize edebilir. Sefkiunoma karşı direnç gelişme potansiyeli oldukça düşüktür.

Sefkinoma karşı yüksek düzeyde direnç oluşması için, iki genetik modifikasyonun, yani spesifik β-laktamazların aşırı üretimi ve membran geçirgenliğinde azalmanın aynı anda gerçekleşmesini gerekir.

5.2 Farmakokinetik özellikler
Sığırlarda, 1 mg/kg dozunda kas içi uygulamadan sonra 1,5-2 saat içinde yaklaşık 2 µg/ml'lik en yüksek serum konsantrasyonlarına ulaşılır. Sefkuinom nispeten kısa bir terminal yarı ömre (2,5 saat) sahiptir, %5'ten az proteine bağlanır ve idrarla değişmeden atılır. Oral uygulamada emilim gerçekleşmez.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Silikon Dioksit
Propilen glikol dikaprilat

6.2 Geçimsizlikler
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.
İlk kullanımı takiben tapa en fazla 40 defa delinebilir.

6.4 Muhafaza şartları
Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25^0C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
50 ml ve 100 ml'lik Tip II renksiz cam flakonlarda, gri renkli Tip I bromobütil kauçuk tıpalı ve beyaz renkli flip-off kapak ile sabitlenmiş olarak karton kutuda takdim edilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
ARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Malıköy Başkent OSB Mah.,
Atatürk Bulvarı, No: 69,
Sincan/ANKARA

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI
20/003

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ
13.05.2008

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
06.10.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

SAHRAMED

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Sahramed Enjeksiyonluk Süspansiyon, çalkalandığında, beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon olup, 1 ml'de 25 mg Sefkuinoma eşdeğer Sefkuinom sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler:

Sefkuinom hücre duvarı sentezini inhibe ederek etki eden dördüncü kuşak geniş spektrumlu bir sefalosporin antibakteriyeldir. Bakterisidal etkilidir. Penisilinazlara ve beta-laktamazlara karşı gösterdiği yüksek stabilitesi ve terapötik spektrumunun geniş olması ile karakterizedir.

İnvitro test bulgularına göre *Escherichia coli, Citrobacter spp., Klebsiella spp., Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Haemophilus somnus, Arcanobacterium pyogenes, Bacillus spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Actinobacillus spp.* ve *Erysipelothrix rhusiopathiae* dahil çok sayıda Gram pozitif ve Gram negatif bakteriye karşı etkilidir.

Dördüncü nesil sefalosporin olan sefkuinom, yüksek hücresel penetrasyonu ve β-laktamaz stabilitesini bir araya getirir. Önceki nesil sefalosporinlerin aksine, sefkuinom, kromozomal olarak kodlanmış Amp-C tipi sefalosporinazlar veya bazı enterobakteriyel türlerin plazmit aracılı sefalosporinazları tarafından hidrolize edilmez. Bununla birlikte, bazı geniş spektrumlu beta-laktamazlar (ESBL), sefkuinomu ve diğer nesil sefalosporinleri hidrolize edebilir. Sefkiunoma karşı direnç gelişme potansiyeli oldukça düşüktür.

Sefkuinoma karşı yüksek düzeyde direnç oluşması için, iki genetik modifikasyonun, yani spesifik β-laktamazların aşırı üretimi ve membran geçirgenliğinde azalmanın aynı anda gerçekleşmesini gerekir.

Farmakokinetik özellikler:

Sığırlarda, 1 mg/kg dozunda kas içi uygulamadan sonra 1,5-2 saat içinde yaklaşık 2 µg/ml'lik en yüksek serum konsantrasyonlarına ulaşılır. Sefkuinom nispeten kısa bir terminal yarı ömre (2,5 saat) sahiptir, %5'ten az proteine bağlanır ve idrarla değişmeden atılır. Oral uygulamada emilim gerçekleşmez.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Sığır ve buzağılarda sefkuinoma duyarlı Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Sığır:

- *Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları
- Dijital dermatitis, enfeksiyöz bulbar nekrosis ve akut interdigital nekrobasillosis (ayak çürüğü)
- Sistemik belirtiler gösteren akut E.coli mastitisi

Buzağı:

- Buzağılarda E.coli septisemisi

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi (İM) yolla uygulanır. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.

Hayvan türü	Endikasyon	Dozaj	Sıklık
Sığır	*Pasteurella multocida* ve *Mannheimia haemolytica*'nın neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonları, Dijital dermatitis, enfeksiyöz bulbar nekrosis ve akut interdigital nekrobasillosis (ayak çürüğü)	1 mg sefkuinom/kg canlı ağırlık (2 ml/50 kg canlı ağırlık)	Ardışık 3-5 gün, günde 1 defa uygulanır
	Sistemik belirtiler gösteren akut *E.coli* mastitisi	1 mg sefkuinom/kg canlı ağırlık (2 ml/50 kg canlı ağırlık)	24 saat arayla 2 defa uygulanır
Buzağı	*E.coli* septisemisi	2 mg sefkuinom/kg canlı ağırlık (4 ml/50 kg canlı ağırlık)	Ardışık 3-5 gün, günde 1 defa uygulanır

Kuru, steril bir iğne ve enjektör kullanılmalıdır. İkinci ve sonraki enjeksiyonların farklı enjeksiyon bölgelerine yapılması önerilmektedir. Tercih edilen enjeksiyon bölgesi, boynun orta kısmındaki kas dokusudur.
Doğru dozajı sağlamak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sefkuinom kullanımı, hedef hayvan türünde etiketinde belirtilen endikasyonlara uygun kullanımla sınırlandırılmalıdır.
Geniş spektrumlu beta-laktamaz taşıyan bakterilerin dirençli suşlarına seçicidir. Bu suşlar örneğin gıda yoluyla insanlara yayıldığı takdirde insan sağlığı için risk oluşturabilir. Bu nedenle, birinci basamak tedaviye zayıf yanıt veren veya zayıf yanıt vermesi beklenen (bakteriyolojik tanı olmadan tedaviye başlanması gereken çok akut vakalarda) vakalarda kullanılmalıdır.
Uygulamada resmi, ulusal ve bölgesel antimikrobiyal politikalar dikkate alınmalıdır. Ürünün prospektusunda verilen kullanım talimatlarına uyulmaması da dahil olmak üzere, artan kullanım, bu tür direncin yaygınlığını artırabilir. Mümkün olduğunca, duyarlılık testine dayalı olarak kullanılmalıdır. Ürünün uygunsuz kullanımı, sefkuinoma dirençli bakterilerin yaygınlığını artırabilir ve çapraz direnç potansiyeli nedeniyle diğer beta laktam antibiyotiklerle yapılan tedavinin etkinliğini azaltabilir.
Ürün, sadece hasta hayvanların tedavisi için kullanılır. Hastalık önleme veya sürü sağlığı programlarının bir parçası olarak kullanılmamalıdır. Hayvan gruplarının tedavisi, onaylanmış kullanım koşullarına göre yalnızca devam eden hastalık salgınlarıyla sınırlı olmalıdır.

Gebelikte ve Laktasyon Döneminde Kullanım:

Sıçan ve tavşanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları, teratojenik, embriyotoksik veya maternotoksik etkilere dair herhangi bir kanıt ortaya koymamıştır. İneklerde gebelik dönemindeki kullanımı araştırılmadığından sadece veteriner hekimin fayda-risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Kas içi enjeksiyondan sonra enjeksiyon yerinde bir iki hafta içinde kendiliğinden iyileşen bir şişlik oluşabilir. Nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bakteriostatik antibiyotiklerle birlikte kullanımları ise antagonistik bir etkileşime yol açabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Sığırlarda 20 mg/kg/gün doz aşımı tolere edilmiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün (2 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR
Beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Vücut ağırlığı 1,25 kg'dan az olan hayvanlara uygulanmamalıdır.
Antimikrobiyal direncin insanlara yayılma riski nedeniyle kanatlı hayvanlarda (yumurtacılar dahil) kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Sefalosporinler enjeksiyon, inhalasyon, yutma veya cilt teması sonrasında aşırı duyarlılığa (alerjiye) neden olabilir. Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler. Bu maddelere karşı alerjik reaksiyonları bazen ciddi seyredebilir. Sefkuinom sülfata karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan kişiler, ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidirler.
Ürünü gereken tüm önlemleri alarak ve maruz kalmaktan kaçınarak büyük bir özenle kullanılmalıdır.
Ürüne maruz kalma sonrasında deri döküntüsü gibi belirtiler gelişirse, derhal tıbbi yardım alınmalı ve ve doktora ürünün prospektusu veya etiketi gösterilmelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.
Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25^0C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Ürünün satışa sunulmuş haliyle raf ömrü 2 yıldır. İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür. İlk kullanımı takiben tapa en fazla 40 defa delinebilir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ve artık materyaller ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
50 ml ve 100 ml'lik Tip II renksiz cam flakonlarda, gri renkli Tip I bromobütil kauçuk tıpalı ve beyaz renkli flip-off kapak ile sabitlenmiş olarak karton kutuda takdim edilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; eczane, veteriner muayenehaneleri ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ
06.10.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.
13.05.2008-20/003

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:69 Sincan/Ankara

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:69 Sincan/Ankara

İç ve Dış Ambalaj Etiket Metni
50-100 ml

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SAHRAMED
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

1 ml'de 25 mg Sefkuinoma eşdeğer Sefkuinom sülfat içerir.
Sığır ve buzağılarda kas içi (İM) yolla uygulanır. Doz ve süre için prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır.
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün (2 sağım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25^0C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Ürünün satışa sunulmuş haliyle raf ömrü 2 yıldır. İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür. İlk kullanımı takiben tapa en fazla 40 defa delinebilir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
13.05.2008-20/003

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ:
Arma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:69 Sincan/Ankara

İmal Tarihi/Seri No:
Son Kullanma Tarihi:
Per. Sat. Fiyatı (KDV Dahil) (sadece dış ambalajda):