

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Selectan

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml;

Aktif madde:

Florfenikol: 300 mg

Yardımcı maddeler:

N-metil pirolidon: 308 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk çözelti

Hafif sarımsı, berrak çözelti.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığırlar

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Florfenikole duyarlı *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni* suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi.

4.3 Kontrendikasyonlar

Damızlık olarak kullanılan boğalarda kullanılmaz.

Florfenikole veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon gösteren hayvanlarda kullanılmaz.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yok

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakteriler için yapılmış duyarlılık test sonuçlarına göre kullanınız. Eğer bu mümkün değilse hedef bakterilerin duyarlılığı ile ilgili bölgesel epidemiyolojik bilgilere göre kullanınız.

Uygulamada ülkesel ve bölgesel antimikrobiyal politikaları dikkate alınmalıdır.

Bu ürünün ürün özellikleri özetinde belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanılmaması, florfenikole dirençli bakterilerin gelişmesine ve muhtemel çapraz direnç nedeniyle diğer antimikrobiyallerin etkinliğinin azalmasına neden olabilir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Florfenikole veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon gösteren kişiler ürünle temas etmemelidir.

Kazara kendi kendine enjeksiyondan kaçınınız. Kendine enjeksiyon durumunda ürün ve prospektüs ile birlikte acilen bir doktora başvurunuz.

Göze ve deriye temastan sakınınız. Kazara maruz kalma halinde bölgeyi bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Yardımcı madde N-metil pirolidon ile tavşanlarda ve sıçanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları fetotoksik etkilere dair kanıtlar göstermiştir. Ürünü uygulayacak doğurganlık çağındaki, hamile veya hamile olması muhtemel kadınlar kazara kendine enjeksiyonu ve ürünle teması önlemek için azami özeni göstermeli ve tüm önlemleri almalıdır.

(iii) Diğer

Bu veteriner tıbbi ürünün kullanımı karasal bitkiler, siyanobakteriler ve yeraltı suyu organizmaları için risk oluşturabilir.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Sığırlarda tedavi sırasında yem tüketiminde azalma ve dışkıda yumuşaklık görülebilir. tedavinin sona ermesinin ardından bu belirtiler hızla ve tam olarak kaybolur.

Bu ürünün kas içi uygulaması sonrasında enjeksiyon bölgesinde 14 gün boyunca süren şişlik meydana gelebilir. Enjeksiyon bölgesindeki yangı son enjeksiyondan sonraki 32 güne kadar devam edebilir.

Çok seyrek olarak anafilaktik reaksiyonlar rapor edilmiştir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Bu ürünün sığırlarda gebelik, emzirme sırasında veya damızlık amaçlı hayvanlarda güvenilirliği belirlenmemiştir. Yardımcı madde N-metil pirolidon ile tavşanlarda ve sıçanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları fetotoksik etkilere dair kanıtlar göstermiştir. Sadece sorumlu veteriner hekimin fayda-risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Bilinmemektedir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Tedavi:

Sığır:

Kas içi yolla boyun bölgesine uygulanır.

20 mg/kg canlı ağırlık (her 15 kg canlı ağırlık için 1 ml ürün) dozunda, iki defa, uygulamalar arasında 48 saat olarak. (16 ölçü iğne kullanınız)

Tavsiye dozundan daha az miktarda ürün verilmesinin önüne geçmek için hayvanın vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.

Her kullanımdan önce kapağı temizleyiniz. Kuru ve steril iğne ve enjektör kullanınız. Kauçuk tıpayı 50 defadan fazla delmeyiniz.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Bilinmemektedir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Sığırlar tedavi süresince ve kas içi son ilaç uygulamasından 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Sistemik amaçlı antibakteriyel
ATC vet kodu: QJ01BA90

5.1 Farmakodinamik özellikler

Florfenikol evcil hayvanlardan izole edilen çoğu Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir. Florfenikol ribozomal seviyede protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Laboratuvar çalışmaları florfenikolün *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni*' yi içeren ve sığırlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına neden olan bakterilere karşı etkili olduğunu göstermektedir. Florfenikol bakteriyostatik bir antibiyotik olarak kabul edilmekte ise de in vitro çalışmalar *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni*'ye karşı bakterisid etkili olduğunu göstermektedir.

Kloramfenikolün aksine florfenikol insanlarda dozla ilişkili aplastik anemi riski taşımaz. Kloramfenikol ve tiamfenikole karşı gelişen ortak transasetilasyon direnç mekanizmasının florfenikole karşı direnç gelişmesinde rolü muhtemelen daha azdır.

Florfenikole kazanılmış direnç, floR geni ile ilgili efflux pompası direnci aracılığı ile gerçekleşir. Hedef patojenlerden *Pasteurella multocida* ve *Mannhemia haemolytic*'da bu tür direnç identifiye edilmiştir. Kloramfenikol ile çapraz direnç gerçekleşebilir. Gıda kaynaklı patojen olan *Salmonella typhimurium*'da florfenikol ve diğer antibiyotiklere direnç identifiye edilmiştir. Respiratorik ve digestiv *Escherichia coli*'de üçüncü kuşak sefalosporinler ile co-rezistans gözlemlenmiştir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Sığırlarda 20 mg/kg canlı ağırlık dozunda kas içi uygulamada 48 saat boyunca etkili kan seviyesi elde edilir. Uygulamadan 5 saat sonra (Tmax) 3.86 µg/ml maksimum plazma konsantrasyonuna (C max) ulaşır. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca ortalama plazma konsantrasyonu 1.56 µg/ml'dir. Harmonik ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 18.8 saattir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

N-metilpirrolidon
Gliserol formal

6.2 Geçimsizlikler

Diğer ürünlerle karıştırarak uygulamayınız.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

6.4 Muhafaza şartları

25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, ışıktan koruyarak muhafaza edin. Dondurmayın.
Ürün açıldıktan sonra kutusu içerisinde muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliđi ve kompozisyonu

Karton kutu ierisinde 100 ml'lik renksiz Tip II cam řiřelerde ve 50, 100 ve 250 ml'lik plastik řiřelerde Tip I gri polimerik elastomer tıpa ve alüminyum mühür üzeri mavi plastik kapaklarla kapatılmış olarak satıřa sunulmuřtur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Florfenikol balıklar ve diđer suda yařayan organizmalar iin tehlikeli olabileceđinden veteriner tıbbi ürün akarsulara karıřmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

HİPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. řTİ.

Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap arşı Sit. B 2 Blok, No:44/29
Ümraniye/İSTANBUL

Tel: (216) 526 60 00 - Web adresi: www.hipra.com

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

12/042

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

19/12/2008

10. METİN DEđİřİKLİK TARİHİ

23/05/2025

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

SELECTAN Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:

1 ml'de 300 mg Florfenikol ve yardımcı madde olarak 308 mg N-metil pirolidon içerir.

Hafif sarımsı, berrak çözelti.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik: Florfenikol evcil hayvanlardan izole edilen çoğu Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı etkili geniş spektrumlu sentetik bir antibiyotiktir. Florfenikol ribozomal seviyede protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Laboratuvar çalışmaları florfenikolün *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni*' yi içeren ve sığırlarda solunum sistemi enfeksiyonlarına neden olan bakterilere karşı etkili olduğunu göstermektedir.

Forfenikol bakteriyostatik bir antibiyotik olarak kabul edilmekte ise de in vitro çalışmalar *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni*'ye karşı bakterisid etkili olduğunu göstermektedir.

Kloramfenikolün aksine florfenikol insanlarda dozla ilişkili aplastik anemi riski taşımaz.

Kloramfenikol ve tiamfenikole karşı gelişen ortak transasetilasyon direnç mekanizmasının florfenikole karşı direnç gelişmesinde rolü muhtemelen daha azdır.

Florfenikole kazanılmış direnç, floR geni ile ilgili efflux pompası direnci aracılığı ile gerçekleşir. Hedef patojenlerden *Pasteurella multocida* ve *Mannhemia haemolytic*'da bu tür direnç identifiye edilmiştir. Kloramfenikol ile çapraz direnç gerçekleşebilir. Gıda kaynaklı patojen olan *Salmonella typhimurium*'da florfenikol ve diğer antibiyotiklere dinreç identifiye edilmiştir. Respiratorik ve digestiv *Escherichia coli*'de üçüncü kuşak sefalosporinler ile co-rezistans gözlemlenmiştir.

Farmakokinetik: Sığırlarda 20 mg/kg canlı ağırlık dozunda kas içi uygulamada 48 saat boyunca etkili kan seviyesi elde edilir. Uygulamadan 5 saat sonra (Tmax) 3.86 µg/ml maksimum plazma konsantrasyonuna (C max) ulaşır. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca ortalama plazma konsantrasyonu 1.56 µg/ml'dir. Harmonik ortalama eliminasyon yarılanma ömrü 18.8 saattir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığırlarda florfenikole duyarlı *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni* suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi yolla boyun bölgesine uygulanır.

20 mg/kg canlı ağırlık (her 15 kg canlı ağırlık için 1 ml ürün) dozunda, iki defa, uygulamalar arasında 48 saat olarak.(16 ölçü iğne kullanınız)

Tavsiye dozundan daha az miktarda ürün verilmesinin önüne geçmek için hayvanın vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.

Her kullanımdan önce kapağı temizleyiniz. Kuru ve steril iğne ve enjektör kullanınız. Kauçuk tıpayı 50 defadan fazla delmeyiniz.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakteriler için yapılmış duyarlılık test sonuçlarına göre kullanınız. Eğer bu mümkün değilse hedef bakterilerin duyarlılığı ile ilgili bölgesel epidemiyolojik bilgilere göre kullanınız.

Uygulamada ülkesel ve bölgesel antimikrobiyal politikaları dikkate alınmalıdır.

Bu ürünün ürün özellikleri özetinde belirtilen talimatlara uygun şekilde kullanılmaması, florfenikole dirençli bakterilerin gelişmesine ve muhtemel çapraz direnç nedeniyle diğer antimikrobiyallerin etkinliğinin azalmasına neden olabilir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:

Bu ürünün sığırlarda gebelik, emzirme sırasında veya damızlık amaçlı hayvanlarda güvenilirliği belirlenmemiştir. Yardımcı madde N-metil pirolidon ile tavşanlarda ve sığanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları fetotoksik etkilere dair kanıtlar göstermiştir. Sadece sorumlu veteriner hekimin fayda-risk değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Sığırlarda tedavi sırasında yem tüketiminde azalma ve dışkıda yumuşaklık görülebilir. tedavinin sona ermesinin ardından bu belirtiler hızla ve tam olarak kaybolur.

Bu ürünün kas içi uygulaması sonrasında enjeksiyon bölgesinde 14 gün boyunca süren şişlik meydana gelebilir. Enjeksiyon bölgesindeki yangı son enjeksiyondan sonraki 32 güne kadar devam edebilir.

Çok seyrek olarak anafilaktik reaksiyonlar rapor edilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Bilinmemektedir. Diğer ürünlerle karıştırarak uygulamayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Bilinmemektedir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sığırlar tedavi süresince ve kas içi son ilaç uygulamasından 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR:

Damızlık olarak kullanılan boğalarda kullanılmaz.

Florfenikole veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon gösteren hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Florfenikole veya yardımcı maddelere aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon gösteren kişiler ürünle temas etmemelidir.

Kazara kendi kendine enjeksiyondan kaçınınız. Kendine enjeksiyon durumunda ürün ve prospektüs ile birlikte acilen bir doktora başvurunuz.

Göze ve deriye temastan sakınınız. Kazara maruz kalma halinde bölgeyi bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Yardımcı madde N-metil pirolidon ile tavşanlarda ve sıçanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları fetotoksik etkilere dair kanıtlar göstermiştir. Ürünü uygulayacak doğurganlık çağındaki, hamile veya hamile olması muhtemel kadınlar kazara kendine enjeksiyonu ve ürünle teması önlemek için azami özeni göstermeli ve tüm önlemleri almalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, ışıktan koruyarak muhafaza edin. Dondurmayın.

Ürün açıldıktan sonra kutusu içerisinde muhafaza edilmelidir.

Ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.

Ambalaj açıldıktan sonra raf ömrü: 28 gün

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Karton kutu içerisinde 100 ml'lik renksiz Tip II cam şişelerde ve 50, 100 ve 250 ml'lik plastik şişelerde Tip I gri polimerik elastomer tıpa ve alüminyum mühür üzeri mavi plastik kapaklarla kapatılmış olarak satışa sunulmuştur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Florfenikol balıklar ve diğer suda yaşayan organizmalar için tehlikeli olabileceğinden veteriner tıbbi ürün akarsulara karışmamalıdır. Bu veteriner tıbbi ürünün kullanımı karasal bitkiler, siyanobakteriler ve yeraltı suyu organizmaları için risk oluşturabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenahaneleri, poliklinikler ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 23/05/2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
19/12/2008 – 12/042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

HİPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.

Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29
Ümraniye/İSTANBUL

Tel: (216) 526 60 00 - Web adresi: www.hipra.com

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) İSPANYA Tel: (+34) 972 43 06 60

KUTU:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SELECTAN
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:

1ml'de 300 mg Florfenikol ve yardımcı madde olarak 308 mg N-metil pirolidon içerir.
Hafif sarımsı, berrak çözelti.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığırlarda florfenikole duyarlı *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni* suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi enjeksiyon yolu ile 20 mg/kg canlı ağırlığı (her 15 kg canlı ağırlık için 1 ml ürün) dozunda boyun bölgesine uygulanır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Sığırlar tedavi süresince ve kas içi son ilaç uygulamasından 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, ışıktan koruyarak muhafaza ediniz. Dondurmayınız.
Ürün açıldıktan sonra kutusu içerisinde muhafaza edilmelidir.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde 100 ml'lik renksiz Tip II cam şişelerde ve 50, 100 ve 250 ml'lik plastik şişelerde Tip I gri polimerik elastomer tıpa ve alüminyum mühür üzeri mavi plastik kapaklarla kapatılmış olarak satışa sunulmuştur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Florfenikol balıklar ve diğer suda yaşayan organizmalar için tehlikeli olabileceğinden veteriner tıbbi ürün akarsulara karışmamalıdır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenahaneleri, poliklinikler ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
19/12/2008 – 12/042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.

Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29

Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00 - Web adresi: www.hipra.com

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) İSPANYA Tel: (+34) 972 43 06 60

SERİ NO:

SKT:

Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):

ETİKET: 250 ml

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SELECTAN
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:

1ml'de 300 mg Florfenikol içerir.
Hafif sarımsı, berrak çözelti.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Sığırlarda florfenikole duyarlı *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* ve *Histophilus somni* suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi enjeksiyon yolu ile 20 mg/kg canlı ağırlığı (her 15 kg canlı ağırlık için 1 ml ürün) dozunda boyun bölgesine uygulanır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Sığırlar tedavi süresince ve kas içi son ilaç uygulamasından 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, ışıktan koruyarak muhafaza ediniz. Dondurmayınız.
Ürün açıldıktan sonra kutusu içerisinde muhafaza edilmelidir.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde 100 ml'lik renksiz Tip II cam şişelerde ve 50, 100 ve 250 ml'lik plastik şişelerde Tip I gri polimerik elastomer tıpa ve alüminyum mühür üzeri mavi plastik kapaklarla kapatılmış olarak satışa sunulmuştur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI:

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenahaneleri, poliklinikler ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

19/12/2008 – 12/042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

HİPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.

Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29
Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) İSPANYA Tel: (+34) 972 43 06 60

SERİ NO:

SKT:

ETİKET: 50 ml ve 100 ml

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
SELECTAN
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ:

1 ml'de 300 mg Florfenikol içerir.
Hafif sarımsı, berrak çözelti.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Kas içi enjeksiyon yolu ile 20 mg/kg canlı ağırlığı (her 15 kg canlı ağırlık için 1 ml ürün) dozunda boyun bölgesine uygulanır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Sığırlar tedavi süresince ve kas içi son ilaç uygulamasından 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLAR VE RAF ÖMRÜ:

25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, ışıktan koruyarak muhafaza edin. Dondurmayınız.
Ürün açıldıktan sonra kutusu içerisinde muhafaza edilmelidir.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
19/12/2008 – 12/042

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

HİPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29
Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00

SERİ NO:

SKT: