

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml:

Aktif madde:

Askorbik asit..... 200 mg

Yardımcı maddeler:

Metil paraben.....0,800 mg/ml

Propil paraben..... 0,100 mg/ml

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, Koyun, Keçi, At, Kedi, Köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Evcil hayvanlarda askorbik asit (Vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalit kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalit kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Tüm uygulamalarda asepti-antisepti kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Hedef türlerde gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir. Gebeliğin son dönemlerinde çok duyarlı hayvanlarda enjeksiyon yapmanın oluşturabileceği travmatik etkiden dolayı doğum sürecinin başlaması gibi çok nadir gözlenebilecek etkiler üründen bağımsızdır.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Askorbik asit, ağır metal tuzlarını (bakır tuzları, demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar) içeren ilaçlarla geçimsiz olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Günlük 10 mg üzerinde alınan askorbik asit kumarin ve inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini azaltmaktadır. Askorbik asit idrarda asitleşmeye neden olabileceğinden ürogenital sistemde aminoglikozidler ve makrolitler gibi antibakteriyel ilaçların etkinliğini azaltabilir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Tüm hedef türlerde kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla kullanılır.

Hedef tür	Farmakolojik doz	Pratik doz	Uygulama şekli	Açıklama
Sığır	4-6 mg/kg	7-12 ml /gün	Kas içi, deri altı, damar içi	Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle
Koyun	4-6 mg/kg	2-4 ml/gün	Kas içi, deri altı	Haftada iki kez 3 hafta süreyle
Keçi	4-6 mg/kg	2-4 ml/gün	Kas içi, deri altı	Haftada iki kez 3 hafta süreyle
At	5-10 mg/kg	10-20 ml /gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar
Kedi	25-75 mg/kg	0,3-0,6 ml/gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar
Köpek	25-500 mg/kg	0,3-2,5 ml/gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar

Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Yüksek dozlarda ve sık uygulanan askorbik asit hayvanlarda kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalat kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Et ve süt için ilaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) “0” gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup:

ATC-Vet Kodu: QA11GA01

5.1 Farmakodinamik özellikler

Askorbik asit bir monosakkarit türevi olup yapıca glikoza ve diğer altı karbonlu monosakkaritlere benzer. Çok hafif kendine has kokulu, ekşi tatlı ve asit reaksiyondadır. C vitamini (askorbik asid) omurilik, akciğer ve göz gibi pek çok hayvansal dokunun sulu bölümlerinde oldukça yüksek yoğunlukta bulunur. Biyolojik sistemlerde askorbik asidin rolü, C vitamininin in vivo fonksiyon ve gerekleri iki faktörle birlikte ele alınmalıdır: Birincisi, C vitamininin hem antioksidan hem de bir enzim kofaktörü olarak hareket etme yeteneği dahil biyokimyasal özellikleridir. İkincisi, bağırsakta emilmeyi, serum konsantrasyonunu, hücrel dağılımını, kullanımını ve dışarı atılımını içeren farmakokinetiğidir. Askorbik asit vücutta birçok yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde hidrojen taşıyıcısı olarak rol alır. Hayvanlarda doğrudan karıştığı tepkimelerin önemli bir kısmı mezenşimal kökenli dokuların yapımı ve bütünlüğünün korunmasıyla ilgilidir. Böylelikle kemiklerin ve dişlerin matrisi ile kapiller endotel hücreleri arasında bağlayıcı dokuların oluşumuna katılan kollagen, proteoglikan ve diğer organik maddelerin sentezi gerçekleşir. Bu etkinliği ile askorbik asit skorbut hastalığının tedavisinde ve koruyucu olarak kullanılır. Aynı zamanda stres etkilerine karşı direnci artırır, bağışıklık sistemin destekler, üreme performansını güçlendirir. A ve E vitaminlerinin in vivo etkilerini destekler, sinerjik etkileşime girer

5.2 Farmakokinetik özellikler

Evcil hayvanlara parenteral olarak verilen askorbik asit, vücuda alındıktan birkaç saat sonra ince bağırsaktan emilerek kana geçer. Bu esnada kandaki düzeyi kısa süre için yükselir. Kan dolaşımı ile dokulara taşınır ve fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Gereğinden fazla alınan askorbik asidin bir bölümü de monosakkaritlerde olduğu gibi karbondioksit ve suya okside olur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Metil paraben
Propil paraben
Sodyum hidroksit
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Askorbik asit, ağır metal tuzlarını (bakır tuzları, demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar) içeren ilaçlarla geçimsiz olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Günlük 10 mg üzerinde alınan askorbik asit kumarin ve inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini azaltmaktadır. Askorbik asit idrarda asitleşmeye neden olabileceğinden ürogenital sistemde aminoglikozidler ve makrolitler gibi antibakteriyel ilaçların etkinliğini azaltabilir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 24 saat

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliđi ve kompozisyonu

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml’lik amber renkli tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satıřa sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmıř veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

027/0026

9. PAZARLAMA İZNİNİN (İLK VERİLME) TARİHİ

10.03.2015

10. METİN DEĞİřİKLİK TARİHİ

24.03.2026

Prospektüs (50 ml-100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril bir çözelti olup her ml'sinde etkin madde olarak 200 mg Askorbik asit, koruyucu olarak Metil paraben ve Propil paraben içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti içerisinde bulunan Askorbik asit bir monosakkarit türevi olup yapıca glikoza ve diğer altı karbonlu monosakkaritlere benzer. Çok hafif kendine has kokulu, ekşi tatlı ve asit reaksiyondadır. C vitamini (askorbik asit) omurilik, akciğer ve göz gibi pek çok hayvansal dokunun sulu bölümlerinde oldukça yüksek yoğunlukta bulunur. Biyolojik sistemlerde askorbik asidin rolü, C vitamininin in vivo fonksiyon ve gerekleri iki faktörle birlikte ele alınmalıdır. Birincisi, C vitamininin hem antioksidan hem de bir enzim kofaktörü olarak hareket etme yeteneği dahil biyokimyasal özellikleridir. İkincisi, bağırsakta emilmeyi, serum konsantrasyonunu, hücresel dağılımını, kullanımını ve dışarı atılımını içeren farmakokinetiğidir. Askorbik asit vücutta birçok yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde hidrojen taşıyıcısı olarak rol alır. Hayvanlarda doğrudan karıştığı tepkimelerin önemli bir kısmı mezenşimal kökenli dokuların yapımı ve bütünlüğünün korunmasıyla ilgilidir. Böylelikle kemiklerin ve dişlerin matriksi ile kapiller endotel hücreleri arasında bağlayıcı dokuların oluşumuna katılan kollagen, proteoglikan ve diğer organik maddelerin sentezi gerçekleşir. Bu etkinliği ile askorbik asit skorbüt hastalığının tedavisinde ve koruyucu olarak kullanılır. Aynı zamanda stres etkilerine karşı direnci artırır, bağışıklık sistemin destekler, üreme performansını güçlendirir. A ve E vitaminlerinin in vivo etkilerini destekler, sinerjik etkileşime girer. Evcil hayvanlara parenteral olarak verilen askorbik asit, vücuda alındıktan birkaç saat sonra ince bağırsaktan emilerek kana geçer. Bu esnada kandaki düzeyi kısa süre için yükselir. Kan dolaşımı ile dokulara taşınır ve fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Gereğinden fazla alınan askorbik asidin bir bölümü de monosakkaritlerde olduğu gibi karbondioksit ve suya okside olur.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, evcil hayvanlarda Askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

Hedef tür	Farmakolojik doz	Pratik doz	Uygulama şekli	Açıklama
Sığır	4-6 mg/kg canlı ağırlık	7-12 ml /gün	Kas içi, deri altı, damar içi	Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle
Koyun	4-6 mg/kg	2-4 ml/gün	Kas içi, deri altı	Haftada iki kez 3

	canlı ağırlık			hafta süreyle
Keçi	4-6 mg/kg canlı ağırlık	2-4 ml/gün	Kas içi, deri altı	Haftada iki kez 3 hafta süreyle
At	5-10 mg/kg canlı ağırlık	10-20 ml /gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar
Kedi	25-75 mg/kg canlı ağırlık	0,3-0,6 ml/gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar
Köpek	25-500 mg/kg canlı ağırlık	0,3-2,5 ml/ gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sık uygulamaya bağlı olarak kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalat kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Askorbik asit ağır metal tuzlarını (bakır tuzları, demir tuzları, yükseltgeyici ajanlar) içeren ilaçlarla geçimsiz olduğundan birlikte kullanılmamalıdır. Kalsiyum içeren serumlarla karıştırılmamalıdır. Günlük 10 mg üzerinde alınan Askorbik asit kumarin ve inandiyon türevleri gibi antikoagulan ilaçların mide-barsak sisteminden emilimini azaltmaktadır. Askorbik asit idrarda asitleşmeye neden olabileceğinden üro-genital sistemde aminoglikozidler ve makrolitler gibi antibakteriyel ilaçların etkinliğini azaltabilir. Askorbik asit başta şeker için idrar testi olmak üzere bazı tahlil sonuçlarını etkileyebilmektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda ve sık uygulanan askorbik asit hayvanlarda kusma, ishal, sık idrar yapma, böbrek tübüllerinde kalsiyum okzalat kristallerinin oluşumu ve deride peteşiyal kızarıklık gözlenebilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için sıfır '0' gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Urolithiasis (böbrekte taş oluşumu) tanısı veya şüphesi bulunan hayvanlarda uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Tüm uygulamalarda asepti-antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehane, poliklinik ve eczanelerde satılmaktadır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 24.03.2026

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 10.03.2015-027/0026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Arion İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No.8 34959 Tepeören, Tuzla/İstanbul

Dış ambalaj etiketi (50 ml - 100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

SYMVİT-C

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril bir çözelti olup her ml'sinde etkin madde olarak 200 mg Askorbik asit, koruyucu olarak Metil paraben ve Propil paraben içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, evcil hayvanlarda Askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır. Her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyöz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

Hedef tür	Farmakolojik doz	Pratik doz	Uygulama şekli	Açıklama
Sığır	4-6 mg/kg canlı ağırlık	7-12 ml /gün	Kas içi, deri altı, damar içi	Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle
Koyun	4-6 mg/kg canlı ağırlık	2-4 ml/gün	Kas içi, deri altı	Haftada iki kez 3 hafta süreyle
Keçi	4-6 mg/kg canlı ağırlık	2-4 ml/gün	Kas içi, deri altı	Haftada iki kez 3 hafta süreyle
At	5-10 mg/kg canlı ağırlık	10-20 ml /gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar
Kedi	25-75 mg/kg canlı ağırlık	0,3-0,6 ml/gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar
Köpek	25-500 mg/kg canlı ağırlık	0,3-2,5 ml/gün	Kas içi, damar içi	İstenen etki sağlanana kadar

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için sıfır '0' gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehane, poliklinik ve eczanelerde satılmaktadır (VHR).

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
10.03.2015-027/0026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Arion İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No.8 34959
Tepeören, Tuzla/İstanbul

Seri no :

Üretim tarihi :

Son kullanma tarihi :

Perakende satış fiyatı (KDV dahil) :

İç ambalaj etiketi (50 ml - 100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

SYMVİT-C

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, berrak veya hafif sarımsı renkte steril bir çözelti olup her ml'sinde etkin madde olarak 200 mg Askorbik asit, koruyucu olarak Metil paraben ve Propil paraben içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti, evcil hayvanlarda Askorbik asit (vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı koruyucu olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde SYMVİT-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır. Farmakolojik dozu sığır, koyun ve keçide 4-6 mg/kg canlı ağırlık; atta 5-10 mg/kg canlı ağırlık; kedide 25-75 mg/kg canlı ağırlık; köpekte 25-500 mg/kg canlı ağırlık'tır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Et ve süt için sıfır '0' gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde 50 ml ve 100 ml'lik amber renkli tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehane, poliklinik ve eczanelerde satılmaktadır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

10.03.2015-027/0026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 Tuzla/İSTANBUL

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Arion İlaç San. Tic. A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (İTOSB) 12. Cad. No.8 34959 Tepeören, Tuzla/İstanbul

Seri no :

Üretim tarihi :

Son kullanma tarihi :