

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Tekno-B Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml:

Aktif madde:

Vitamin B₁ (Tiamin HCl) 100 mg

Vitamin B₆ (Pridoksin HCl) 10 mg

Yardımcı maddeler:

Koruyucu

Metil parahidroksibenzoat (E218) 1.8 mg

Propil parahidroksibenzoat (E216) 0.2 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk çözelti

Sarı renkli, berrak, steril bir vitamin çözeltisi

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, Koyun, Keçi, At, Kedi, Köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B₁ (Tiamin HCl) ve Vitamin B₆ (Piridoksin HCl) eksikliklerinde veya tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan Vitamin B₁ (Tiamin HCl)'in ven içi kullanımda nadiren de olsa anafilaktik şok oluşturduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle Vitamin B₁ (Tiamin HCl)'e duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Etken maddelere veya bileşiminde bulunan yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Tiaminin parenteral kullanımında anafilaktik reaksiyonlar şekillenebileceğinden ven içi uygulama yavaş ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Anafilaktik şok durumunda, adrenalin sağaltımı yapılır.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Belirtilen doz ve kullanım süresi aşılmamalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Tüm uygulamalarda asepti-antisepti kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Uygulama esnasında herhangi bir gıda tüketilmemelidir. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Kas içi ve deri altı yollardan yapılan uygulamalarda, enjeksiyon bölgesinde hafif irritasyon görülebilir. Yüksek ve tekrarlayan dozlarda anafilaktik reaksiyonlar (öksürük, yutma güçlüğü, kaşıntı, yüzde şişme ve nefes darlığı) görülebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Hedef türde veri bulunmaması durumunda, sorumlu veteriner hekim tarafından yarar/risk oranının değerlendirilmesinden sonra kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin yapısal olarak antagonistidir. Amprolyum, tiamin'in barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. Tüberküloz tedavisinde kullanılan izonikotinik asit hidrazid (izoniazid) ve bakır zehirlenmesinde kullanılan Penisilamin ise vitamin B₆ antagonistidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Tüm hedef türlerde kas içi, deri altı ve yavaş ven içi yolla kullanılır.

Aşağıda verilen dozlar genel öneri niteliğindedir. İhtiyaç duyulan doz, hayvanların durumu, beslenme şekilleri vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Pratik doz tablosu:

HAYVAN TÜRÜ	Ortalama Vücut Ağırlıkları	DOZ
Sığır - At	400 kg ve üzeri	10 - 20 ml
Dana - Tay (1 yaşını doldurmuş)	350 kg ve üzeri	5 - 10 ml
Buzağı - Tay	150 kg ve üzeri	3 - 5 ml
Koyun - Keçi	50 kg ve üzeri	3 - 5 ml
Kuzu - Oğlak	30 kg ve üzeri	1 - 2 ml
Köpek - Kedi	5 kg ve üzeri	0.5 - 2 ml

Ortalama vücut ağırlıkları için uygulanacak dozlar tabloda belirtilmiştir, Yeni doğanlarda doğumdan 24 saat sonra başlanabilir. Veteriner Hekimin tavsiyesine bağlı olarak günde 1 veya 2 uygulama yapılır. Uygulama tedavi gerekli görüldüğü sürece devam edebilir. Uygulama esnasında asepti, antisepti kurallarına uyulmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Pratik uygulamada doz aşımı görülmez. Doz aşımı olduğu düşünülen olgularda adrenalin ve

benzeri ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmalıdır. Intravenöz olarak çok yüksek dozlarda uygulandığında, vazodilatasyon, kan basıncında düşüş, bradikardi, düzensiz solunum veya solunum depresyonu gibi koşulların oluştuğu bildirilmiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Et ve süt için kalıntı süresi “0” (sıfır) gündür.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup: Vitaminler, vitamin B₆ ve/veya vitamin B₁₂ ile kombinasyon halinde Vitamin B₁

ATCvet Kodu: QA11DB

5.1 Farmakodinamik özellikler

Suda eriyen vitaminler olan tiamin (vitamin B₁) ve piridoksin (vitamin B₆), merkezi ve çevresel sinir sisteminin ara metabolizmasında koenzimler olarak önemli bir rol oynarlar.

Tiamin (vitamin B₁) glikoz metabolizmasında çok önemli bir rol oynar. Bu vitamin, insan ve hayvan vücudunda ATP tarafından fosfatlanarak, tiamin difosfata dönüşür. Tiamin difosfat vücutta karbonhidratların ara metabolizmasında rol oynayan önemli bir koenzimdir.

Tiamin, pirofosforik asit esterisi şeklinde karbonhidrat metabolizmasına katılıp katalizör görevi yaparak aktif asetik asidin ortaya çıkmasını sağlar. Aktif asetik asit dokularda görülen pirüvik ve laktik asit birikimini ortadan kaldırarak sinirsel uyarıların iletimine katılan asetilkolin'in ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Buna bağlı olarak B₁ vitamini enjeksiyonundan kısa süre sonra organizmanın karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı görülür.

Pridoksin (vitamin B₆), hidroksillenmiş ve iki metil alkol grubu içeren bir piridin türevidir. Aminoasitlerin katabolizma ve anabolizmaları ile ilgili enzim reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite gösterir. Bu bakımdan aminoasit metabolizması ile karbonhidrat, yağ asitleri ve enerji metabolizması arasında önemli bağlantı kurar. Pridoksin triptofan metabolizmasında gereklidir ve bu nedenle hemoglobin oluşmasında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, kalp ve kas kasılmalarında da rolü vardır. Ayrıca antijenlere karşı antikor yanıtı ve lenfosit oluşumunda da görev alır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Oral ya da parenteral yol ile uygulanan tiamin hızla dokularda tiamin pirofosfat (TPP) ve tiamin trifosfata (TTP) dönüştürülür. Kas içi uygulandığında hızla emilir ve birçok vücut dokusuna dağılır. Tiaminin emilimi büyük ölçüde jejunumda ve ince barsakların üst kısmında gerçekleşir ve karaciğer tarafından metabolize edilir. Vücut gereksinimi kadar olan kısmı depolanır, kalan kısmı da parçalanmış metabolitler halinde idrarla atılır.

Pridoksin (vitamin B₆) parenteral uygulandığında hızla emilir. Pridoksin gastrointestinal sistemde özellikle jejunumdan emilir ve tüm vücuda dağılır. Emilimin ardından, pridoksal fosfat ve pridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde metabolize olur ve metabolitleri idrarla atılır. İdrardaki başlıca metaboliti pridoksik asittir. Ayrıca, pyridoxol, piridoksal ve piridoksaminin yanı sıra bunların fosforile edilen türevlerinin küçük miktarları da idrarla atılır. Rumen mikroflora dengesinin bozulduğu, rumen asidozu ve alkalozu gibi her türlü gıda indigestiyonlarda ve gastrointestinal enfeksiyonlarda tüm B vitaminleri gibi, B₁ ve B₆ vitaminlerinin sentezi de yavaşlar ya da durur. Ayrıca emilimleri de engellenir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Metil parahidroksibenzoat (E218)
Propil parahidroksibenzoat (E216)
Disodyum hidrojen fosfat
Disodyum edetat
Sodyum hidroksit
Hidroklorik asit
Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Diğer tıbbi ürünlerle karıştırılarak kullanılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 2 yıl
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün
Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir

6.4 Muhafaza şartları

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İkitelli O.S.B Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16 Küçükçekmece /
İSTANBUL

info@teknovet.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

012/0098

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

26.12.2003

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 21.05.2025

Prospektüs:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Tekno-B®
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ

Sarı renkli, berrak, steril bir vitamin çözeltisi olan Tekno-B her ml'sinde 100 mg vitamin B₁ (tiamin HCl), 10 mg vitamin B₆ (piridoksin HCl), koruyucu olarak 1.8 mg metil parahidroksibenzoat (E218) ve 0.2 mg propil parahidroksibenzoat (E216) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikleri

Suda eriyen vitaminler olan tiamin (vitamin B₁) ve piridoksin (vitamin B₆), merkezi ve çevresel sinir sisteminin ara metabolizmasında koenzimler olarak önemli bir rol oynarlar.

Tiamin (vitamin B₁) glikoz metabolizmasında çok önemli bir rol oynar. Bu vitamin, insan ve hayvan vücudunda ATP tarafından fosfatlanarak, tiamin difosfata dönüşür. Tiamin difosfat vücutta karbohidratların ara metabolizmasında rol oynayan önemli bir koenzimdir.

Tiamin, pirofosforik asit esteri şeklinde karbohidrat metabolizmasına katılıp katalizör görevi yaparak aktif asetik asidin ortaya çıkmasını sağlar. Aktif asetik asit dokularda görülen pirüvik ve laktik asit birikimini ortadan kaldırarak sinirsel uyarıların iletimine katılan asetilkolin'in ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Buna bağlı olarak B₁ vitamini enjeksiyonundan kısa süre sonra organizmanın karbohidrat ve yağ metabolizmasının ve sinirsel fonksiyonların düzene girdiği, büyümenin ise hızlandığı görülür.

Pridoksin (vitamin B₆), hidroksillenmiş ve iki metil alkol grubu içeren bir piridin türevidir. Aminoasitlerin katabolizma ve anabolizmaları ile ilgili enzim reaksiyonlarında koenzim olarak aktivite gösterir. Bu bakımdan aminoasit metabolizması ile karbohidrat, yağ asitleri ve enerji metabolizması arasında önemli bağlantı kurar. Pridoksin triptofan metabolizmasında gereklidir ve bu nedenle hemoglobin oluşmasında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda, kalp ve kas kasılmalarında da rolü vardır. Ayrıca antijenlere karşı antikor yanıtı ve lenfosit oluşumunda da görev alır.

Farmakokinetik özellikleri

Oral ya da parenteral yol ile uygulanan tiamin hızla dokularda tiamin pirofosfat (TPP) ve tiamin trifosfata (TTP) dönüştürülür. Kas içi uygulandığında hızla emilir ve birçok vücut dokusuna dağılır. Tiaminin emilimi büyük ölçüde jejunumda ve ince barsakların üst kısmında gerçekleşir ve karaciğer tarafından metabolize edilir. Vücut gereksinimi kadar olan kısmı depolanır, kalan kısmı da parçalanmış metabolitler halinde idrarla atılır.

Pridoksin (vitamin B₆) parenteral uygulandığında hızla emilir. Pridoksin gastrointestinal sistemde özellikle jejunumdan emilir ve tüm vücuda dağılır. Emilimin ardından, pridoksal fosfat ve pridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde metabolize olur ve metabolitleri idrarla atılır. İdrardaki başlıca metaboliti pridoksik asittir. Ayrıca, pyridoxol, piridoksal ve piridoksaminin yanı sıra bunların fosforile edilen türevlerinin küçük miktarları da idrarla atılır. Rumen mikroflora dengesinin bozulduğu, rumen asidozu ve alkalozu gibi her türlü gıda indigestiyonlarda ve gastrointestinal enfeksiyonlarda tüm B vitaminleri gibi, B₁ ve B₆ vitaminlerinin sentezi de yavaşlar ya da durur. Ayrıca emilimleri de engellenir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B₁ (Tiamin HCl) ve Vitamin B₆ (Pridoksin HCl) eksikliklerinde veya tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef türlerde kas içi, deri altı ve yavaş ven içi yolla kullanılır.

Aşağıda verilen dozlar genel öneri niteliğindedir. İhtiyaç duyulan doz, hayvanların durumu, beslenme şekilleri vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Pratik doz tablosu:

HAYVAN TÜRÜ	Ortalama Vücut Ağırlıkları	DOZ
Sığır - At	400 kg ve üzeri	10 - 20 ml
Dana - Tay (1 yaşını doldurmuş)	350 kg ve üzeri	5 - 10 ml
Buzağı - Tay	150 kg ve üzeri	3 - 5 ml
Koyun - Keçi	50 kg ve üzeri	3 - 5 ml
Kuzu - Oğlak	30 kg ve üzeri	1 - 2 ml
Köpek - Kedi	5 kg ve üzeri	0.5 - 2 ml

Ortalama vücut ağırlıkları için uygulanacak dozlar tabloda belirtilmiştir, Yeni doğanlarda doğumdan 24 saat sonra başlanabilir. Veteriner Hekimin tavsiyesine bağlı olarak günde 1 veya 2 uygulama yapılır. Uygulama tedavi gerekli görüldüğü sürece devam edebilir. Uygulama esnasında asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Tiaminin parenteral kullanımında anafilaktik reaksiyonlar şekillenebileceğinden ven içi uygulama yavaş ve dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Anafilaktik şok durumunda, adrenalin sağaltımı yapılır.

Belirtilen doz ve kullanım süresi aşılmamalıdır.

Gebelikte ve laktasyonda kullanım:

Hedef türde veri bulunmaması durumunda, sorumlu veteriner hekim tarafından yarar/risk oranının değerlendirilmesinden sonra kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kas içi ve deri altı yollardan yapılan uygulamalarda, enjeksiyon bölgesinde hafif irritasyon görülebilir. Yüksek ve tekrarlayan dozlarda anafilaktik reaksiyonlar (öksürük, yutma güçlüğü, kaşıntı, yüzde şişme ve nefes darlığı) görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Pritiamin, oksitiamin gibi sentetik bileşikler ile amprolyum, tiaminin yapısal olarak antagonistidir. Amprolyum, tiamin'in barsaklardan emilimini inhibe eder ve aynı zamanda vitaminin fosforilasyonunu bloke eder. Tüberküloz tedavisinde kullanılan izonikotinik asit hidrazid (izoniazid) ve bakır zehirlenmesinde kullanılan Penisilamin ise vitamin B₆ antagonistidir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Pratik uygulamada doz aşımı görülmez. Doz aşımı olduğu düşünülen olgularda adrenalin ve benzeri ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmalıdır. Intravenöz olarak çok yüksek dozlarda

uygulandığında, vazodilatasyon, kan basıncında düşüş, bradikardi, düzensiz solunum veya solunum depresyonu gibi koşulların oluştuğu bildirilmiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Et ve süt için kalıntı süresi “0” (sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bileşiminde bulunan Vitamin B1 (Tiamin HCl)’in ven içi kullanımda nadiren de olsa anafilaktik şok oluşturduğu rapor edilmiştir. Bu nedenle Vitamin B1 (Tiamin HCl)’e duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Etken maddelere veya bileşiminde bulunan yardımcı maddelere aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Tüm uygulamalarda asepsi-antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Uygulama esnasında herhangi bir gıda tüketilmemelidir. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C’nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde gri bromobutil kauçuk tıpa ve şeffaf alüminyum flip-off kapak ile kapatılmış 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik tip II amber renkli cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehane ve polikliniklerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 21.05.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
26.12.2003 - 012/0098

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16 34307 Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

İç Ambalaj etiketi:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Tekno-B®
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

Her ml’de 100 mg vitamin B1 (tiamin HCl) ve 10 mg vitamin B6 (piridoksin HCl) içerir.

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B₁ (Tiamin HCl) ve Vitamin B₆ (Piridoksin HCl) eksikliklerinde veya tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Tüm hedef türlerde kas içi, deri altı ve yavaş ven içi yolla kullanılır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Et ve süt için kalıntı süresi “0” (sıfır) gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C’nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
26.12.2003 - 012/0098

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No : **Üretim Tarihi :** **Son Kullanma Tarihi :**

Dış Ambalaj etiketi:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Tekno-B®
Enjeksiyonluk Çözelti
Vitamin

BİLEŞİMİ

Her ml'de 100 mg vitamin B₁ (tiamin HCl) ve 10 mg vitamin B₆ (piridoksin HCl) içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B₁ (Tiamin HCl) ve Vitamin B₆ (Piridoksin HCl) eksikliklerinde veya tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef türlerde kas içi, deri altı ve yavaş ven içi yolla kullanılır.

Aşağıda verilen dozlar genel öneri niteliğindedir. İhtiyaç duyulan doz, hayvanların durumu, beslenme şekilleri vb. faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Pratik doz tablosu:

HAYVAN TÜRÜ	Ortalama Vücut Ağırlıkları	DOZ
Sığır - At	400 kg ve üzeri	10 - 20 ml
Dana - Tay (1 yaşını doldurmuş)	350 kg ve üzeri	5 - 10 ml
Buzağı - Tay	150 kg ve üzeri	3 - 5 ml
Koyun - Keçi	50 kg ve üzeri	3 - 5 ml
Kuzu - Oğlak	30 kg ve üzeri	1 - 2 ml
Köpek - Kedi	5 kg ve üzeri	0.5 - 2 ml

Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Et ve süt için kalıntı süresi "0" (sıfır) gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında, 25 °C'nin altında, buzdolabına koymadan, dondurulmadan ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Üretim tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir. Tıpa 40 kezden fazla delinmemelidir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
26.12.2003 - 012/0098

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16

34307 Küçükçekmece / İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3

59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Seri No :

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi :

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil):