

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

PENDİSTREPTO

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml:

Aktif madde:

Benzilpenisilin prokain.....200 mg

Dihidrostreptomisin sülfat.....250 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) 3.7 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk süspansiyon

Çalkalandığında beyaz renkli,kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk süspansiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, koyun, at

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Kombinasyona duyarlı aşağıdaki mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisi;

Arcanobacterium pyogenes

Erysipelothrix rhusiopathiae

Klebsiella pneumoniae

Listeria spp

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Staphylococcus spp (penisilinaz üretmeyen)

Streptococcus spp

Salmonella spp

4.3 Kontrendikasyonlar

Betalaktamlara duyarlı hayvanlarda kullanılmaz.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Böbrek rahatsızlığı veya fonksiyonel bozukluğu olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Tavşan ve küçük rodentlerde kullanılmaz.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Tavsiye edilen dozu aşmamaya özen gösteriniz. Aminoglikozidler penislinlerden daha dar güvenlik marjına sahiptir.

Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakterilere ait duyarlılık sonuçlarına göre kullanınız. Bu mümkün değilse, tedavi bölgesel epidemiyolojik verilere dayandırılmalıdır. Bu ürünün kullanım talimatından farklı şekilde kullanılması, betalaktam veya aminoglikozidlere dirençli bakterilerin gelişmesine ve çapraz direnç nedeniyle diğer bakterilere karşı etkinliğin azalmasına neden olabilir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Kazara kendinize enjeksiyondan kaçınmak için gerekli önlemleri alınız. Böyle bir durumda derhal tıbbi destek alınız.

Penislin ve sefalosporinler, deriye temas, ağız yolu ile alma, solunum yoluyla alma veya enjeksiyon sonrasında aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonlarına neden olabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında karşılıklı çapraz reaksiyon söz konusudur. Alerjik reaksiyonlar nadiren çok ciddi olabilir.

1- Duyarlı iseniz veya bu tür ürünlerle temas etmemeniz gerektiği söylenmişse kesinlikle ürünü kullanmayınız.

2-Ürünün uygulanması sırasında maruziyeti engellemek için gerekli önlemleri alınız.

3-Maruziyet sonrası deride kızarıklık gibi belirtiler görürseniz derhal etiket ve prospektüs ile birlikte doktora başvurunuz. Yüz, göz veya dudaklarda şişme veya nefes almada zorluk gibi belirtiler çok daha ciddi belirtilerdir ve çok acil tıbbi müdahale gerektirir.

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Atlarda kas içi enjeksiyon sonrası geçici lokal reaksiyon gözlenebilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar bölgesel şişliklerden anafilaksi ve ölüme kadar uzanabilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda, işitme ve denge bozuklukları, böbrek fonksiyonlarında bozulma oluşabilir. Dihidrostreptomisin nörömsküler blokaj etkisi nedeniyle kramp ve nefes almada güçlük görülebilir. Yan etki görülmesi halinde tedavi kesilerek görülen yan etkiye göre tedavi yapılması önerilir. Aminoglikozidlerin nörömsküler blokaj etkileri kalsiyum ve neostigmin uygulaması ile kısmen giderilebilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Ürünün gebe hayvanlarda güvenilir kullanımına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Gebe hayvanlarda kullanımı Veteriner Hekimin fayda/risk değerlendirmesine tabidir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer aminoglikozidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Vasküler depresyon riski nedeniyle pentobarbital ve diğer inhalasyon anesteziği ile kullanılmamalıdır.

Nörömsküler blokajı artıran diğer ürünlerle birlikte (kas gevşeticiler) ve ototoksikite riskini artırması nedeniyle diüretiklerle birlikte kullanılmaz.

Heparin, kalsiyum glukonat, riboflavin ve triamkinolon ile birlikte uygulanmaz. Prokainin etkisini azaltması nedeniyle, sülfonamidlerle birlikte kullanılmaz.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

Derin kas içi uygulanır.

Sığır, koyun ve at: 8 mg/kg vücut ağırlığı benzil penisilin prokain ve 10 mg/kg vücut ağırlığı dihidrostreptomisin sülfat dozunda, pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. Atlarda bir bölgeye en fazla 15, sığırlarda 6, koyunlarda 3 ml uygulanmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Dihidrostreptomisin aşırı dozda uygulanması, nörömsküler blokaj ve diğer etkiler nedeniyle kaslarda zayıflık ve solunum arrestine neden olabilir. Prokain zehirlenmesi, çırpınma, hipotansiyon ve psikoza neden olabilir. Atlar prokainin yan etkilerine en etkili türdür. Kaslarda zayıflık, inkoordinasyon, dengesizlik, heyecan, çırpınma gibi diğer sinir sistemi bulguları diğer hayvanlarda görülmüştür.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 64 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 120 saat (10 sağıım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Sistemik amaçlı antibakteriyeller, Antibakteriyel kombinasyonları
ATC Vet Kodu: QJ01RA01

5.1 Farmakodinamik özellikler

Penisilin G beta-laktam grubu bir antibiyotiktir ve yapısında diğer penisilinler gibi tiazolidin ve beta-laktam halkaları bulunur. Beta-laktamlar, duyarlı Gram pozitif bakterilerde bakteri hücre duvarının gelişmesini, peptidoglikan sentezini final aşamadan engelleyerek etki gösterir. Transpeptidaz enzimini inhibe eder. Bakterisidal etki gösterir ve gelişen hücrelerin lizisine neden olur.

Dihidrostreptomisin Gram negatif bakterilere karşı etkili aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Bakteriyel ribozomlarda 30S alt ünitesi üzerindeki reseptörlere bağlanarak etki gösterir. Bunun sonucunda mRNA üzerindeki kodlar yanlış okunur ve bakteriyostasis gelişir. Aminoglikozidler betalaktamlar ile sinerjik etki gösterir.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Enjeksiyondan sonra prokain penisilin enjeksiyon bölgesinden hızla emilir, uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra plazma maksimum seviyesi elde edilir. (At, koyun ve domuzlarda 1-2 µg/ml, sığırlarda 0.5 µg/ml).

Penisilinün eliminasyon yarılanma ömrü koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, sığırlarda 5 saat, atlarda 11 saattir.

Dihidrostreptomisin benzer oranlarda emilir, plazma maksimum seviyeleri domuz, koyun ve sığırlarda yaklaşık 23 µg/ml, atlarda 15 µg/ml'dir. Eliminasyon yarılanma ömrü sığır, koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, atlarda 4 saattir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Prokain hidroklorid

Sodyum sitrat dihidrat

Karboksimetilselüloz sodyum

Polivinilpirolidon

Sodyum formaldehit sülfoksilat

Enjeksiyonluk su

6.2 Geçimsizlikler

Bu ürün diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

6.4 Muhafaza şartları

25 °C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliđi ve kompozisyonu

50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) řiselerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satıřa sunulmuřtur.

6.6 Kullanılmıř veya arta kalan ürünün imhasına iliřkin özel önlemler

Kullanılmamıř veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. řTİ

Atatürk Mah. Ertugrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Atařehir İstanbul

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:009/0890**9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ**

11.04.2005-009/0890

10. METİN DEĞİřİKLİK TARİHİ

12.05.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır PENDİSTREPTO Enjeksiyonluk Süspansiyon Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat) ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik

Penisilin G beta-laktam grubu bir antibiyotiktir ve yapısında diğer penisilinler gibi tiazolidin ve beta-laktam halkaları bulunur. Beta-laktamlar, duyarlı Gram pozitif bakterilerde bakteri hücre duvarının gelişmesini, peptidoglikan sentezini final aşamadan engelleyerek etki gösterir. Transpeptidaz enzimini inhibe eder. Bakterisidal etki gösterir ve gelişen hücrelerin lizisine neden olur.

Dihidrostreptomisin Gram negatif bakterilere karşı etkili aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Bakteriyel ribozomlarda 30S alt ünitesi üzerindeki reseptörlere bağlanarak etki gösterir. Bunun sonucunda mRNA üzerindeki kodlar yanlış okunur ve bakteriyostasis gelişir. Aminoglikozidler betalaktamlar ile sinerjik etki gösterir.

Farmakokinetik özellikler

Enjeksiyondan sonra prokain penisilin enjeksiyon bölgesinden hızla emilir, uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra plazma maksimum seviyesi elde edilir (At, koyun ve domuzlarda 1-2 µg/ml, sığırlarda 0.5 µg/ml).

Penisilinün eliminasyon yarılanma ömrü koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, sığırlarda 5 saat, atlarda 11 saattir.

Dihidrostreptomisin benzer oranlarda emilir, plazma maksimum seviyeleri domuz, koyun ve sığırlarda yaklaşık 23 µg/ml, atlarda 15 µg/ml'dir. Eliminasyon yarılanma ömrü sığır, koyun ve domuzlarda yaklaşık 2 saat, atlarda 4 saattir.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Sığır, koyun ve atlarda kullanılır.

Kombinasyona duyarlı aşağıdaki mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisi;

Arcanobacterium pyogenes

Erysipelothrix rhusiopathiae

Klebsiella pneumoniae

Listeria spp

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Staphylococcus spp (penisilinaz üretmeyen)

Streptococcus spp

Salmonella spp

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

Derin kas içi uygulanır.

Sığır, koyun ve at: 8 mg/kg vücut ağırlığı benzil penisilin prokain ve 10 mg/kg vücut ağırlığı dihidrostreptomisin sülfat dozunda, pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu

doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. Atlarda bir bölgeye en fazla 15, sığırlarda 6, koyunlarda 3 ml uygulanmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Böbrek rahatsızlığı veya fonksiyonel bozukluğu olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozu aşmayınız. Tavşan ve küçük rodentlerde kullanılmaz.

Tavsiye edilen dozu aşmamaya özen gösteriniz. Aminoglikozidler penisilinlerden daha dar güvenlik marjına sahiptir.

Bu ürünü hayvanlardan elde edilen bakterilere ait duyarlılık sonuçlarına göre kullanınız. Bu mümkün değilse, tedavi bölgesel epidemiyolojik verilere dayandırılmalıdır. Bu ürünün kullanım talimatından farklı şekilde kullanılması, betalaktam veya aminoglikozidlere dirençli bakterilerin gelişmesine ve çapraz direnç nedeniyle diğer bakterilere karşı etkinliğin azalmasına neden olabilir.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı

Ürünün gebe hayvanlarda güvenilir kullanımına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Gebe hayvanlarda kullanımı Veteriner Hekimin fayda/risk değerlendirmesine tabidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Atlarda kas içi enjeksiyon sonrası geçici lokal reaksiyon gözlenebilir. Nadiren alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar bölgesel şişliklerden anafilaksi ve ölüme kadar uzanabilir. Özellikle uzun süreli kullanımlarda, işitme ve denge bozuklukları, böbrek fonksiyonlarında bozulma oluşabilir. Dihidrostreptomisin'in nöromusküler blokaj etkisi nedeniyle kramp ve nefes almada güçlük görülebilir. Yan etki görülmesi halinde tedavi kesilerek görülen yan etkiye göre tedavi yapılması önerilir. Aminoglikozidlerin nöromusküler blokaj etkileri kalsiyum ve neostigmin uygulaması ile kısmen giderilebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer aminoglikozidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Vasküler depresyon riski nedeniyle pentobarbital ve diğer inhalasyon anesteziğiyle kullanılmamalıdır.

Nöromusküler blokajı artıran diğer ürünlerle birlikte (kas gevşeticiler) ve ototoksikite riskini artırması nedeniyle diüretiklerle birlikte kullanılmaz.

Heparin, kalsiyum glukonat, riboflavin ve triamkinolon ile birlikte uygulanmaz. Prokainin etkisini azaltması nedeniyle, sülfonamidlerle birlikte kullanılmaz.

Bu ürün diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER ve ANTİTOD

Dihidrostreptomisin'in aşırı dozda uygulanması, nöromusküler blokaj ve diğer etkiler nedeniyle kaslarda zayıflık ve solunum arrestine neden olabilir. Prokain zehirlenmesi, çırpınma, hipotansiyon ve psikoza neden olabilir. Atlar prokainin yan etkilerine en etkili türdür. Kaslarda zayıflık, inkoordinasyon, dengesizlik, heyecan, çırpınma gibi diğer sinir sistemi bulguları diğer hayvanlarda görülmüştür.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 64 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 120 saat (10 saım) geçmeden elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Betalaktamlara duyarlı hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Kazara kendinize enjeksiyondan kaçınmak için gerekli önlemleri alınız. Böyle bir durumda derhal tıbbi destek alınız.

Penislin ve sefalosporinler, deriye temas, ağız yolu ile alma, solunum yoluyla alma veya enjeksiyon sonrasında aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonlarına neden olabilir. Penisilinler ile sefalosporinler arasında karşılıklı çapraz reaksiyon söz konusudur. Alerjik reaksiyonlar nadiren çok ciddi olabilir.

1- Duyarlı iseniz veya bu tür ürünlerle temas etmemeniz gerektiği söylenmişse kesinlikle ürünü kullanmayınız.

2-Ürünün uygulanması sırasında maruziyeti engellemek için gerekli önlemleri alınız.

3-Maruziyet sonrası deride kızarıklık gibi belirtiler görürseniz derhal etiket ve prospektüs ile birlikte doktora başvurunuz. Yüz, göz veya dudaklarda şişme veya nefes almada zorluk gibi belirtiler çok daha ciddi belirtilerdir ve çok acil tıbbi müdahale gerektirir.

Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.
Dondurulmamalıdır.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şişelerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.
Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde, Veteriner Hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 12.05.2026

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ.İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul C1 Blok No:2 B/34 Ataşehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Laboratorios Syva, S.A.U

Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57

24010 León-İspanya

DIŞ ETİKET(50 ml, 100 ml and 250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır PENDİSTREPTO Enjeksiyonluk Süspansiyon Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Sığır, koyun ve atlarda kullanılır.

Kombinasyona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

Derin kas içi uygulanır.

Sığır, koyun ve at : pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. **Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.**

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır ve koyun eti için 64 gün, inek sütü için 120 saat(10 saım), insan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şişelerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.

Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde, Veteriner Hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ.İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol Istanbul C1 Blok No:2 B/34 Ataşehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Laboratorios Syva, S.A.U

Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57

24010 León-İspanya

KDV dahil PSF:

İÇ ETİKET(100 ml and 250 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır PENDİSTREPTO Enjeksiyonluk Süspansiyon Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Sığır, koyun ve atlarda kullanılır.

Kombinasyona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

Derin kas içi uygulanır.

Sığır, koyun ve at : pratik olarak her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml uygulanır. Bu doz günlük doz olup, 3 gün boyunca uygulanmalıdır. **Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.**

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sığır ve koyun eti için 64 gün, inek sütü için 120 saat(10 saım), insan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 ° C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şişelerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.

Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner Hekim reçetesi ile eczanelerde, Veteriner Hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ. İZNİ TARİHİ VE NO: 11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ Atasehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Laboratorios Syva, S.A.U
24010 León-İspanya

Seri no:

Üretim tarihi:

Son.kul.tarihi:

İÇ ETİKET(50 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
PENDİSTREPTO
Enjeksiyonluk Süspansiyon
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Beyaz renkli süspansiyonun 1 ml'si; 200.000 IU Benzilpenisilin (prokain), 250 mg Dihidrostreptomisin (sülfat)ve 3.7 mg sodyum formaldehit sülfoksilat dihidrat (Antioksidan) ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Pratik olarak; Sığır, koyun ve atlarda 1 ml/25 kg, kedi ve köpeklerde 0,5 ml/5 kg 'dır.

Sıpir,koyun,at, kedi ve köpeklerde kullanılır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Et için:64 gün

İnek sütü için:120 saat(10 sağım)

İnsan tüketimi amacıyla süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C'nin altında ışıktan korunarak orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü:2 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml. lik polietilen tereftalat (PET) şişelerde karton kutu içinde bromobutil lastik tıpa ve alüminyum kapaklı veya flip off alüminyum kapaklı olarak satışa sunulmuştur.

Tıpa en fazla 50 defa delinmelidir.

T.C.TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZ. İZNİ TARİHİ VE NO:11.04.2005-009/0890

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

SYVA VETERİNER İLAÇLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ Ataşehir-İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Laboratorios Syva, S.A.U

24010 León-İspanya

Seri no:

Üretim tarihi:

Son.kul.tarihi: