

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Ubrostar®

Meme içi Süspansiyon

Veteriner Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Ubrostar meme içi süspansiyon beyaz-soluk beyaz homojen bir süspansiyondur. 5 ml'lik her tüp içeriği şu şekildedir:

Penetamat hidriodid 100,0 mg

Benetamin penisilin 280,0 mg

Framisetin sülfat 100,0 mg

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ubrostar meme içi süspansiyon süt sığırlarında kuru dönemde kullanılmak üzere geliştirilmiş antibakteriyel bir kombinasyondur. Benetamin penisilin, benzilpenisilin N-benzil2feniletilamin tuzu olup, benzilpenisilin uzun süre etkili formülasyonu olarak tasarlanmıştır. Penetamat, hidroliz ile benzilpenisilin ve dietilaminoetanol salan bir ön ilaçtır. Antimikrobiyal aktivite tamamen benzilpenisilinden kaynaklanır. Serbest benzilpenisilin beta laktamaz üreten *Staphylococcus spp.* haricinde başlıca birçok grampozitif patojene karşı etkilidir. Penisilinler, hücre duvarı sentezini inhibe etmek suretiyle, çoğalan mikroorganizmalar üzerinde bakterisit etki gösterir. Antibakteriyel etki zamana bağlıdır. Neomisin B olarak da bilinen framisetin bakterisit etkilidir, aminoglikozid grubundan bir antibiyotiktir. Protein sentezini inhibe ederek ve hücre membranındaki geçirgenliği bozarak bakteri hücresinin ölümüne neden olur. Etki spektrumu birçok gram-negatif ve bazı gram-pozitif bakterileri kapsar. Neomisin, β -laktam antibiyotiklerle kombine edildiğinde özellikle de gram pozitif patojenlere karşı sinerjik etki oluşur. Bu durum, β -laktam antibiyotiklerin neden olduğu bakteriyel hücre duvarı hasarı nedeniyle aminoglikozidlerin bakteri hücrelerine penetrasyonunun kolaylaşması sonucu gerçekleşir. Benzilpenisilin meme içi uygulama sonrasındaki emilimi düşük boyuttadır. Penisilinlerin eliminasyonunda metabolizma düşük öneme sahiptir. Penisilinler özellikle idrarla ve bir miktar da safrayla değişmeden hızla atılırlar. Framisetin memeden düşük oranda emilir. Emilim sonrasında göz ardı edilebilir düzeyde biyotransformasyondan geçer ve idrar ile atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Süt sığırlarında kuruya çıkarken *Staphylococcus aureus*, koagulaz negatif *Stafilokoklar*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae* bakterilerinin neden olduğu mevcut enfeksiyonların tedavisinde ve kuru dönem boyunca ortaya çıkabilecek enfeksiyonların önleminde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Meme içine uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; tedaviden hemen önce meme tamamen sağılır, meme uçları antiseptik mendil ile dezenfekte edilir ve oda sıcaklığındaki Ubrostar meme içi süspansiyon her bir meme lobuna bir tüp şeklinde uygulanır. Uygulamadan sonra meme sağılmamalı ve memeye masaj yapılmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLERİ İÇİN ÖZEL UYARILAR

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. Yalnızca gebe hayvanlarda ve kuru dönemde kullanılır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bilinen bir istenmeyen etkisi yoktur. Ancak genel olarak bu sınıf bileşikler alerjik reaksiyonlara (alerjik cilt reaksiyonları, anafilaksi) yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Olası geçimsizlikler sebebiyle, meme içi kullanılan diğer ilaçlarla kombine edilmemelidir. Fenilbutazon, sülfapirazol ve asetilsalisilik asit benzilpenisilinin atılım süresini uzatır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Pratikte doz aşımı söz konusu değildir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.):

Et için: 8 gün

Süt için: Kuruya çıkarken yapılan uygulamalarda pratik olarak laktasyon başladığında sütte herhangi bir kalıntı riski yoktur. Doğumdan 35 gün ve daha öncesinde uygulanmışsa, doğumdan sonraki 5 gün boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Laktasyondaki sığırlarda kullanılmamalıdır. Ürün bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık durumunda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Ürün bileşimindeki maddelere duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ürünle temastan kaçınmalıdır. Kazara yutulması halinde ürün kutusu veya prospektüsüyle hekime başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C'nin altında saklayınız.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 (iki) yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN

Kullanılmayan ürünler veya boş ambalajlar yerel yönetmelikler doğrultusunda imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 x 5 ml meme içi enjektör ve 20 adet antiseptik mendil ile birlikte sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ

26.12.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO

26.06.2013-014/0073

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş.

Esentepe Mah. Harman 1 Sokak NidaKule Levent No:7-9 Kat:15/16 Şişli - İstanbul

Tel.: 0 212 329 11 00

Faks: 0 212 329 11 01

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Haupt Pharma Latina S.R.L

A Socio Unico Sede Legale S.S. 156. Km 47,600

04100 Borgo San Michele (Latina) - İtalya