

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

WELFLOR %30 Oral Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Beher mL’de:

Etken madde:

Florfenikol 300 mg/mL

N-metil pirolidon... 315 mg/mL

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.’e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Oral Çözelti

Berrak, açık sarı renkli çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Tavuk

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Aşağıda yer alan bakterilerin florfenikole duyarlı suşları tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

E.coli enfeksiyonları, Pasteurella enfeksiyonları, infectious airway inflammation, Staphylococcal enfeksiyonlar: Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, florfenikole duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diğer enfeksiyonlar.

4.3 Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan maddelere duyarlı hayvanlarda kullanılmaz. Florfenikole direnç tespit edilen durumlarda kullanılmaz.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

--

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Bu ürünü, hayvan izolatlarından elde edilen bakterilerde yapılmış duyarlılık testlerine göre kullanınız. Bu mümkün değilse, bölgesel epidemiyolojik verilere göre kullanılmalıdır.

Bu ürünün kullanma talimatından farklı bir şekilde kullanılması florfenikole direnci artırabilir ve bu durum florfenikol ve muhtemelen çapraz direnç nedeniyle diğer antibiyotiklerle yapılan tedavinin etkinliğinde düşüşe neden olabilir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olduğu bilinen kişiler ürünle temas etmemelidir. Kazara ağız yolu ile alınması halinde acilen tıbbi tedavi alınız, ürünün kullanma talimatını doktora gösteriniz. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Yardımcı madde N-metil pirolidon ile tavşanlarda ve sıçanlarda yapılan laboratuvar çalışmaları fetotoksik etkilere dair kanıtlar göstermiştir. Hamile veya hamile olma şüphesi olan kadınlar bu ürünü kullanmamalı ve ürünle temas etmemelidir. Doğurganlık çağındaki uygulayıcılar, ürünü uygularken ürünle teması engelleyecek eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

--

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Yumurtlama döneminde kullanım:

İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmaz.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

İçme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

20 mg florfenikol/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün uygulanır. Pratik doz her 150 kg vücut ağırlığına günde 10 ml ürün kullanılır.

Tedavi sırasında ilaçlı su hayvanların tek içme suyu kaynağı olmalı, ilaçlı su tamamen tüketilene kadar hayvanlar başka bir su kaynağından su ihtiyaçlarını gidermemelidir. Bu mümkün değilse, günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olarak uygulanabilir.

İlaçlı suyun tüketimi yaş, dış ortam veya kümes sıcaklığı veya hastalığın klinik durumuna göre değişebilir. Bu nedenle ilacın katılacağı su miktarı hayvanların tüketebileceği miktarda olmalıdır. Düşük veya fazla doz uygulamadan kaçınmak için hayvanların toplam ağırlığı doğru hesaplanmalıdır.

Bu ürünün içme suyundaki azami çözünürlüğü 1 ml ürün/300 ml su'dur. Bu orandan fazla ürün kullanılması halinde çökme oluşabilir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

--

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Sistemik kullanım için antibakteriyel, florfeikol

ATCvet-kodu: QJ01BA90

5.1 Farmakodinamik özellikler

Florfenikol, bakteriyostatik, sentetik, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakteriyi, bakteri hücresinde protein sentezini inhibe ederek etkiler. Protoplazmada, 70 S ribozomlarına bağlanır ve burada peptidil transferazı inhibe eder. Sonuçta duyarlı bakteriyel ribozomlarda protein sentezinin inhibisyonu gerçekleşir. Florfenikol, bir tiamfenikol türevidir ve içinde hidroksil grubu yerine bir flor atomu vardır. Bu nedenle, kloremfenikole dirençli asetil transferaz üreten bakterilere karşı etkilidir. Laboratuvar çalışmaları, florfenikolün *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp. (özellikle tavuk kolerası etkeni *Pasteurella multocida*), *Haemophilus paragallinarum* (yeni adı *Avibacterium paragallinarum*), *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Streptococcus* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp. gibi birçok patojen mikroorganizmaya karşı etkinliği kanıtlanmıştır.

5.2 Farmakokinetik özellikler:

Tavuklarda, kg vücut ağırlığı başına 30 mg'lık tek bir oral doz 3,20 µg/mL'lik maksimum konsantrasyonun 63,1 dakikada elde edilmesini sağlar. Ürünün biyoyararlanımı, oral uygulamadan sonra %55,3'tür. Tavuklarda, florfenikolün 30 mg/kg'lık (canlı ağırlık) dozda 5 gün uzun süreli olarak oral ve intramüsküler yoldan uygulanmasından sonra, ürün vücutta iyi bir dağılım gösterir. En yüksek düzeyler böbreklerde (4.1 ve 4.7 µg/g), daha sonra akciğerlerde (2.8 ve 2.9 µg/g), kaslarda (2.0 ve 2.4 µg/g), safrada (1.6 ve 2.75 µg/mL) bağırsaklarda (yaklaşık olarak 2.0 µg/g), kalpte (1.7 ve 2.1 µg/g), karaciğerde (1.5 ve 1.8 µg/g) ve dalakta (1.3 ve 1.5 µg/g) gözlenir. Tavuklarda çok az metabolik değişikliğe uğrar. İdrar ve dışkı yolu ile atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

N-metil-2-pirolidon
Monopropilen glikol
Polietilen glikol 300

6.2 Geçimsizlikler

Uyumsuzluk çalışmaları yapılmadığından, bu veteriner tıbbi ürün diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 ay İlaçlı içme suyunun raf ömrü: 24 saat

6.4 Muhafaza şartları

Direkt güneş ışığından koruyunuz. 25°C'nin altında saklayınız. Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

100 mL kutulu; 250 mL, 500 mL, 1 L ve 2,5 L ağzı alüminyum folyo ile kapalı polietilen (HDPE) plastik beyaz şişelerde, kutusuz olarak takdim edilmiştir. Plastik şişeler, beyaz renkli plastik HDPE kapaklarla kapatılmıştır. Tüm ticari takdim şekilleri piyasada bulunmayabilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

HASAT Veteriner Ecza Deposu ve Yem Katkıları San.Tic.Ltd.Şti.
Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:5 Üsküdar /İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZİN NUMARASI

032/0069

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

08.01.2026

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
WELFLOR %30
Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

WELFLOR %30 Oral Çözelti, berrak açık sarı renkli bir çözelti olup, 1 ml’de etkin madde olarak 300 mg/ml florfenikol ve 315 mg/ml N-metilprolidon içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler:

Florfenikol, bakteriyostatik, sentetik, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Birçok Gram pozitif ve Gram negatif bakteriyi, bakteri hücrelerinde protein sentezini inhibe ederek etkiler. Protoplazmada, 70 S ribozomlarına bağlanır ve burada peptidil transferazı inhibe eder. Sonuçta duyarlı bakteriyel ribozomlarda protein sentezinin inhibisyonu gerçekleşir. Florfenikol, bir tiamfenikol türevidir ve içinde hidroksil grubu yerine bir flor atomu vardır. Bu nedenle, kloremfenikole dirençli asetil transferaz üreten bakterilere karşı etkilidir. Laboratuvar çalışmaları, florfenikolün Escherichia coli, Pasteurella spp. (özellikle tavuk kolerası etkeni Pasteurella multocida), Haemophilus paragallinarum (yeni adı Avibacterium paragallinarum), Ornithobacterium rhinotracheale, Staphylococcus spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp. gibi birçok patojen mikroorganizmaya karşı etkinliği kanıtlanmıştır.

Farmakokinetik özellikler:

Tavuklarda, kg vücut ağırlığı başına 30 mg’lık tek bir oral doz 3,20 µg/mL’lik maksimum konsantrasyonun 63,1 dakikada elde edilmesini sağlar. Ürünün biyoyararlanımı, oral uygulamadan sonra %55,3’tür. Tavuklarda, florfenikolün 30 mg/kg’lık (canlı ağırlık) dozda 5 gün uzun süreli olarak oral ve intramüsküler yoldan uygulanmasından sonra, ürün vücutta iyi bir dağılım gösterir. En yüksek düzeyler böbreklerde (4,1 ve 4,7 µg/g), daha sonra akciğerlerde (2,8 ve 2,9 µg/g), kaslarda (2,0 ve 2,4 µg/g), safrada (1,6 ve 2,75 µg/mL)

bağırsaklarda (yaklaşık olarak 2.0 µg/g), kalpte (1.7 ve 2.1 µg/g), karaciğerde (1.5 ve 1.8 µg/g) ve dalakta (1.3 ve 1.5 µg/g) gözlenir. Tavuklarda çok az metabolik değişikliğe uğrar. İdrar ve dışkı yolu ile atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Tavuklarda, aşağıda yer alan bakterilerin florfenikole duyarlı suşları tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

E.coli enfeksiyonları, Pasteurella enfeksiyonları, infectious airway inflammation, Staphylococcal enfeksiyonlar: Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, florfenikole duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diğer enfeksiyonlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

İçme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

20 mg florfenikol/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün uygulanır. Pratik doz her 150 kg vücut ağırlığına günde 10 ml ürün kullanılır.

Tedavi sırasında ilaçlı su hayvanların tek içme suyu kaynağı olmalı, ilaçlı su tamamen tüketilene kadar hayvanlar başka bir su kaynağından su ihtiyaçlarını gidermemelidir. Bu mümkün değilse, günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olarak uygulanabilir.

İlaçlı suyun tüketimi yaş, dış ortam veya kümes sıcaklığı veya hastalığın klinik durumuna göre değişebilir. Bu nedenle ilacın katılacağı su miktarı hayvanların tüketebileceği miktarda olmalıdır. Düşük veya fazla doz uygulamadan kaçınmak için hayvanların toplam ağırlığı doğru hesaplanmalıdır.

Bu ürünün içme suyundaki azami çözünürlüğü 1 ml ürün/300 ml su'dur. Bu orandan fazla ürün kullanılması halinde çökme oluşabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Bu ürünü, hayvan izolatlarından elde edilen bakterilerde yapılmış duyarlılık testlerine göre kullanınız. Bu mümkün değilse, bölgesel epidemiyolojik verilere göre kullanılmalıdır.

Bu ürünün kullanma talimatından farklı bir şekilde kullanılması florfenikole direnci arttırabilir ve bu durum florfenikol ve muhtemelen çapraz direnç nedeniyle diğer antibiyotiklerle yapılan tedavinin etkinliğinde düşüşe neden olabilir.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım: İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmaz.

İSTENMEYEN ETKİLER

Kümes hayvanlarında bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Uyumsuzluk çalışmaları yapılmadığından, bu veteriner tıbbi ürün diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında spesifik bir antidot yoktur, destekleyici tedavi yapılmalıdır. Veteriner hekime başvurulmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmaz.

KONTRAENDİKASYONLAR

Bileşiminde bulunan maddelere duyarlı hayvanlarda kullanılmaz. Florfenikole direnç tespit edilen durumlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Bileşiminde bulunan maddelere duyarlı olduğu bilinen kişiler ürünle temas etmemelidir. Kazara ağız yolu ile alınması halinde acilen tıbbi tedavi alınız, ürünün kullanma talimatını doktora gösteriniz. Kullanımdan sonra ellerinizi yıkayınız.

Yardımcı madde N-metil piroolidon ile tavşanlarda ve sığırcılarda yapılan laboratuvar çalışmaları fetotoksik etkilere dair kanıtlar göstermiştir. Hamile veya hamile olma şüphesi olan kadınlar bu ürünü kullanmamalı ve ürünle temas etmemelidir. Doğurganlık çağındaki uygulayıcılar, ürünü uygularken ürünle teması engelleyecek eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 ay İlaçlı içme suyunun raf ömrü: 24 saat

Direkt güneş ışığından koruyunuz. 25°C'nin altında saklayınız. Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 mL kutulu; 250 mL, 500 mL, 1 L ve 2,5 L ağızlı alüminyum folyo ile kapalı polietilen (HDPE) plastik beyaz şişelerde, kutusuz olarak takdim edilmiştir. Plastik şişeler, beyaz renkli plastik HDPE kapaklarla kapatılmıştır. Tüm ticari takdim şekilleri piyasada bulunmayabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczaneler satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 08.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO

08.01.2026-032/0069

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

HASAT Veteriner Ecza Deposu ve Yem Katkıları San.Tic.Ltd.Şti. Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:5 Üsküdar /İSTANBUL Tel: +90 0216 318 00 88 Faks: +90 216 318 00 80
E-mail: info@hasatvet.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

MİSTAV İlaç San ve Tic. A.Ş.

ASO 2. OSB Alıcı Mah. 2010 Sk. No:15 Temelli- Sincan/Ankara-Türkiye

Tel: +90 312 397 85 20, Faks: +90 312 397 85 22 E-mail:

info@mistav.com

SERİ NO: ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: KDV DAHİL P.S.F.:

İç - Dış Etiket (100 mL)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
WELFLOR %30
Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

WELFLOR %30 Oral Çözelti, berrak açık sarı renkli bir çözelti olup, 1 ml’de etkin madde olarak 300 mg/ml florfenikol içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Tavuklarda, aşağıda yer alan bakterilerin florfenikole duyarlı suşları tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

E.coli enfeksiyonları, Pasteurella enfeksiyonları, infectious airway inflammation, Staphylococcal enfeksiyonlar: Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, florfenikole duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diğer enfeksiyonlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

İçme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

20 mg florfenikol/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün uygulanır. Pratik doz her 150 kg vücut ağırlığına günde 10 ml ürün kullanılır.

Tedavi sırasında ilaçlı su hayvanların tek içme suyu kaynağı olmalı, ilaçlı su tamamen tüketilene kadar hayvanlar başka bir su kaynağından su ihtiyaçlarını gidermemelidir. Bu mümkün değilse, günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olarak uygulanabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 ay İlaçlı içme suyunun raf ömrü: 24 saat

Direkt güneş ışığından koruyunuz. 25°C’nin altında saklayınız. Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 mL kutulu; 250 mL, 500 mL, 1 L ve 2,5 L ağız alüminyum folyo ile kapalı polietilen (HDPE) plastik beyaz şişelerde, kutusuz olarak takdim edilmiştir. Plastik şişeler, beyaz renkli plastik HDPE kapaklarla kapatılmıştır. Tüm ticari takdim şekilleri piyasada bulunmayabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenahanelerinde ve eczaneler satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO

08.01.2026-032/0069

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

HASAT Veteriner Ecza Deposu ve Yem Katkıları San.Tic.Ltd.Şti. Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:5 Üsküdar /İSTANBUL Tel: +90 0216 318 00 88 Faks: +90 216 318 00 80
E-mail: info@hasatvet.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

MİSTAV İlaç San ve Tic. A.Ş.
ASO 2. OSB Alıcı Mah. 2010 Sk. No:15 Temelli- Sincan/Ankara-Türkiye
Tel: +90 312 397 85 20, Faks: +90 312 397 85 22 E-mail:
info@mistav.com

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

KDV DAHİL P.S.F.: (Sadece dış etikette bulunur)

İç+Dış Etiket (250 ml, 500 ml, 1 L ve 2,5 L)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

WELFLOR %30

Oral Çözelti

Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

WELFLOR %30 Oral Çözelti, berrak açık sarı renkli bir çözelti olup, 1 ml'de etkin madde olarak 300 mg/ml florfenikol içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Tavuklarda, aşağıda yer alan bakterilerin florfenikole duyarlı suşları tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

E.coli enfeksiyonları, Pasteurella enfeksiyonları, infectious airway inflammation, Staphylococcal enfeksiyonlar: Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, florfenikole duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu diğer enfeksiyonlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

İçme suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

20 mg florfenikol/kg vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün uygulanır. Pratik doz her 150 kg vücut ağırlığına günde 10 ml ürün kullanılır.

Tedavi sırasında ilaçlı su hayvanların tek içme suyu kaynağı olmalı, ilaçlı su tamamen tüketilene kadar hayvanlar başka bir su kaynağından su ihtiyaçlarını gidermemelidir. Bu mümkün değilse, günlük doz ikiye bölünerek sabah ve akşam olarak uygulanabilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Prospektüs ürün kapağının altında bulunur.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 3 ay İlaçlı içme suyunun raf ömrü: 24 saat

Direkt güneş ışığından koruyunuz. 25°C'nin altında saklayınız. Buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

100 mL kutulu; 250 mL, 500 mL, 1 L ve 2,5 L ağızlı alüminyum folyo ile kapalı polietilen (HDPE) plastik beyaz şişelerde, kutusuz olarak takdim edilmiştir. Plastik şişeler, beyaz renkli plastik HDPE kapaklarla kapatılmıştır. Tüm ticari takdim şekilleri piyasada bulunmayabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenahanelerinde ve eczaneler satılır (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO

08.01.2026-032/0069

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

HASAT Veteriner Ecza Deposu ve Yem Katkıları San.Tic.Ltd.Şti. Burhaniye Mah. Gürgen Sk. No:5 Üsküdar /İSTANBUL

Tel: +90 0216 318 00 88 Faks: +90 216 318 00 80

E-mail: info@hasatvet.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

MİSTAV İlaç San ve Tic. A.Ş.

ASO 2. OSB Alıcı Mah. 2010 Sk. No:15 Temelli- Sincan/Ankara-Türkiye

Tel: +90 312 397 85 20, Faks: +90 312 397 85 22 E-mail:

info@mistav.com

SERİ NO: ÜRETİM TARİHİ:**SON KULLANMA TARİHİ: KDV DAHİL P.S.F.:**