

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Wormkill Oral Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her ml:

Aktif madde:

Prazikuantel.....50.0 mg

Pirantel pamoate.....144.0 mg

Febantel.....150.0 mg

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

açık sarı renkli, ortasından çentikli oral tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Köpek

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Köpeklerin yuvarlak kurtlarından (nematod) ve şeritlerinden (sestod), aşağıda isimleri yazılı her türlü parazit nedeniyle oluşan enfeksiyonlarının mücadele ve kontrolünde kullanılır.

Askaritler: *Toxocara canis*, *Toxocaris leonina* (erginleri ve ergin olmaya yakın türleri)

Kancalı Kurtlar: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (erginleri)

Kamçılı kurtlar: *Trichuris vulpis* (erginleri)

Şeritler: : *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.*,

4.3 Kontrendikasyonlar

2 kg'ın altındaki köpeklerde ve 4 haftalıktan küçük köpek yavrularında kullanılmamalıdır.

Ayrıca gebeliğin ilk 2/3'lük döneminde kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yeni doğum yapan köpeklerde *Toxacara*'ların kontrolü için, doğumdan iki hafta sonra başlamak üzere yavruları süttten kesilene kadar, her iki haftada bir tedavi edilmelidir. Köpek yavruları doğumun dördüncü haftasından itibaren on ikinci haftaya kadar, her iki haftada bir tedavi edilmelidir. Daha sonra ise tedavi her 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. Bu tedavi dişi köpeklerde ve yavrularda uygulanabilir.

İlaçlama; *D. caninum* enfeksiyonu olan hayvanlarda iki hafta aralıklarla, *Echinococcus granulosus* bulunan hayvanlarda 45-60 gün aralıkla, *E. multiocularis* tespit edilen hayvanlarda ise parazitin hayat siklusunu kırmak için 30-45 gün aralıklarla ürünün kullanımı sağlanmalıdır. Ergin köpeklerin rutin parazitler tedavileri her üç ayda bir yapılmalıdır. Şayet yoğun bir yuvarlak kurt enfeksiyonu varsa tedavi 14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Sestod enfeksiyonlarının başarısı için dış parazit mücadelesi de yapılmalıdır. Ara konakçı kontrolü sağlanmadığı durumlarda şerit tedavisi tekrar edilmelidir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

-

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Birleşik Krallık ve İrlanda'da Echinococcus multilocularis enfestasyonlarının önlenmesi için ihtiyati tedbir olarak, ülkeye giren tüm köpek ve kedilerin praziquantel ile tedavi edilmesi tavsiye edilmektedir. Pireler yaygın bir tür tenya türü olan Dipylidium caninum için ara konak olarak görev yaparlar. Pire, fare gibi ara konakların kontrolü yapılmadığı sürece, tenya istilasının tekrarlanması kaçınılmazdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Köpeklerde yeni enfestasyonlar ve reinfestasyon riskini en aza indirmek için dışkıları toplanmalı ve tedaviden 24 saat sonrasına kadar uygun bir şekilde atılmalıdır.

Hijyen amacıyla, ürünü doğrudan bir köpeğe uygulayan veya köpeğin yemeğine ekleyen kişilerin daha sonra ellerini yıkaması gerekir. Kaza sonucu yutulması halinde, derhal tıbbi yardım istenmeli ve ürünün etiket ve prospektüsü hekime gösterilmelidir.

Ürün Praziquantel içerdiğinden, Echinococcus spp.'ye karşı etkilidir. Ekinokok invazyonu insanlar için zoonoz bir hastalıktır, bu nedenle risk oluşturmaktadır. Ekinokok invazyonu, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) için bildirilebilir bir hastalık olduğundan, tedavi ve izlem konularında yetkili makamlara bilgi verilmeli ve kişilerin korunmasıyla ilgili özel talimatlar konusunda yetkili makamlardan bilgi alınmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Pirantel tuzlarının hayvanlara önerilen dozlarda herhangi bir istenmeyen etkisi bulunmamaktadır. Praziquantel'in köpeklerde kullanılmasında nadiren hafif derecede kusma, iştahsızlık ve ishal vakaları görülmüştür. Pirantel pamoat'ın ve Febantel'in birlikte tekrarlanan kullanımlarında, doz aşımı durumunda dahi köpeklerde çok iyi tolere edildiği ve istenmeyen yan etkiler oluşturmadığı görülmektedir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Febantel, gebe hayvanlarda, gebeliğin ilk 2/3'lük dönemi içinde teratojenik etki göstermektedir. Bu nedenle gebe köpeklerde kullanılırken doza ve gebelik dönemine dikkat edilmelidir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Dexamethasone uygulaması Praziquantel'in serum konsantrasyonunu azaltabilir. Piperazin, organofosfor bileşikler, Levamizol, Dietilkarbamazin sitrat ve Morantel ile beraber kullanılmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Önerilen dozlar: Praziquantel farmakolojik dozu 5 mg / kg canlı ağırlık,

Pirantel farmakolojik dozu: 14,4 mg/kg,

Febantel 15 mg/kg canlı ağırlıktır.

Bir tablet 10 kg vücut ağırlığı için kullanılır.

Küçük köpekler için:

2-5 kg vücut ağırlığı için 1/2 tablet

6-10 kg vücut ağırlığı için 1 tablet

Orta büyüklükteki köpekler için:

11-15 kg vücut ağırlığı için 1 ½ tablet

16-20 kg vücut ağırlığı için 2 tablet
21-25 kg vücut ağırlığı için 2 ½ tablet
26-30 kg vücut ağırlığı için 3 tablet

Büyük köpekler için:

31-35 kg vücut ağırlığı için 3 ½ tablet
36-40 kg vücut ağırlığı için 4 tablet

Tabletler köpeklerde doğrudan verilebileceği gibi, gıda içine koyularak da verilebilir.

Köpeklerde ilaç verilmeden önce veya verildikten sonra herhangi bir gıda kısıtlamasına gerek yoktur. Uygulanacak doz bir seferde verilmelidir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

WORMKILL Oral Tablet 'in içerdiği üç etken maddenin de, toksisiteleri düşük olarak sınıflandırılmıştır. Ürün 6-10 kat dozda uygulanmış ve herhangi bir toksikolojik belirti görülmemiştir. Nadiren, diyare, sancı ve kusma görülebilir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapotik grup: Antihelmintik

ATC-Vet Kodu: QP52AF30

5.1 Farmakodinamik özellikler

Prazikuantel İzokinolin bileşiklerinden geniş spekturumlu antisestodal (şeritlere karşı) bir ilaçtır. Etkisini; şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engelleyip parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Prazikuantel ile şeritin (sestod) temasından çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunu sonucunda bağırsağa gömülü çengeller serbest kalır ve bağırsakla parazitin teması kesilir. İlaç şeritlerin larvalarına da etki eder.

Pirantel PamoatTetrahidroprimidin türevi ürünlerdendir ve yuvarlak kurtların (nematodların) mücadelesinde kullanılır. Parazitlerin sinirsel iletişimlerini, nöromusküler reseptörlerine bağlanarak bozar ve böylece vücut dışına atılmalarını sağlar.

Febantel Bir benzimidazol grubu anthelmintiktir ve invivo olarak fenbendazole metabolize olan ön bir ilaçtır. Mide-bağırsakların yuvarlak solucanları, akciğer solucanları ve tenyaların tedavisi ve kontrolü için oral olarak uygulanır. Febantel oral alımından sonra fenbendazol ve oksfendazole metabolize edilir ve metabolitlerinin daha etkili olduğu bilinmektedir. Antihelmintik etkisi helmintlerde tubulin polimerizasyonunu inhibe etmesi ile ortaya çıkar. Helmintin normal yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmesi mikrotubil formasyonunun devamı ile mümkündür. Febantel alımı ile helmintin özellikle glukoz alımı etkilenir ve takiben hücre ATP'si tükenir. Böylece enerji rezervlerinin tükenmesi sonucu parazit ölür. Febantel'in aktif metabolitleri dışkı yoluyla atılır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Prazikuantel'in biyolojik yarılanma ömrü 3 saat olup %77 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve %80'ni ilk 24 saatte vücuttan atılır. Metabolitleri köpekte %66 dolayında idrar ile atılmaktadır. Prazikuantel uygulandıktan sonra %75 ila %100 oranında hızla emilir ve 30 dakika sonra maksimum serum konsantrasyonuna ulaşır ve vücut dokularına dağılarak, karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

Pirantel pamoat uygulamadan 4-6 saat sonra Pirantel miktarı plazmada 0,6 µm/ml'ye ulaşmakta, 96 saat sonra bileşik büyük oranda vücuttan metabolize olarak %15 dolayında idrar ile, %85 diğer kısmı ise dışkı ile atılmaktadır.

Febantel Febantel, oral yoldan verildikten ve absorpsiyon sonrasında fenbendazol ve oksfendazole metabolize edilerek antelmintik etki yaratan bir ön ilaçtır. Aktif metabolitler dışkı yoluyla atılır.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz Tozu (Avisel)-101

Nişasta

Laktoz monohidrat qsp.

Sodyum Lauril Sülfat

Polivinilpirolidone (PVP) K-30

Magnezyum Stearat

Aerosil 200

Deiyonize Su

6.2 Geçimsizlikler

Bilinen bir etkileşim yoktur.

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 36 ay

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 7 gün

6.4 Muhafaza şartları

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C'nin altında saklanmalıdır. Güneş ışığından koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Karton kutu içinde; 50 tabletlik (5x10) blister ambalajlarda ve 50x1 saşe şeklinde satışa sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ : IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 027/0075

9. PAZARLAMA İZNİNİN (İLK VERİLME)TARİHİ : 08.09.2017

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

04.03.2026

Prospektüs (5x10 blister, 50x1 saşe)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
WORMKILL
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

WORMKILL Oral Tablet, açık sarı renkli, ortasından çentikli tablet şeklinde olup her tablet; 50 mg Praziquantel, 144 mg Pirantel pamoat, 150 mg Febantel ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

WORMKILL Oral Tablet köpekler için hazırlanmış, üç aktif maddenin dengeli bir şekilde bir araya gelmesinden oluşmuş geniş spektrumlu bir antihelmintiktir.

Praziquantel izokinolin bileşiklerinden geniş spektrumlu antisestodal (şeritlere karşı) bir ilaçtır. Etkisini; şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engelleyip parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle gösterir. Praziquantel ile şeritin (sestod) temasından çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunun sonucunda bağırsağa gömülü çengeller serbest kalır ve bağırsakla parazitin teması kesilir. İlaç şeritlerin larvalarına da etki eder. Praziquantel'in biyolojik yarılanma ömrü 3 saat olup %77 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve %80'ni ilk 24 saatte vücuttan atılır Metabolitleri köpekte %66 dolayında idrar ile atılmaktadır. Praziquantel uygulandıktan sonra %75 ila %100 oranında hızla emilir ve 30 dakika sonra maksimum serum konsantrasyonuna ulaşır ve vücut dokularına dağılarak, karaciğerde biyotransformasyona uğrar.

Pirantel pamoat tetrahidroprimidin türevi ürünlerdendir ve yuvarlak kurtların (nematodların) mücadelesinde kullanılır. Parazitlerin sinirsel iletişimlerini, nöromusküler reseptörlerine bağlanarak bozar ve böylece vücut dışına atılmalarını sağlar. Çok yavaş çözülür. Uygulamadan 4-6 saat sonra Pirantel miktarı plazmada 0,6 µm/ml'ye ulaşmakta, 96 saat sonra bileşik büyük oranda metabolize olarak %15 dolayında idrar ile, %85 dışkı ile atılmaktadır.

Febantel bir benzimidazol grubu anthelmintiktir ve invivo olarak fenbendazole metabolize olan ön bir ilaçtır. Mide-bağırsakların yuvarlak solucanları, akciğer solucanları ve tenyaların tedavisi ve kontrolü için oral olarak uygulanır. Febantel oral alımından sonra fenbendazol ve oksfendazole metabolize edilir ve metabolitlerinin daha etkili olduğu bilinmektedir. Antihelmintik etkisi helmintlerde tubulin polimerizasyonunu inhibe etmesi ile ortaya çıkar. Helmintin normal yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmesi mikrotubil formasyonunun devamı ile mümkündür. Febantel alımı ile helmintin özellikle glukoz alımı etkilenir ve takiben hücre ATP'si tükenir. Böylece enerji rezervlerinin tükenmesi sonucu parazit ölür. Febantel'in aktif metabolitleri dışkı yoluyla atılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

WORMKILL Oral Tablet; köpeklerin aşağıda isimleri yazılı nematod ve sestod türlerinin neden olduğu parazitler invazyonların mücadelesi ve kontrolünde kullanılır.

Askaritler: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

(erginleri ve ergin olmaya yakın türleri)

Kancalı Kurtlar: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (erginleri)

Kamçılı kurtlar: *Trichuris vulpis* (erginleri)

Şeritler: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia sp.*,

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Köpekler için farmakolojik doz:Praziquantel 5 mg/kg, Pirantel pamoat 14,4mg/kg vücut ağırlığı Febantel; 15mg/kg canlı ağırlıktır.

Pratik doz köpek için, her 10 kg vücut ağırlığı başına 1 tablet dozundadır.

Hayvanların ağırlıklarına göre tabletler bölünerek de verilebilir.

Küçük köpekler için:

2-5 kg vücut ağırlığı için 1/2 tablet

6-10 kg vücut ağırlığı için 1 tablet

Orta büyüklükteki köpekler için:

11-15 kg vücut ağırlığı için 1 ½ tablet

16-20 kg vücut ağırlığı için 2 tablet

21-25 kg vücut ağırlığı için 2 ½ tablet

26-30 kg vücut ağırlığı için 3 tablet

Büyük köpekler için:

31-35 kg vücut ağırlığı için 3 ½ tablet

36-40 kg vücut ağırlığı için 4 tablet

Tabletler köpeklere doğrudan verilebileceği gibi, gıda içine koyularak da verilebilir. Köpeklerde ilaç verilmeden önce veya verildikten sonra herhangi bir gıda kısıtlamasına gerek yoktur. Uygulanacak doz bir seferde verilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Yeni doğum yapan köpeklerde *Toxacara*'ların kontrolü için, doğumdan iki hafta sonra başlamak üzere yavruları süttten kesilene kadar, her iki haftada bir tedavi edilmelidir. Köpek yavruları doğumun dördüncü haftasından itibaren on ikinci haftaya kadar, her iki haftada bir tedavi edilmelidir. Daha sonra ise tedavi her 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. Bu tedavi dışı köpeklerde ve yavrularda uygulanabilir.

İlaçlama; *D. caninum* enfeksiyonu olan hayvanlarda iki hafta aralıklarla, *Echinococcus granulosus* bulunan hayvanlarda 45-60 gün aralıkla, *E. multiocularis* tespit edilen hayvanlarda ise parazitin hayat siklusunu kırmak için 30-45 gün aralıklarla ürünün kullanımı sağlanmalıdır.

Ergin köpeklerin rutin parazitler tedavileri her üç ayda bir yapılmalıdır. Şayet yoğun bir yuvarlak kurt enfeksiyonu varsa tedavi 14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Sestod enfeksiyonlarının başarısı için dış parazit mücadelesi de yapılmalıdır. Ara konakçı kontrolü sağlanmadığı durumlarda şerit tedavisi tekrar edilmelidir.

Gebelikte Kullanım: Febantel, gebe hayvanlarda, gebeliğin ilk 2/3'lük dönemi içinde teratojenik etki göstermektedir. Bu nedenle gebe köpeklerde kullanılırken doza ve gebelik dönemine dikkat edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Pirantel tuzlarının hayvanlara önerilen dozlarda herhangi bir istenmeyen etkisi bulunmamaktadır. Praziquantel'in köpeklerde kullanılmasında nadiren hafif derecede kusma, iştahsızlık ve ishal vakaları görülmüştür. Pirantel pamoat'ın ve Febantel'in birlikte tekrarlanan kullanımlarında, doz aşımı durumunda dahi köpeklerde çok iyi tolere edildiği ve istenmeyen yan etkiler oluşturmadığı görülmektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Dexamethasone uygulaması Praziquantel'in serum konsantrasyonunu azaltabilir. Piperazin, organofosfor bileşikleri, Levamizol, Dietilkarbamazin sitrat ve Morantel ile beraber kullanılmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

WORMKILL Oral Tablet 'in içerdiği üç etken maddenin de, toksisiteleri düşük olarak sınıflandırılmıştır. Ürün 6-10 kat dozda uygulanmış ve herhangi bir toksikolojik belirti görülmemiştir. Nadiren, diyare, sancı ve kusma görülebilir.

KONTRENDİKASYONLAR

2 kg'ın altındaki köpeklerde ve 4 haftalıktan küçük köpek yavrularında kullanılmamalıdır. Ayrıca gebeliğin ilk 2/3'lük döneminde kullanılmamalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Köpeklerde yeni enfestasyonlar ve reinfestasyon riskini en aza indirmek için dışkılar toplanmalı ve tedaviden 24 saat sonrasına kadar uygun bir şekilde atılmalıdır.

Hijyen amacıyla, ürünü doğrudan bir köpeğe uygulayan veya köpeğin yemeğine ekleyen kişilerin daha sonra ellerini yıkaması gerekir. Kaza sonucu yutulması halinde, derhal tıbbi yardım istenmeli ve ürünün etiket ve prospektüsü hekime gösterilmelidir.

Ürün Praziquantel içerdiğinden, Echinococcus spp.'ye karşı etkilidir. Ekinokok invazyonu insanlar için zoonoz bir hastalıktır, bu nedenle risk oluşturmaktadır. Ekinokok invazyonu, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) için bildirilebilir bir hastalık olduğundan, tedavi ve izlem konularında yetkili makamlara bilgi verilmeli ve kişilerin korunmasıyla ilgili özel talimatlar konusunda yetkili makamlardan bilgi alınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C nin altında ve kuru yerde saklamak şartıyla ürünün raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Yarım tabletin raf ömrü, kendi ambalajı içinde saklanmak üzere 7 gündür.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış ürünler veya atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz ve gıda maddelerinden uzak tutunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde; 50 tabletlik (5x10) blister ambalajlarda ve 50x1 saşe şeklinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenahanelerinde ve eczanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 04.03.2026

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO :
08.09.2017-027/0075

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş Tepeören
İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Arion İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (ITOSB) 12. Cadde
No: 8 34959 Tepeören-Tuzla İstanbul

İç Ambalaj Etiketi (5x10 blister, 50x1 saşe)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
WORMKILL
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

Praziquantel 50 mg, Pirantel pamoat 144 mg, Febantel 150 mg
IPM İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

SERİ NO: **SON KULLANMA TARİHİ:** **ÜRETİM TARİHİ:**

Dış Ambalaj Etiketi (5x10 blister, 50x1 saşe)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
WORMKILL
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Ürün açık sarı renkli, ortasından çentikli tablet şeklinde olup her tablet; 50 mg Praziquantel, 144 mg Pirantel pamoat, 150 mg Febantel ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Köpeklerde nematod ve sestod türlerinin neden olduğu paraziter invazyonların mücadele ve kontrolünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Köpekler için farmakolojik doz:

Praziquantel 5 mg/kg vücut ağırlığı için,

Pirantel pamoat 14,4mg/kg vücut ağırlığı

Febantel; 15mg/kg vücut ağırlığı için.

Pratik doz köpek için, her 10 kg vücut ağırlığı başına 1 tablet dozundadır.

Hayvanların ağırlıklarına göre tabletler bölünerek de verilebilir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz ve gıda maddelerinden uzak tutunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25°C nin altında ve kuru yerde saklanmalıdır. Yarım tabletin raf ömrü kendi ambalajı içinde saklanmak üzere 7 gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içinde; 50 tabletlik (5x10) blister ambalajlarda ve 50x1 saşe şeklinde satışa sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerinde satılır (VHR).

T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO :

08.09.2017-027/0075

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

IPM İlaç San. ve Tic. A.Ş Tepeören İTOSB Mah. 3. Cadde No:7 TUZLA/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:

Arion İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi (İTOSB) 12. Cadde
No: 8 34959 Tepeören-Tuzla İstanbul

SERİ NO:**SON KULLANMA TARİHİ:****ÜRETİM TARİHİ:****PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):**

