

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Zeel Enjeksiyonluk Çözelti

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 5 ml'lik 1 ampulde:

Aktif maddeler:

Cartilago suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Funiculus umbilicalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Embryo totalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Placenta totalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Solanum dulcamara dilüsyon	D 3	25 mg
Symphytum officinale dilüsyon	D 6	25 mg
Nadidum dilüsyon	D 8 (HAB, talimat 5a)	5 mg
Coenzym A dilüsyon	D 8 (HAB, talimat 5a)	5 mg
Sanguinaria canadensis dilüsyon	D 4	7,5 mg
Arnica montana dilüsyon	D 3	50 mg
Sulfur dilüsyon	D 6	9 mg
Natrium diethyloxalaceticum dilüsyon	D 8 aköz (HAB, talimat 8b)	5 mg
Acidum thiocticum dilüsyon	D 8 aköz (HAB, talimat 8b)	5 mg
Rhus toxicodendron dilüsyon	D 2	25 mg

1'den 11'e kadar olan aktif maddeler HAB, talimat 40 a'ya göre son 2 adımda birlikte potentize edilir.

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Renksiz, berrak steril enjeksiyonluk çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür

At, sığır, eşek, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi, küçük evcil hayvanlarda (örn. küçük kemirgenler, tavşanlar, kafes kuşları) kullanılabilir.

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; kronik eklem hastalığı veya dejenerasyonla ilişkili olanlar, örneğin kronik eklem aşınması ve yıpranması (artroz), kalça eklemi malformasyonu (kalça displazisi), spavin, naviküler hastalık ve kemikli omurlar arası köprü oluşumu (spondiloz) durumlarında kullanılır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bilinmemektedir.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yoktur.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Bu ilaç sadece Veteriner Hekimler veya gerekli enjeksiyon tekniğini iyi bilen eğitimli kimseler tarafından yapılmalıdır.

Bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Zeel Enjeksiyonluk Çözelti özellikle dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

4.6. İstenmeyen etkiler (Sıklık ve şiddet)

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Not: Homeopatik ilaçla tedavi sırasında, mevcut şikayetler geçici olarak artabilir (İlk etki).

Bu durumda söz konusu ilacın kullanılmasına ara veriniz ve Veteriner Hekime danışınız.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik, laktasyon veya yumurtlama dönemleri için belirlenmemiştir.

Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu

Deri altı yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır (500 kg üzeri):	10 ml
At, sığır, eşek (500 kg'a kadar):	5 ml
Domuz:	3 ml-5 ml
Koyun, keçi:	3 ml-4 ml
Büyük köpek (25 kg üzeri):	3 ml-4 ml
Orta boy köpek (15 kg-25 kg):	2 ml
Küçük köpek (15 kg'a kadar), kediler:	1 ml-2 ml
Kemirgenler, süs kuşları (0,5 kg üzeri):	0,5 ml
Kemirgenler, süs kuşları (0,5 kg'a kadar):	0,05 ml-0,5 ml

Gerekli durumlarda:

Eğer gerekiyorsa, vakanın şiddetine göre, belirtilen dozaj 12 saat sonra tekrar edilir. Eğer hastalığın nüksetme eğilimi varsa veya kronik hastalıklardaki uzun süreli tedavilerde tek seferlik dozaj hasta hayvana 4 günlük aralıklarla verilebilir.

Söz konusu semptomların tekrar görülmemesi durumunda ürünün kullanımına son verilmelidir.

Şişeyi (ampulü) açmak için talimatlar



Dikkatli tutunuz. Açılış talimatlarını dikkatlice takip ediniz. Cam ampulü kesmeyiniz. Ampul baş kısmını yukarı doğru tutunuz ve baş kısmında çözeltinin kalmaması için sallayınız/vurunuz. Ardından, renkli noktaya basınç uygulayarak ampul baş kısmını kırarak ayırınız. Kırılan kısım atılmalıdır.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

Bilinmemektedir.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (Sıfır gün olanlar da dahil)

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Kas-iskelet sistemi bozuklukları için diğer ilaçlar

ATCvet kodu: QM09AX

5.1. Farmakodinamik özellikler

Uygulanabilir değildir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Uygulanabilir değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su

Sodyum klorür

6.2. Geçimsizlikler

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız. Açılmış olan ampulleri kullanmayınız.

Son kullanım tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

6.4. Muhafaza şartları

30° C'nin altında muhafaza edilmelidir.

Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

5 ml'lik hidrolitik tip I renksiz OPC cam ampullere doldurulur. Ampuller yuvası olan karton kutulara yerleştirilir.

Ambalaj büyüklüğü: 5x5 ml, 50x5 ml

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI: 016/0027**9. PAZARLAMA İZNİ (İLK VERİLME) TARİHİ: 27.06.2025-016/0027****10. METNİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:-**

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Enjeksiyonluk Çözelti

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

BİLEŞİMİ

Berrak ve renksiz steril enjeksiyonluk çözeltidir.

Her 5 ml'lik 1 ampulde:

Aktif maddeler:

Cartilago suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Funiculus umbilicalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Embryo totalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Placenta totalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Solanum dulcamara dilüsyon	D 3	25 mg
Symphytum officinale dilüsyon	D 6	25 mg
Nadidum dilüsyon	D 8 (HAB, talimat 5a)	5 mg
Coenzym A dilüsyon	D 8 (HAB, talimat 5a)	5 mg
Sanguinaria canadensis dilüsyon	D 4	7,5 mg
Arnica montana dilüsyon	D 3	50 mg
Sulfur dilüsyon	D 6	9 mg
Natrium diethyloxalaceticum dilüsyon	D 8 aköz (HAB, talimat 8b)	5 mg
Acidum thiocticum dilüsyon	D 8 aköz (HAB, talimat 8b)	5 mg
Rhus toxicodendron dilüsyon	D 2	25 mg

1'den 11'e kadar olan aktif maddeler HAB, talimat 40 a'ya göre son 2 adımda birlikte potentize edilir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

At, sığır, eşek, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi, küçük evcil hayvanlarda (örn. küçük kemirgenler, tavşanlar, kafes kuşları) kullanılabilir.

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; kronik eklem hastalığı veya dejenerasyonla ilişkili olanlar, örneğin kronik eklem aşınması ve yıpranması (artroz), kalça eklemi malformasyonu (kalça displazisi), spavin, naviküler hastalık ve kemikli omurlar arası köprü oluşumu (spondiloz) durumlarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Uygulama metodu ve yolu:

Deri altı yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır (500 kg üzeri):	10 ml
At, sığır, eşek (500 kg'a kadar):	5 ml
Domuz:	3 ml-5 ml


Koyun, keçi:	3 ml-4 ml
Büyük köpek (25 kg üzeri):	3 ml-4 ml
Orta boy köpek (15 kg-25 kg):	2 ml
Küçük köpek (15 kg'a kadar), kediler:	1 ml-2 ml
Kemirgenler, süs kuşları (0,5 kg üzeri):	0,5 ml
Kemirgenler, süs kuşları (0,5 kg'a kadar):	0,05 ml-0,5 ml

Gerekli durumlarda:

Eğer gerekliyse, vakanın şiddetine göre, belirtilen dozaj 12 saat sonra tekrar edilir. Eğer hastalığın nüksetme eğilimi varsa veya kronik hastalıklardaki uzun süreli tedavilerde tek seferlik dozaj hasta hayvana 4 günlük aralıklarla verilebilir.

Söz konusu semptomların tekrar görülmemesi durumunda ürünün kullanımına son verilmelidir.

Şişeyi (ampülü) açmak için talimatlar



Dikkatli tutunuz. Açılış talimatlarını dikkatlice takip ediniz. Cam ampülü kesmeyiniz. Ampul baş kısmını yukarı doğru tutunuz ve baş kısmında çözeltinin kalmaması için sallayınız/vurunuz. Ardından, renkli noktaya basınç uygulayarak ampul baş kısmını kırarak ayırınız. Kırılan kısım atılmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik, laktasyon veya yumurtlama dönemleri için belirlenmemiştir.

Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Not: Homeopatik ilaçla tedavi sırasında, mevcut şikayetler geçici olarak artabilir (İlk etki).

Bu durumda söz konusu ilacın kullanılmasına ara veriniz ve Veteriner Hekime danışınız.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

DOZ AŞIMI NDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Bilinmemektedir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinmemektedir.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Bu ilaç sadece Veteriner Hekimler veya gerekli enjeksiyon tekniğini iyi bilen eğitimli kimseler tarafından yapılmalıdır.

Bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Zeel enjeksiyonluk çözelti özellikle dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

30° C'nin altında muhafaza edilmelidir.

Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız. Açılmış olan ampulleri kullanmayınız.

Son kullanım tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

5 ml'lik hidrolitik tip I renksiz OPC cam ampullere doldurulur. Ampuller yuvası olan karton kutulara yerleştirilir.

Ambalaj büyüklüğü: 5x5 ml, 50x5 ml

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

27.06.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.:

27.06.2025-016/0027

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

DIŞ ETİKET BİLGİLERİ (5x5 ml, 50x5 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Enjeksiyonluk Çözelti

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

5x5 ml / 50x5ml (veya diğer ticari takdim şekilleri)

Bileşimi:

Berrak ve renksiz steril enjeksiyonluk çözeltilidir.

Her 5 ml'lik 1 ampulde:

Aktif maddeler:

Cartilago suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Funiculus umbilicalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Embryo totalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Placenta totalis suis dilüsyon	D 6 (HAB, talimat 42a)	5 mg
Solanum dulcamara dilüsyon	D 3	25 mg
Symphytum officinale dilüsyon	D 6	25 mg
Nadidum dilüsyon	D 8 (HAB, talimat 5a)	5 mg
Coenzym A dilüsyon	D 8 (HAB, talimat 5a)	5 mg
Sanguinaria canadensis dilüsyon	D 4	7,5 mg
Arnica montana dilüsyon	D 3	50 mg
Sulfur dilüsyon	D 6	9 mg
Natrium diethyloxalaceticum dilüsyon	D 8 aköz (HAB, talimat 8b)	5 mg
Acidum thiocticum dilüsyon	D 8 aköz (HAB, talimat 8b)	5 mg
Rhus toxicodendron dilüsyon	D 2	25 mg

1'den 11'e kadar olan aktif maddeler HAB, talimat 40 a'ya göre son 2 adımda birlikte potentize edilir.

Hedef Türler:

At, sığır, eşek, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi, küçük evcil hayvanlarda (örn. küçük kemirgenler, tavşanlar, kafes kuşları) kullanılabilir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Deri altı yolla uygulanır.

Genel Uyarılar:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar:

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

30° C'nin altında muhafaza edilmelidir.

Buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: Hemen kullanınız. Açılmış olan ampulleri kullanmayınız.

Son kullanım tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

Ticari Takdim Şekilleri:

5 ml'lik hidrolitik tip I renksiz OPC cam ampullere doldurulur. Ampuller yuvası olan karton kutulara yerleştirilir.

Ambalaj büyüklüğü: 5x5 ml, 50x5 ml

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.: 27.06.2025-016/0027

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

K.D.V. Dahil Perakende Satış Fiyatı:

Seri No./S.K.T.

AMPUL ETİKETİ (5 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Enjeksiyonluk Çözelti

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

5 ml

Deri altı yolla uygulanır.

İnterhas A.Ş.

Heel

Seri No.

S.K.T.