

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Zeel Oral Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Acidum thiocticum tritürasyon	D6	10 mg
Arnica montana tritürasyon	D4	60 mg
Cartilago suis tritürasyon	D6	15 mg
Koenzim A tritürasyon	D6	10 mg
Embriyo totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Funiculus umbilicalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Nadidum tritürasyon	D6	10 mg
Natrium diethyloxalaceticum tritürasyon	D6	10 mg
Placenta totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Rhus toxicodendron tritürasyon	D3	30 mg
Sanguinaria canadensis tritürasyon	D4	30 mg
Solanum dulcamara tritürasyon	D3	20 mg
Sülfür tritürasyon	D6	40 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	20 mg

Yardımcı maddelerin tam bir listesi için bölüm 6.1.'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Oral Tablet

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Hedef tür:

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi

4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; özellikle kalça, diz, omuz ve dirsek eklemlerindeki artrozis gibi kronik dejeneratif tipte eklem hastalıklarında; spondilozis, spondiloartrozis, disk fıtıkları ve eklem operasyonları sonrasında tedaviyi desteklemek amacıyla kullanılır.

4.3. Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yoktur.

4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Papatyagillere karşı bir aşırı duyarlılık durumunda, Zeel Oral Tablet dikkatle kullanılmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Ürünü uygulayanlarda bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Zeel dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

(iii) Diğer uyarılar

4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

4.7. Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon dönemleri için belirlenmemiştir. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

4.9. Dozaj ve kullanım yolu

Oral yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır (500 kg üzeri):	10 tablet
At, sığır, (500 kg'ye kadar):	6-8 tablet
Domuz:	4 tablet
Koyun, keçi:	3-4 tablet
Büyük köpek (25 kg üzeri):	3 tablet
Orta boy köpek (15-25 kg):	2 tablet
Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:	1 tablet

Aksi belirtilmedikçe:

Standart dozaj: Tek doz oral yolla günde 2-3 kez uygulanır.

Akut / başlangıç dozu: Akut durumlarda, tek doz başlangıçta 2 saat boyunca her yarım saat ile bir saat arasında tekrarlanabilir ve ardından standart dozla devam edilebilir.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisi için dozaj: Tek doz 1-4 günlük aralıklarla tekrar edilir.

4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Homeopatik ilaçlarla tedavi sırasında, var olan semptomlar kısa süreli kötüleşebilir (ilk etki). Bu durumda ilacı kullanmayı bırakmalı ve veteriner hekiminize danışmalısınız.

4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil):

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

Domuz:

Et: 0 gün

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Diğer terapötik ürünler

ATCvet kodu: QV03AX

5.1. Farmakodinamik özellikler

Uygulanabilir değildir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Uygulanabilir değildir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat

Magnezyum stearat

6.2. Geçimsizlikler

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

6.3. Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 aydır

6.4. Muhafaza şartları

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

6.5. Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Tabletler 100 ve 500 tablet olacak şekilde propilen malzemedan imal edilmiş kutulara konulur. Kutular kapak veya vidalı kapak ile kapatılır. Sadece 100 tablet içeren kutular karton ambalajlarda satışa sunulur.

Ambalaj büyüklüğü: 100, 500 tablet

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

016/0031

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

18.09.2025

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

BİLEŞİMİ:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Acidum thioceticum triturasyon	D6	10 mg
Arnica montana triturasyon	D4	60 mg
Cartilago suis triturasyon	D6	15 mg
Koenzim A triturasyon	D6	10 mg
Embriyo totalis suis triturasyon	D6	15 mg
Funiculus umbilicalis suis triturasyon	D6	15 mg
Nadidum triturasyon	D6	10 mg
Natrium diethyloxalaceticum triturasyon	D6	10 mg
Placenta totalis suis triturasyon	D6	15 mg
Rhus toxicodendron triturasyon	D3	30 mg
Sanguinaria canadensis triturasyon	D4	30 mg
Solanum dulcamara triturasyon	D3	20 mg
Sülfür triturasyon	D6	40 mg
Symphytum officinale triturasyon	D8	20 mg

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedilerde kullanılabilir.

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; özellikle kalça, diz, omuz ve dirsek eklemlerindeki artrozis gibi kronik dejeneratif tipte eklem hastalıklarında; spondilozis, spondiloartrozis, disk fıtıkları ve eklem operasyonları sonrasında tedaviyi desteklemek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Uygulama metodu ve yolu:

Oral yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır (500 kg üzeri):	10 tablet
At, sığır, (500 kg'ye kadar):	6-8 tablet
Domuz:	4 tablet
Koyun, keçi:	3-4 tablet
Büyük köpek (25 kg üzeri):	3 tablet
Orta boy köpek (15-25 kg):	2 tablet
Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:	1 tablet

Aksi belirtilmedikçe:

Standart dozaj: Tek doz oral yolla günde 2-3 kez uygulanır.

Akut / başlangıç dozu: Akut durumlarda, tek doz başlangıçta 2 saat boyunca her yarım saat ile bir saat arasında tekrarlanabilir ve ardından standart dozla devam edilebilir.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisi için dozaj: Tek doz 1-4 günlük aralıklarla tekrar edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Papatyagillere karşı bir aşırı duyarlılık durumunda, Zeel Oral Tablet dikkatle kullanılmalıdır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Tıbbi ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon dönemleri için belirlenmemiştir. Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Homeopatik ilaçlarla tedavi sırasında, var olan semptomlar kısa süreli kötüleşebilir (ilk etki).

Bu durumda ilacı kullanmayı bırakmalı ve veteriner hekiminize danışmalısınız.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

Domuz:

Et: 0 gün

KONTRENDİKASYONLAR

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Ürünü uygulayanlarda bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Zeel dikkatli şekilde kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 aydır

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Tabletler, 100 ve 500 tablet olacak şekilde propilen malzemeden imal edilmiş kutulara konulur. Kutular kapak veya vidalı kapak ile kapatılır. Sadece 100 tablet içeren kutular karton ambalajlarda satışa sunulur.

Ambalaj büyüklüğü: 100, 500 tablet

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

18.09.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO.

18.09.2025 – 016/0031

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

Kutu Etiketi (100 tablet için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Acidum thiocticum tritürasyon	D6	10 mg
Arnica montana tritürasyon	D4	60 mg
Cartilago suis tritürasyon	D6	15 mg
Koenzim A tritürasyon	D6	10 mg
Embriyo totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Funiculus umbilicalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Nadidum tritürasyon	D6	10 mg
Natrium diethyloxalaceticum tritürasyon	D6	10 mg
Placenta totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Rhus toxicodendron tritürasyon	D3	30 mg
Sanguinaria canadensis tritürasyon	D4	30 mg
Solanum dulcamara tritürasyon	D3	20 mg
Sülfür tritürasyon	D6	40 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	20 mg

Hedef Türler

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Oral yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır (500 kg üzeri):	10 tablet
At, sığır, (500 kg'ye kadar):	6-8 tablet
Domuz:	4 tablet
Koyun, keçi:	3-4 tablet
Büyük köpek (25 kg üzeri):	3 tablet
Orta boy köpek (15-25 kg):	2 tablet
Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:	1 tablet

Aksi belirtilmedikçe:

Standart dozaj: Tek doz oral yolla günde 2-3 kez uygulanır.

Akut / başlangıç dozu: Akut durumlarda, tek doz başlangıçta 2 saat boyunca her yarım saat ile bir saat arasında tekrarlanabilir ve ardından standart dozla devam edilebilir.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisi için dozaj: Tek doz 1-4 günlük aralıklarla tekrar edilir.

Genel Uyarılar:

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar:

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.
Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.
Papatyagillere karşı bir aşırı duyarlılık durumunda, Zeel Oral Tablet dikkatle kullanılmalıdır.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 aydır

Ticari Takdim Şekilleri:

Tabletler, 100 ve 500 tablet olacak şekilde propilen malzemeden imal edilmiş kutulara konulur. Kutular kapak veya vidalı kapak ile kapatılır. Sadece 100 tablet içeren kutular karton ambalajlarda satışa sunulur.

Ambalaj büyüklüğü: 100, 500 tablet

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.**Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:**

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

Seri No.

S.K.T

KDV dahil PSF

İç Etiket (100 tablet için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif Maddeler:

Acidum thiocticum tritürasyon	D6	10 mg
Arnica montana tritürasyon	D4	60 mg
Cartilago suis tritürasyon	D6	15 mg
Koenzim A tritürasyon	D6	10 mg
Embriyo totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Funiculus umbilicalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Nadidum tritürasyon	D6	10 mg
Natrium diethyloxalaceticum tritürasyon	D6	10 mg
Placenta totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Rhus toxicodendron tritürasyon	D3	30 mg
Sanguinaria canadensis tritürasyon	D4	30 mg
Solanum dulcamara tritürasyon	D3	20 mg
Sülfür tritürasyon	D6	40 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	20 mg

Hedef Türler

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedi

Kullanım Şekli ve Dozu:

Oral yolla uygulanır.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 aydır

Ticari Takdim Şekilleri:

Tabletler, 100 ve 500 tablet olacak şekilde propilen malzemeden imal edilmiş kutulara konulur. Kutular kapak veya vidalı kapak ile kapatılır. Sadece 100 tablet içeren kutular karton ambalajlarda satışa sunulur.

Ambalaj büyüklüğü: 100, 500 tablet

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.:

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

Seri No.

S.K.T.

Kutu Etiketi (500 tablet için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Zeel

Oral Tablet

Onaylanmış Bir Tedavi Alanı Olmayan Homeopatik Veteriner Tıbbi Ürün

Bileşimi:

Beyazdan sarımsı beyaz renkte, nadiren gözle görülebilir açık kahverengiden kahverengiye değişen noktalardan oluşmuş, yuvarlak iki taraftan düzleştirilmiş tablettir.

1 tablet şunları içerir:

Aktif maddeler:

Acidum thiocticum tritürasyon	D6	10 mg
Arnica montana tritürasyon	D4	60 mg
Cartilago suis tritürasyon	D6	15 mg
Koenzim A tritürasyon	D6	10 mg
Embriyo totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Funiculus umbilicalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Nadidum tritürasyon	D6	10 mg
Natrium diethyloxalaceticum tritürasyon	D6	10 mg
Placenta totalis suis tritürasyon	D6	15 mg
Rhus toxicodendron tritürasyon	D3	30 mg
Sanguinaria canadensis tritürasyon	D4	30 mg
Solanum dulcamara tritürasyon	D3	20 mg
Sülfür tritürasyon	D6	40 mg
Symphytum officinale tritürasyon	D8	20 mg

Kullanım Sahası/Endikasyonlar

At, sığır, domuz, koyun, keçi, köpek, kedilerde kullanılabilir.

Homeopatik ilaç olduğu için terapötik endikasyonu yoktur.

Ancak terapötik endikasyonlar, homeopatik ilaç tablolarına göre değerlendirildiğinde; özellikle kalça, diz, omuz ve dirsek eklemlerindeki artrozis gibi kronik dejeneratif tipte eklem hastalıklarında; spondilozis, spondiloartrozis, disk fıtıkları ve eklem operasyonları sonrasında tedaviyi desteklemek amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Uygulama metodu ve yolu:

Oral yolla uygulanır.

Türlere göre tek doz miktarları:

At, sığır (500 kg üzeri):	10 tablet
At, sığır, (500 kg'ye kadar):	6-8 tablet
Domuz:	4 tablet
Koyun, keçi:	3-4 tablet
Büyük köpek (25 kg üzeri):	3 tablet
Orta boy köpek (15-25 kg):	2 tablet
Küçük köpek (15 kg'ye kadar), kedi:	1 tablet

Aksi belirtilmedikçe:

Standart dozaj: Tek doz oral yolla günde 2-3 kez uygulanır.

Akut / başlangıç dozu: Akut durumlarda, tek doz başlangıçta 2 saat boyunca her yarım saat ile bir saat arasında tekrarlanabilir ve ardından standart dozla devam edilebilir.

Kronik hastalıkların uzun süreli tedavisi için dozaj: Tek doz 1-4 günlük aralıklarla tekrar edilir.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar

Uygulamadan önce Veteriner Hekim tarafından muayene yapılmalıdır.

Şikayetler devam ettiğinde veya kötüleştiğinde, nedeni tam bilinmeyen şikayetler olduğunda, tekrarlayan veya yeni başlayan şikayetler görüldüğünde, ateş olması durumunda veya genel sağlık durumu aşırı derecede bozulduğunda hemen Veteriner Hekime başvurunuz.

Papatyagillere karşı bir aşırı duyarlılık durumunda, Zeel Oral Tablet dikkatle kullanılmalıdır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım:

Tıbbi ürünün güvenliği gebelik ve laktasyon dönemleri için belirlenmemiştir.

Tüm ilaçlar gibi homeopatik ilaçlar gebelik ve laktasyon sürecinde veteriner hekime danışarak kullanılmalıdır.

İstenmeyen Etkiler

Bilinen herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

Hayvanda / Hayvanlarda ilacın prospektüsünde belirtilmeyen herhangi bir istenmeyen veya başka bir etki fark ederseniz, Veteriner Hekiminize bildiriniz.

İlaç Etkileşimleri

Diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığı zaman bu ilacın güvenliği ve etkinliği ile ilgili bilgi mevcut değildir. Bu nedenle diğer veteriner tıbbi ürünlerden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında verilmelidir. Eğer hayvanınız için kullanılan farklı bir ilaç varsa, lütfen Veteriner Hekiminize bildiriniz.

Ürünün geçimsizliği bilinmemektedir.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot

Homeopatik ilaçlarla tedavi sırasında, var olan semptomlar kısa süreli kötüleşebilir (ilk etki).

Bu durumda ilacı kullanmayı bırakmalı ve veteriner hekiminize danışmalısınız.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

At, sığır, koyun, keçi

Et: 0 gün

Süt: 0 saat

Domuz:

Et: 0 gün

Kontrendikasyonlar

Bileşiminde bulunan aktif maddelere veya yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

Genel Uyarılar

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler ve Hekimler İçin Öneriler

Ürünü uygulayanlarda bileşenlere karşı duyarlılık söz konusu olursa Zeel dikkatli şekilde kullanılmalıdır

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

25 °C altında, buzdolabına koymadan, dondurmadan muhafaza ediniz.

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 5 yıldır.

İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 12 aydır

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Her türlü atık/atık materyal evsel atıklarla ve atık sularla karıştırılmamalı, drenaj sistemlerine ve çevreye atılmamalıdır.

Ticari Takdim Şekilleri

Tabletler, 100 ve 500 tablet olacak şekilde propilen malzemeden imal edilmiş kutulara konulur. Kutular kapak veya vidalı kapak ile kapatılır. Sadece 100 tablet içeren kutular karton ambalajlarda satışa sunulur.

Ambalaj büyüklüğü: 100, 500 tablet

Tüm ambalaj büyüklükleri pazarlanmayabilir.

Satış Yeri ve Şartları

Veteriner hekim reçetesi ile eczane, veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde satılır.

Prospektüsün Onay Tarihi:**T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No.****Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi**

İnterhas Tıbbi ve Kimyevi Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Sağlık Sk. No:32 Çankaya- Ankara

Tel: 0312 435 95 60

Fax: 0312 435 49 35

www.interhas.com.tr

Üretici Firma ve Adresi

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden – Baden

Seri No.

S.K.T

KDV dahil PSF