

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ

Anfenzan Oral Tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her 1 tablet:

Aktif madde:

Oksfendazol.....300 mg

Oksiklozanid..... 600 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1.'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Oral Tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür

Sığır, koyun, kuzu

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Sığır ve koyunlarda mide-barsak kıl kurtları, akciğer kıl kurtları, askaridler ve şeritler (*Moniezia sp*) karaciğer kelebeklerine karşı tedavi ve kontrolü amacı ile kullanılır. Nematod yumurtalarına ovisidal etki gösterir.

Ekili olduğu parazitler;

Sığırlarda (mide barsak kurtları): *Ostertaga sp*, *Haemonchus sp*, *Trichostrongylus axei*, *Nematodirus sp*, *Cooperia sp*, intestinal *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum sp*, *Chabertia ovina* ve *Trichuris ovis*

Karaciğer kurtları: *F. hepatica*

Akciğer kıl kurtları: *Dictyocaulus viviparus* türleri ve şeritler (*Moniezia sp*).

Koyunlarda (mide barsak kurtları): *Ostertaga sp*, *Haemonchus sp*, *Trichostrongylus axei*, *Nematodirus sp*, *Cooperia sp*, intestinal *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum sp*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis*,

Akciğer Kurtları: *Dictyocaulus sp*.

Şeritlere: *Moniezia sp*

Karaciğer Kelebekleri: *F.hepatica* ve *F. gigantica*'nın ergin şekillerine karşı etkilidir.

4.3 Kontrendikasyonlar

İlaç, karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

-

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.

- Sağaltımda, uygulamanın 1-2 ay sonra tekrarlanması önerilir.

- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılarak ve ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

- İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

İlacın deriye temasından minimum ölçüde sakınınız.

Mümkünse ilaçlama sırasında lastik eldiven ve koruyucu elbise kullanınız.

İlaç kullanımı sonrası elinizi bol akan su ile yıkayınız.

(iii) Diğer uyarılar

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Benzimidazol bileşiklerine karşı hayvanların tahammülü oldukça iyidir. Genç, hasta ve zayıf hayvanlarda önerilen dozlarda yan etkiye neden olmaz. İlaç hayvanlarda çiftleşme ve gebeliğin erken dönemlerinde, özellikle ilk dört hafta içinde verildiğinde teratojenik etkiye neden olur, bu nedenle gebeliğin ilk bir ayı içinde kullanılmamalıdır.

Önerilen dozlarda nadiren ishale neden olabilir, bu durum tedaviye neden olmadan kendiliğinden geçer.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3 'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

Bromsalanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında yavru atmaya ve koyunlarda ölüme neden olabilir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığır ve koyunlarda ağız yolu ile tabletler yutturularak veya bir miktar su içinde şişe veya benzeri bir kap içinde çözündürüldükten sonra içirilerek kullanılır.

Sığır ve koyunlarda bir defada ağızdan kullanılan sağıltım dozları,

Farmakolojik doz:

Oksfendazol 5-10 mg /kg vücut ağırlığı, Oksiklozanid 10-15 mg /kg vücut ağırlığı dozlarda kullanılır.

Pratik doz tablosu:

Koyunlara:	40 kg /vücut ağırlığı	1 tablet
	60 kg/vücut ağırlığı	1,5 tablet
	80 kg/vücut ağırlığı	2 tablet
Kuzulara:		½ tablet (yarım tablet)
Sığırlara:	40 kg/vücut ağırlığı	1 tablet
	80 kg/vücut ağırlığı	2 tablet
	120 kg/vücut ağırlığı	3 tablet
	160 kg/vücut ağırlığı	4 tablet
	200 kg/vücut ağırlığı	5 tablet kullanılır
	200 kg/vücut ağırlığı üstü:	5-6 tablet (sığırlarda maksimum doz 6 tablettir)

ANFENZAN tablet kıl kurtlarına karşı koruyucu olarak ilkbahar ve sonbahar başlangıcında verilmesi önerilir.

Kıl kurdu tespit edilen hayvanlarda tedavinin 1-2 ayda bir tekrarlanması gerekir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar

İlaç önerilen dozlarda kullanıldığında yan etki riskine ve toksik belirtilere neden olmaz. Sağaltım dozlarında genç, yaşlı, hasta, zayıf hayvanlara verilebilir. Aşırı dozlarda kullanıma bağlı olarak, iştahsızlık, depresyon, ataksi, yerinden kalkmama, solunumun sıklaşması, diyare, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler görülebilir. Yüksek aşırı dozlarda ölüm görüldüğü bildirilmiştir. Aşırı doz kullanıma bağlı olarak ortaya çıkabilecek toksik belirtilerde semptomatik tedavi uygulanır.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlı) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup: Antihelmintikler, Oksfendazol ve kombinasyonları
ATCvet Kodu: QP52AC52

5.1 Farmakodinamik özellikler

Anfenzan oral tablet sığır ve koyunlarda iç parazitlere karşı formüle edilmiş bir üründür, mide-barsak, akciğer kıl kurtları, karaciğer kelekleri ve şeritlere karşı geniş spektrumlu antiparaziter etki gösterir.

Anfenzan, oral olarak kullanım sonrası, bileşimde bulunan Oksfendazol antinematodal etkili bir benzimidazol karbamat türevidir. Parazitlerde fumarat redüktaz etkinliğini inhibe ederek glikoz emilimini önler, glikojen kullanımını artırır ve ATP üretimini azaltıp parazit enerji mekanizmasını bozarak etkinlik gösterir. Diğer benzimidazol bileşikleri gibi emilimi sınırlıdır. Oksiklozanid başlıca *F.hepatica* ve *F. gigantica*'nın ergin şekillerine etkilidir. Fumarat redüktazın faaliyetini etkileyerek enerji metabolizmasının fosforolaz bağlantısını bozarak antinematodal etkisini gösterir, emilimi hızlıdır.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Oral yolla alınımlı sonrası, tablet sindirim sisteminde hızla dağılarak antiparaziter etkinliğini başlatır. Oksfendazol'un bir kısmı rumende fenbendazole dönüşerek emilime uğrar, emilim sonrası sülfoksit ve sülfon bileşiklerine dönüşür. Oksfendazol ve metaboliti yaklaşık 12-18 saat içerisinde pik plazma seviyesine ulaşır. Yarılma ömrü 18.7 saatir. 48 saat sonra başlıca gaita ile olmak üzere atılmaya başlar, plazmada bulunan ilaç miktarı verilenin yaklaşık %1'i kadardır. Oksfendazol basit mideli hayvanlarda başlıca idrarla, ruminantlarda gaita ile atılma uğrar.

Ruminantların sindirim kanallarından büyük oranda emilir. Dağılım sonrası karaciğer, böbrek ve barsaklarda yüksek yoğunlukta bulunur. Atılımı glukuronid bileşiği şeklinde safra ile olur.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Nişasta

Trikalsiyum Fosfat

Magnezyum Stearat

Karboksimetil Selüloz

Primojel

6.2 Geçimsizlikler

-

6.3 Raf ömrü

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay

Açılmış ürün (yarım tablet) 14 gün içinde tüketilmelidir.

6.4 Muhafaza şartları

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Anfenzan Oral Tablet; 10 tabletlik alüminyum folyo-PVC kaplı blister ambalajlarda, karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

14-059

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

14.04.2005

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

08.10.2025

Prospektüs Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
ANFENZAN
Oral Tablet
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

1 tablet; 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid içeren, beyaz-krem renk arası ortadan çentikli, kenarları düz oblong tabletlerdir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Anfenzan oral tablet sığır ve koyunlarda iç parazitlere karşı formüle edilmiş bir üründür, mide-barsak, akciğer kıl kurtları, karaciğer kebekleri ve şeritlere karşı geniş spektrumlu antiparaziter etki gösterir.

Anfenzan, oral olarak kullanım sonrası, bileşimde bulunan Oksfendazol antinematodal etkili bir benzimidazol karbamat türevidir. Parazitlerde fumarat redüktaz etkinliğini inhibe ederek glikoz emilimini önler, glikojen kullanımını artırır ve ATP üretimini azaltıp parazit enerji mekanizmasını bozarak etkinlik gösterir. Diğer benzimidazol bileşikleri gibi emilimi sınırlıdır. Oksiklozanid başlıca *F.hepatica* ve *F. gigantica*'nın ergin şekillerine etkilidir. Fumarat redüktazın faaliyetini etkileyerek enerji metabolizmasının fosforolaz bağlantısını bozarak antinematodal etkisini gösterir, emilimi hızlıdır.

Farmakokinetik özellikler

Oral yolla alınıp sonrası, tablet sindirim sisteminde hızla dağılarak antiparaziter etkinliğini başlatır. Oksfendazol'un bir kısmı rumende fenbendazole dönüşerek emilime uğrar, emilim sonrası sülfoksit ve sülfon bileşiklerine dönüşür. Oksfendazol ve metaboliti yaklaşık 12 –18 saat içerisinde pik plazma seviyesine ulaşır. Yarılanma ömrü 18.7 saatir. 48 saat sonra başlıca gaita ile olmak üzere atılmaya başlar, plazmada bulunan ilaç miktarı verilenin yaklaşık %1'i kadardır. Oksfendazol basit mideli hayvanlarda başlıca idrarla, ruminantlarda gaita ile atılma uğrar.

Ruminantların sindirim kanallarından büyük oranda emilir. Dağılım sonrası karaciğer, böbrek ve barsaklarda yüksek yoğunlukta bulunur. Atılımı glukuronid bileşiği şeklinde safra ile olur.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Sığır ve koyunlarda mide-barsak kıl kurtları, akciğer kıl kurtları, askaridler ve şeritler (*Moniezia sp*) karaciğer kebeklerine karşı tedavi ve kontrolü amacı ile kullanılır. Nematod yumurtalarına ovisidal etki gösterir.

Ekili olduğu parazitler;

Sığırlarda (mide barsak kurtları): *Ostertagia sp*, *Haemonchus sp*, *Trichostrongylus axei*, *Nematodirus sp*, *Cooperia sp*, intestinal *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum sp*, *Chabertia ovina* ve *Trichuris ovis*

Karaciğer kurtları: *F. hepatica*

Akciğer kıl kurtları: *Dictyocaulus viviparus* türleri ve şeritler (*Moniezia sp*).

Koyunlarda (mide barsak kurtları): *Ostertagia sp*, *Haemonchus sp*, *Trichostrongylus axei*, *Nematodirus sp*, *Cooperia sp*, intestinal *Trichostrongylus*, *Oesophagostomum sp*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis*,

Akciğer Kurtları: *Dictyocaulus sp*.

Şeritlere: *Moniezia sp*

Karaciğer Kebekleri: *F.hepatica* ve *F. gigantica*'nın ergin şekillerine karşı etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığır ve koyunlarda ağız yolu ile tabletler yutturularak veya bir miktar su içinde şişe veya benzeri bir kap içinde çözündürüldükten sonra içirilerek kullanılır.

Farmakolojik doz:

Oksfendazol 5-10 mg /kg vücut ağırlığı, Oksiklozanid 10-15 mg /kg vücut ağırlığı dozlarında kullanılır.

Pratik doz tablosu:

Koyunlara:	40 kg /vücut ağırlığı	1 tablet
	60 kg/vücut ağırlığı	1,5 tablet
	80 kg/vücut ağırlığı	2 tablet
Kuzulara:		½ tablet (yarım tablet)
Sığırlara:	40 kg/vücut ağırlığı	1 tablet
	80 kg/vücut ağırlığı	2 tablet
	120 kg/vücut ağırlığı	3 tablet
	160 kg/vücut ağırlığı	4 tablet
	200 kg/vücut ağırlığı	5 tablet kullanılır
	200 kg/vücut ağırlığı üstü:	5-6 tablet (sığırlarda maksimum doz 6 tablettir)

ANFENZAN tablet kıl kurtlarına karşı koruyucu olarak ilkbahar ve sonbahar başlangıcında verilmesi önerilir.

Kıl kurdu tespit edilen hayvanlarda tedavinin 1-2 ayda bir tekrarlanması gerekir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

- Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir.

- Sağaltımda, uygulamanın 1-2 ay sonra tekrarlanması önerilir.

- Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılarak ve ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.

- İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Benzimidazol grubu antihelmintiklerin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı koç katımı sırasında ve gebeliğin ilk 1/3 'ünde bulunan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Benzimidazol bileşiklerine karşı hayvanların tahammülü oldukça iyidir. Genç, hasta ve zayıf hayvanlarda önerilen dozlarda yan etkiye neden olmaz. İlaç hayvanlarda çiftleşme ve gebeliğin erken dönemlerinde, özellikle ilk dört hafta içinde verildiğinde teratojenik etkiye neden olur, bu nedenle gebeliğin ilk bir ayı içinde kullanılmamalıdır.

Önerilen dozlarda nadiren ishale neden olabilir, bu durum tedaviye neden olmadan kendiliğinden geçer.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bromsalanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bromsalanlarla birlikte kullanıldığında yavru atmaya ve koyunlarda ölüme neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

İlaç önerilen dozlarda kullanıldığında yan etki riskine ve toksik belirtilere neden olmaz. Sağaltım dozlarında genç, yaşlı, hasta, zayıf hayvanlara verilebilir. Aşırı dozlarda kullanıma bağlı olarak, iştahsızlık, depresyon, ataksi, yerinden kalkmama, solunumun sıklaşması, diyare, salya artışı, spazm gibi toksik belirtiler görülebilir. Yüksek aşırı dozlarda ölüm görüldüğü bildirilmiştir. Aşırı doz kullanıma bağlı olarak ortaya çıkabilecek toksik belirtilerde semptomatik tedavi uygulanır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 sağımlı) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLAR

İlaç, karaciğer yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

İlacın deriye temasından minimum ölçüde sakınınız.

Mümkünse ilaçlama sırasında lastik eldiven ve koruyucu elbise kullanınız.

İlaç kullanımı sonrası elinizi bol akan su ile yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ürün (yarım tablet) 14 gün içinde tüketilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Anfenzan Oral Tablet; 10 tabletlik alüminyum folyo-PVC kaplı blister ambalajlarda, karton kutu içerisinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ

08.10.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO

14.04.2005/14-059

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ**Aksu Eczacılık ve İlaç San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.**

Batı Sitesi Mah. Arif Halıcı Sok. No: 32-34-36-38 Yenimahalle/ANKARA

Damla İlaç ve Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı-Orhanlı Mevkii, Tuzla Org. Deri San. Bölge. Sama Cad. No:9 (L3-1 Parsel) Tuzla / İSTANBUL

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 8. Cadde No:11 Tepeören- Tuzla/ İSTANBUL

İç Ambalaj Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ANFENZAN

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

1 tablette 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid içerir.

Seri No: **Üretim Ta.:** **Son Kul. Ta.:****Dış Ambalaj Metni**

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ANFENZAN

Oral Tablet

Veteriner Antihelmintik

1 tablet; 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid içeren, beyaz-krem renk arası ortadan çentikli, kenarları düz oblong tabletlerdir.

Sığır ve koyunlarda mide-barsak kıl kurtları, akciğer kıl kurtları, askaridler ve şeritler (*Moniezia sp*) karaciğer keleklerine karşı tedavi ve kontrolü amacı ile kullanılır. Nematod yumurtalarına ovisidal etki gösterir.**Farmakolojik doz:**

Oksfendazol 5-10 mg /kg vücut ağırlığı, Oksiklozanid 10-15 mg /kg vücut ağırlığı dozlarında kullanılır.

Detaylı bilgi için prospektüsü okuyunuz.**Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemeli, ineklerden elde edilen süt 5 gün (10 saım) süresince insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanamaz.**

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde ve kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

Ürün, ilk kullanımdan sonra da dahil, ışıktan koruyarak, 25°C'nin altında, buzdolabı ve derin dondurucuya konulmadan, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ürün (yarım tablet) 14 gün içinde tüketilmelidir.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO

14.04.2005/14-059

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Mamvet İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Batı Sitesi Mah. 2307 Cad. Gersan Sit. No: 20 Yenimahalle / ANKARA

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ

Aksu Eczacılık ve İlaç San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Batı Sitesi Mah. Arif Halıcı Sok. No: 32-34-36-38 Yenimahalle/ANKARA

Damla İlaç ve Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı-Orhanlı Mevkii, Tuzla Org. Deri San. Bölg. Sama Cad. No:9 (L3-1 Parsel) Tuzla / İSTANBUL

Albafarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İTOSB (İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi) 8. Cadde No:11 Tepeören- Tuzla/ İSTANBUL

SERİ NO:

Ü.T.:

S.K.T.:

KDV DÂHİL P.S.F. (sadece dış ambalaj etiketi):