

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ:

BEERAZ

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM:

Her bir ahşap şerit içeriği:

Aktif Maddeler:

Amitraz 500 mg

Yardımcı Maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız

3. FARMASÖTİK ŞEKLİ:

Arı Kovanı Şeridi

Açık sarı, sarı renkli çözelti emdirilmiş, açık sarı amber renkli ahşap şerit

4. KLİNİK ÖZELLİKLER:

4.1 Hedef Türler:

Bal arısı (*Apis mellifera*)

4.2 Her Bir Hedef Tür İçin Kullanım Alanı:

Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

4.3 Kontrendikasyonlar:

Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız. Amitraza dirençli kolonilerde kullanmayınız.

4.4 Her Bir Hedef Tür İçin Özel Uyarılar:

Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. *Varroa* ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi *Varroa*; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi *Varroa* yumurtaları 8-10 gün, erkek *Varroa* yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru *Varroa*lar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. *Varroa*lar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi *Varroa*lar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi *Varroa* yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir. Ergin *Varroa*lar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; *Varroa*ların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; *Varroa* ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

4.5 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar:

(i) Hayvanlarda Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre *Varroa* mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanılmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

(iii) Diğer uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve Son Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

4.6 İstenmeyen Etkiler (sıklığı ve şiddeti)

Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

[Buraya yazın]

4.7 Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Uygulanamaz.


4.8 Diğer İlaçlarla Etkileşimi Ve Diğer Etkileşim Şekilleri:

Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır. Amitrazın toksikolojik etkisi, bakır tuzlarının varlığında artmakta ve terapötik aktivitesi piperonylbutoxide varlığında azalmaktadır. Bu maddelerden herhangi birinin ürünle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

4.9 Dozaj ve Kullanım Yolu:

Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çita) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çitaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çitalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çitalar arasına; 2. Şerit ise 5. Ve 6. Çitalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahet döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının karasız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki v.b. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.

Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

4.10 Doz Aşımı, Varsa Semptomlar, Acil Prosedürler, Antidotlar:

Özel bir antidotu yoktur. Önerilen dozdan 1,5 kat yüksek dozların 8 hafta boyunca uygulanması esnasında arı ölümlerinde hafif bir yükselme görülebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte Önerilen dozdan 5 kat yüksek dozların 6 hafta boyunca uygulanması, Aşırı sıcak havalarda kolonilerde salkım oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir.

Doz aşımında aşılınan doz miktarına bağlı olarak, arılarda huzursuzluk, geçici koordinasyon bozukluğu, felç, kovan terki, kovan içinde/kovan önünde ölü arılar ve koloni sönmesi görülebilir. Böyle durumlarda kovan kapağı açılarak şerit dışarıya alınmalı, kovan kapağı bir müddet açık bırakılarak kovan içi havalandırılmalı ve ana arı kontrol edilmelidir. Gerekirse uygulamaya en az bir gün ara verilmeli; kolonideki stres durumu da göz önüne alınarak uygulamaya en erken ertesi gün devam edilmelidir.

[Buraya yazın]

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil):

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

5 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:

Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden, formamidin grubu, non-sistemik bir akarisit ve insektisittir. Etkisini oktopamin reseptörleri ile monoaminooksidaz enzimlerini inhibe etmek ve alfa-adrenerjik resöptörleri uyarmak suretiyle gösterir.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER:

6.1 Yardımcı maddeler:

Ksilen
Etil alkol

6.2 Geçimsizlikler

Amitraz, asitlerle geçimsizdir.

6.3 Raf Ömrü:

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

6.4 Muhafaza Şartları:

Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır.

6.5 Birincil Ambalajın Niteliği Ve Kompozisyonu:

Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

6.6 Kullanılmamış veya Arta Kalan Ürünün İmhasına İlişkin Özel Önlemler:

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

7 PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 420 83 34 Fax: 0216 415 83 37 www.santavet.com.tr

8 PAZARLAMA İZNİ NUMARASI,

28/010

9 PAZARLAMA İZNİ TARİHİ, GÜNCELLEME ve YENİLEME TARİHİ

26.07.2018

10 SON DÜZENLEME TARİHİ : 27.06.2019

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

BEERAZ

Arı Kovanı Şeridi

Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter


BİLEŞİMİ: Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden, formamidin grubu, non-sistemik bir akarisit ve insektisittir. Etkisini oktopamin reseptörleri ile monoaminooksidaz enzimlerini inhibe etmek ve alfa-adrenerjik resöptörleri uyarmak suretiyle gösterir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çita) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çitaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çitalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çitalar arasına; 2. Şerit ise 5. Ve 6. Çitalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahet döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının karasız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki v.b. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.

Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR: Ürün; arıların çiftleşme zamanında ve bal akımı (tutumu) süresince uygulanmamalıdır. Varroa ilkbahardan sonbahara kadar ürer. Dişi Varroa; arı larvalarının bulunduğu petek gözlerine, petek gözü sırlanmadan önce 2-8 adet yumurta bırakır. Dişi Varroa yumurtaları 8-10 gün, erkek Varroa yumurtaları 6-7 gün sonra ergin haline geçer. Yavru Varroalar (larva/nimf/pupa) petek gözü içindeki yavru arının (larva) vücut sıvısını emerek beslenirler. Varroalar petek içinde çiftleşirler ve erkek olanları ölür. Dişi Varroalar ise ergin olduktan 4-14 gün sonra yumurtlamaya başlar. Bir dişi Varroa yazın 2-3 ay, kışın 5-8 ay canlı kalabilir. Ergin Varroalar kışı ergin arılar üzerinde geçirir ve bu sürede ergin arıların vücut sıvısını emerek beslenir. Bu sebeple; Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başarıyı artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra

[Buraya yazın]

uygulanen ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER: Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulanmamalıdır. Amitrazın toksikolojik etkisi, bakır tuzlarının varlığında artmakta ve terapötik aktivitesi piperonylbutoxide varlığında azalmaktadır. Bu maddelerden herhangi birinin ürünle birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır. Amitraz, asitlerle geçimsizdir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT: Özel bir antidotu yoktur. Önerilen dozdan 1,5 kat yüksek dozların 8 hafta boyunca uygulanması esnasında arı ölümlerinde hafif bir yükselme görülebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte Önerilen dozdan 5 kat yüksek dozların 6 hafta boyunca uygulanması, Aşırı sıcak havalarda kolonilerde salkım oluşumuna neden olabileceği bildirilmiştir.

Doz aşımında aşılınan doz miktarına bağlı olarak, arılarda huzursuzluk, geçici koordinasyon bozukluğu, felç, kovan terki, kovan içinde/kovan önünde ölü arılar ve koloni sönmesi görülebilir. Böyle durumlarda kovan kapağı açılarak şerit dışarıya alınmalı, kovan kapağı bir müddet açık bırakılarak kovan içi havalandırılmalı ve ana arı kontrol edilmelidir. Gerekirse uygulamaya en az bir gün ara verilmeli; kolonideki stres durumu da göz önüne alınarak uygulamaya en erken ertesi gün devam edilmelidir.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR: Diğer dış parazit ilaçlarıyla birlikte uygulamayınız. Amitraza dirençli kolonilerde kullanmayınız.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve Son Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR: Uygulayıcılar şeritlere temas etmemeli, tercihen eldiven kullanmalıdır. Teması halinde, eller suyla yıkanmalıdır. Uygulama esnasında ürün solunmamalı, herhangi bir gıda tüketilmemeli ve sigara içilmemelidir. Şeritler insan tüketimine sunulacak ballara temas ettirilmemelidir. Şerit uygulandığı süre içinde kovanda bulunan ve arılar tarafından tüketilmemiş olan şerbet, insanlar tarafından tüketilmemelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutuda, ağız kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 27.06.2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.07.2018 – 28/010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul

Tel: 0 216 420 83 34 Fax: 0 216 415 83 37 www.santavet.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Albafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 11 34959 Tuzla / İstanbul

İÇ ETİKET

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BEERAZ
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ: Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Veteriner hekimi tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler,prospektüste gösterildiği şekilde her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.

Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi için: Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çita) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çitaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çitalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çitalar arasına; 2. Şerit ise 5. Ve 6. Çitalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahet döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının karasız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki v.b. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.

Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güveli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve Son Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutuda, ağız kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner muayenahaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.07.2018 – 28/010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.

[Buraya yazın]

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Albafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri Numarası
Üretim Tarihi
Son Kullanma Tarihi

DIŞ ETİKET


Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BEERAZ
Arı Kovanı Şeridi
Bal Arılarındaki Varroosis için Ektoparaziter

BİLEŞİMİ: Her bir ahşap şerit 500 mg Amitraz içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR: Beeraz Arı Kovanı Şeridi; *Varroa destructor* adlı arı akarı tarafından bal arılarında meydana getirilen Varroosisle mücadele amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanım şekli kovan içi uygulamadır.

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; şeritler, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi her biri kovandaki çerçevelerin orta hizasına gelecek, iki çerçevenin arasında duracak, her iki taraftaki çerçevelerde bulunan arılara temas edecek durumda ve birbirlerinden ayrı olacak şekilde, şeritin orta kısmında yer alan delikten bir çubuk geçirilerek asılır. Şeritlerin; kovanın her tarafına eşit, arıların yoğun ve aktif olduğu kısımlara gelecek şekilde bulunmasına da dikkat edilmelidir.



Uygulama zamanı: Uygulama bal hasadından sonra (geç sonbaharda), ve bal akımından 4-6 hafta önce (erken ilkbaharda) yapılmalıdır.

Varroa mücadelesi: Sağlıklı ve güçlü bir Çerçeve (Çita) en az 3.000-4.000 Sağlıklı Arıdan oluşur. Bu Çerçevelerin (Çitaların) toplamı ise kolonideki arı nüfusunun büyüklüğünü belirler. Sağlıklı ve kuvvetli bir Kovanda 1-5 Çerçeve varlığında 1 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 2. ve 3. Çitalar arasına), 6-10 Çerçeve varlığında 2 adet BEERAZ Arı Kovanı Şeridi (Tercihen 1. Şerit 2. ve 3. Çitalar arasına; 2. Şerit ise 5. Ve 6. Çitalar arasına) uygulanır.

Koloni büyüklüğü ve sağlığı hakkında uygulayıcının gözlemleri ve tespitleri önemlidir (Örneğin; mevsim geçişlerinde koloni gücünün zayıflaması, kovandaki arı mevcudunun azalması vb.). Koloni gücünün zayıf, arı mevcudunun azaldığı, koloni sağlığının yetersiz (örneğin; bir Çerçevede Kış Dönemi çıkışı ya da koloni sağlığını etkilemiş olan bir hastalık sonrası nekahet döneminde bulunma gibi) ya da uygulayıcının karasız kaldığı durumlarda, gerekirse BEERAZ Arı Kovanı Şeridi ortadan ikiye kesilerek (1/2) yukarıda belirtildiği gibi çerçeveler arasına uygulanabilir. Uygulamaya birkaç kovan ile başlanır ve koloni dikkatli bir şekilde gözlem altında tutulur. Arılarda bir huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu, kovan terki v.b. gözlenmiyorsa uygulamaya başlangıç dozu ile devam edilir. Şeritler 4-6 hafta boyunca Kovanda bırakılır.

Koloni gücünün zayıf olması durumunda kolonilerde mutlaka birleştirme yapılmalı, zayıf kolonilere çerçeve takviyesi yapılmalı, gerekirse kovan içi bölme tahtası ile bölünmeli, boş olan kısma kuru ot/sap-saman konularak kovan içi nem ve ısı kaybına karşı önlem alınmalıdır. Ana arının durumu gözden geçirilmeli, gerekirse arı (yaşlı ise genç ana arı ile) değiştirilmeli ve yağmacılığı önleyici tedbirler alınmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR: Varroaların üremediği ve ergin arıların üzerinde açıkta bulunduğu sonbahar ve kış aylarında mücadele yapılması başariyi

[Buraya yazın]

artırır. Petek gözleri sırlandıktan sonra uygulanan ilaç petek gözüne giremeyeceğinden; Varroa ve arı üremesinin olduğu ilkbahar ve yaz aylarında ilaçlama yapılmamalıdır.

İlaçların uygunsuz kullanımı direnç oluşmasına sebep olabilir. Etkili ve güvenli bir uygulama için ürün; entegre Varroa mücadelesinin bir unsuru olarak, tercihen veteriner hekimin gözetiminde kullanılmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER: Önerilen kullanımda istenmeyen etkisi yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince elde edilen ballar insan tüketimine sunulmamalıdır. Bal tutumunun başlamasına 6 hafta kala ve bal tutumu süresince uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ve Son Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Orijinal ambalajında, 25°C'nin altında oda sıcaklığında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan, alevden ve güneş ışığından koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü; imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Açıldıktan sonraki raf ömrü 6 haftadır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Atık ve artıklar; balıklar ve diğer su canlıları için zehirli olduğundan, su kaynaklarına atmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutuda, ağzı kilitli alüminyum folyo içinde, 10, 20 ve 50 adetlik ve her biri 500 mg amitraz içeren, 200 x 20 x 1.1 mm boyutlarında ahşap şerit bulunmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesiyle; eczaneler, veteriner muayenahaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR).

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 26.07.2018 – 28/010

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Santavet İlaç. San. Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Barbaros Bulv. Mevdudi Sk. No:3 Ümraniye / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Albafarma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Organize San. Bölgesi 8. Cad. No: 11 34959 Tuzla / İstanbul

Seri Numarası

Üretim Tarihi

Son Kullanma Tarihi

Fiyatı