ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
AviPro ^{TM} IB ND C131 Süspansiyonluk Liyofilizat

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 doz içerik:
Etkin madde:
- $10^{3,4}$-$10^{4,8}$ EID50* Enfeksiyöz Bronşit virüsü, canlı atenüe, Massachusetts H120 suşu

- $10^{5,5}$-$10^{7,2}$ EID50* Newcastle Hastalığı virüsü, canlı atenüe, klon 13-1 suşu içerir.

*EID50 = %50 embriyo enfeksiyöz dozu: virüs ile aşılanan embriyoların %50'sinde enfeksiyona neden olan virüs titresi.

Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddelerin tam listesi için, bkz. bölüm 6.1

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Süspansiyonluk Liyofilizat
Beyaz-bej pelet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef türler
Tavuklar (broyler, yumurtacı yarkalar).

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Klinik belirtileri ve mortaliteyi azaltmak için tavukların (broyler, yumurtacı yarkalar) Newcastle Hastalığına karşı aktif immünizasyonu için.

Massachusetts serotipli avian enfeksiyöz bronşit virüsünün neden olduğu enfeksiyonun siliyer aktivite üzerindeki zararlı etkilerini (solunum yolu klinik belirtileri) azaltmak amacıyla tavukların (broyler, yumurtacı yarkalar) Enfeksiyöz Bronşite karşı aktif immünizasyonu için.

Bağışıklığın başlangıcı (IB virüsü): Aşılama sonrası 3 hafta
Bağışıklığın başlangıcı (ND virüsü): Aşılama sonrası 2 hafta
İmmünitenin süresi: Aşılama sonrası 8 hafta

4.3 Kontrendikasyonlar
Bulunmamaktadır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayın.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Aşılanan tavuklar IB virüsü aşı suşunu en az 21 güne kadar, ND virüsü aşı suşunu ise 15 günden daha kısa bir süre saçabilir. Her iki aşı türü de aşılanmamış tavuklara bulaşabilir. Hafif solunum yolu semptomları (aşı sonrası gibi) ortaya çıkabilir.

ND virüsü aşı suşunun ördeklere, hindilere ve kazlara bulaşması bir güvenlik endişesi oluşturmamaktadır. Güvercinlerde solunum yollarında hafif patolojik bulgular gözlenmiş, ancak herhangi bir klinik semptom ortaya çıkmamıştır. Diğer hassas türlere bulaşması önlenmelidir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
ND virüsü gözle temas ettiğinde konjonktivite neden olabilir.
Veteriner tıbbi ürünü kullanırken göz, solunum yolu koruması (yüz maskesi/siperliği) ve eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Sıçrama veya dökülme yoluyla kontaminasyondan kaçınınız. Kullanımdan sonra eller ve ekipman yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Kazara kendi kendine uygulama durumunda derhal tıbbi yardım alın ve prospektüsü veya etiketi doktora gösteriniz.

(iii) Diğer uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Tavuklar (broyler, yumurtacı yarkalar)

Püskürtme yoluyla Ocula-nasal uygulama için:

Seyrek (1 ila 10 hayvan/tedavi edilen 10.000 hayvan):	Öksürük, solunum sesi ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları*

İçme suyunda kullanım için:

Yaygın (1 ila 10 hayvan / tedavi edilen 100 hayvan):	Öksürük, nazal akıntı ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları*

*Aşılama, üç güne kadar devam edebilen hafif ve geçici belirtilere neden olabilir. Laboratuvar güvenlik çalışmalarında geçici siliyer aktivite bozukluğu gözlemlenmiştir.
Yan etkilerin özellikleri, aşılama sırasında tavukların (maternal) bağışıklık durumuna bağlı olabilir.
Yan etkilerin raporlanması önemlidir. Bir veteriner tıbbi ürünün tolere edilebilirliğinin sürekli izlenmesini sağlar. Bildirimler tercihen bir veteriner hekim tarafından ulusal bildirim sistemi aracılığıyla ya pazarlama izni sahibine ya da yetkili ulusal makama gönderilmelidir. İlgili iletişim bilgileri ayıca kullanma talimatının "iletişim bilgileri" bölümünde bulunabilir.

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Veteriner tıbbi ürünün güvenliliği yumurtlama döneminde belirlenmemiştir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürünle birlikte kullanımıyla ilgili güvenlilik ve etkililik bilgisi mevcut değildir. Bu nedenle, bu aşının herhangi bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanımı kararı, her durum için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Püskürtme yoluyla ocula-nasal uygulama için (yaşamın 1. gününden itibaren) ve içme suyu yoluyla uygulama için (yaşamın 7. gününden itibaren).

Hayvan başına bir doz aşı uygulanmalıdır.

Püskürtme yoluyla Ocula-nasal uygulama

Püskürtmenin oculo-nasal yapılması gerekmektedir. Püskürtme için kullanılacak içme suyu miktarı yerel ve hayvancılık koşullarına bağlıdır. Su altındaki tıpa çıkarıldıktan sonra 1000 doz aşı,

- 4 haftaya kadar 1000 tavuk için 500 ml su ile
- 4 haftadan sonra 1000 tavuk için 750-1000 ml su ile seyreltilir.

Tavuklara 30-40 cm mesafe ile eşit olarak püskürtülür.
Aşılama sırasında ve sonrasında türbülansları önlemek için havalandırma kapatılmalıdır.
Aşılama için, solunum yollarının alt kısımlarına nüfuz etmesini ve aşılama reaksiyonlarının artmasını önlemek için 100 µm ve daha fazla damlacık boyutuna sahip kaba bir sprey kullanılmalıdır.

İçme suyu yoluyla uygulama

1. Aşılama için kullanılan tüm ekipman (borular, suluklar vb.) dikkatlice temizlenir ve deterjan ve dezenfektanlardan arındırılır.
2. Aşılanacak tavuk sayısına göre su miktarını hesaplayın (bkz. 5.) Sadece içme suyu kalitesinde soğuk temiz su kullanılmalıdır.

Yağsız süt tozu (2-4 g/l su) veya yağsız süt (20-40 ml/l su) ilavesi aşının stabilitesini olumlu yönde etkileyebilir. Yağsız süt tozu veya yağsız süt, aşı seyreltilmeden önce su ile dikkatlice karıştırılmalıdır.

3. Alüminyum kapağı çıkarın. Aşı şişesinin tıpasını su altında açın ve içeriği tamamen seyreltin.
4. Kolay kullanım için aşı küçük bir kapta (yaklaşık 1 litre) hazırlanmalıdır. Şişeyi dikkatlice durulayın ve tamamen boşaltın. Aşı süspansiyonu daha sonra daha büyük bir kapta (5-10 litre) seyreltilir ve tekrar iyice karıştırılır.

Aşı şişesinin tüm içeriği sadece bir sürü veya içme suyu sistemi için kullanılmalıdır. Seyreltilmiş aşının bölünmesi dozaj hatalarına yol açabilir.

5. Aşı süspansiyonuna, tavuklar tarafından 1-2 saat içinde tüketilecek nihai hacme kadar taze soğuk su eklenir. Şüphe durumunda, su alımı aşılamadan bir gün önce belirlenmelidir.
6. Hala suyla dolu olan suluk hatları, aşı süspansiyonu uygulanmadan önce boşaltılmalıdır. Aşı 2 saat içinde tüketilmelidir. Tavukların içme davranışları değişkenlik gösterdiğinden, aşılama aşamasında tüm tavukların su içmesini sağlamak için aşılamadan 2-3 saat önce içme suyunun kesilmesi gerekebilir. Her tavuk yeterli dozda aşı almalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

"İstenmeyen etkiler" bölümünde belirtilen solunum yolu semptomlarına ek olarak, on kat doz sonrası geçici tam veya yüksek siliyostaz gözlenmiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlarda dahil)

Sıfır (0) gündür.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER

ATCvet Kodu: QI01AD11
Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşit virüsü ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı aktif bağışıklığın indüksiyonu için canlı zayıflatılmış aşı.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Disodyum fosfat dihidrat
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat
Jelatin
Sukroz
Sorbitol

6.2 Geçimsizlikler
Başka bir veteriner tıbbi ürünle karıştırmayınız.

6.3 Raf ömrü
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 18 ay
İç ambalaj açıldıktan sonraki raf ömrü: 2 saat
Talimatlara göre seyrelttikten sonra raf ömrü: 2 saat

6.4. Muhafaza şartları
2°C–8°C de saklayın ve taşıyınız. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
6 ml ve 10 ml hacimli şişeler tip I camdan (Avr. Far.) yapılmıştır ve tip I kauçuk tıpalıdır. Şişeler koparılabilir aluminyum kapakla kapatılmıştır.
Aşı aşağıdaki ambalaj boyutlarında mevcuttur:
Karton kutuda 2000 dozluk 1 şişe
Karton kutuda 2000 dozluk 10 şişe
Karton kutuda 5000 dozluk 1 şişe
Karton kutuda 5000 dozluk 10 şişe
Tüm ambalaj boyutları piyasada olmayabilir.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
İlaçlar atık su veya evsel atık yoluyla atılmamalıdır.
Kullanılmamış veteriner tıbbi ürünlerin veya bunlardan kaynaklanan atıkların yerel yönetmeliklere ve söz konusu veteriner tıbbi ürün için geçerli ulusal toplama sistemlerine uygun olarak bertaraf edilmesi için geri dönüşüm sistemlerini kullanınız.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Elanco Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69A,
İç Kapı No:123 Maltepe- İstanbul
Tel No:0216 766 23 37

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI
---

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ
21.04.2026

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ

Prospektüs:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
AviPro ™ IB ND C131
Süspansiyonluk Liyofilizat
Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşit Virüsü ve Newcastle Hastalığı Virüsüne Karşı Canlı Atenüe Aşı

BİLEŞİMİ
1 doz içerik: $10^{3,4}$-$10^{4,8}$ EID_{50}* Enfeksiyöz Bronşit virüsü, canlı atenüe, Massachusetts H120 suşu, $10^{5,5}$-$10^{7,2}$ EID_{50}* Newcastle Hastalığı virüsü, canlı atenüe, klon 13-1 suşu içerir.
Beyaz-bej pelet.

*EID50 = %50 embriyo enfeksiyöz dozu: virüs ile aşılanan embriyoların %50'sinde enfeksiyona neden olan virüs titresi.

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
ATC vet Kodu: QI01AD11
Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşit virüsü ve Newcastle hastalığı virüsüne karşı aktif bağışıklığın indüksiyonu için canlı zayıflatılmış aşı.

KULLANIM SAHASI /ENDİKASYONLAR
Klinik belirtileri ve mortaliteyi azaltmak için tavukların (broyler, yumurtacı yarkalar) Newcastle Hastalığına karşı aktif immünizasyonu için.
Massachusetts serotipli avian enfeksiyöz bronşit virüsünün neden olduğu enfeksiyonun siliyer aktivite üzerindeki zararlı etkilerini (solunum yolu klinik belirtileri) azaltmak amacıyla tavukların (broyler, yumurtacı yarkalar) Enfeksiyöz Bronşite karşı aktif immünizasyonu için kullanılır.
Bağışıklığın başlangıcı (IB virüsü): Aşılama sonrası 3 hafta
Bağışıklığın başlangıcı (ND virüsü): Aşılama sonrası 2 hafta
İmmünitenin süresi: Aşılama sonrası 8 hafta

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Püskürtme yoluyla Ocula-nasal uygulama için (yaşamın 1. gününden itibaren) ve içme suyu yoluyla uygulama için (yaşamın 7. gününden itibaren).
Hayvan başına bir doz aşı uygulanmalıdır.

Püskürtme yoluyla Ocula-nasal uygulama
Püskürtmenin oculo-nasal yapılması gerekmektedir. Püskürtme için kullanılacak içme suyu miktarı yerel ve hayvancılık koşullarına bağlıdır. Su altındaki tıpa çıkarıldıktan sonra 1000 doz aşı,
- 4 haftaya kadar 1000 tavuk için 500 ml su ile
- 4 haftadan sonra 1000 tavuk için 750-1000 ml su ile seyreltilir.

Tavuklara 30-40 cm mesafe ile eşit olarak püskürtülür. Aşılama sırasında ve sonrasında türbülansları önlemek için havalandırma kapatılmalıdır. Aşılama için, solunum yollarının alt kısımlarına nüfuz etmesini ve aşılama reaksiyonlarının artmasını önlemek için 100 µm ve daha fazla damlacık boyutuna sahip kaba bir sprey kullanılmalıdır.

İçme suyu yoluyla uygulama

1.Aşılama için kullanılan tüm ekipman (borular, suluklar vb.) dikkatlice temizlenir ve deterjan ve dezenfektanlardan arındırılır.
2.Aşılanacak tavuk sayısına göre su miktarını hesaplayın (bkz. 5.) Sadece içme suyu kalitesinde soğuk temiz su kullanılmalıdır.
Yağsız süt tozu (2-4 g/l su) veya yağsız süt (20-40 ml/l su) ilavesi aşının stabilitesini olumlu yönde etkileyebilir. Yağsız süt tozu veya yağsız süt, aşı seyreltilmeden önce su ile dikkatlice karıştırılmalıdır.
3.Alüminyum kapağı çıkarın. Aşı şişesinin tıpasını su altında açın ve içeriği tamamen seyreltin.
4.Kolay kullanım için aşı küçük bir kapta (yaklaşık 1 litre) hazırlanmalıdır. Şişeyi dikkatlice durulayın ve tamamen boşaltın. Aşı süspansiyonu daha sonra daha büyük bir kapta (5-10 litre) seyreltilir ve tekrar iyice karıştırılır.
Aşı şişesinin tüm içeriği sadece bir sürü veya içme suyu sistemi için kullanılmalıdır. Seyreltilmiş aşının bölünmesi dozaj hatalarına yol açabilir.
5.Aşı süspansiyonuna, tavuklar tarafından 1-2 saat içinde tüketilecek nihai hacme kadar taze soğuk su eklenir. Şüphe durumunda, su alımı aşılamadan bir gün önce belirlenmelidir.
6.Hala suyla dolu olan suluk hatları, aşı süspansiyonu uygulanmadan önce boşaltılmalıdır. Aşı 2 saat içinde tüketilmelidir. Tavukların içme davranışları değişkenlik gösterdiğinden, aşılama aşamasında tüm tavukların su içmesini sağlamak için aşılamadan 2-3 saat önce içme suyunun kesilmesi gerekebilir. Her tavuk yeterli dozda aşı almalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sadece sağlıklı hayvanları aşılayın.
Aşılanan tavuklar IB virüsü aşı suşunu en az 21 güne kadar, ND virüsü aşı suşunu ise 15 günden daha kısa bir süre saçabilir. Her iki aşı türü de aşılanmamış tavuklara bulaşabilir. Hafif solunum yolu semptomları (aşı sonrası gibi) ortaya çıkabilir.
ND virüsü aşı suşunun ördeklere, hindilere ve kazlara bulaşması bir güvenlik endişesi oluşturmamaktadır. Güvercinlerde solunum yollarında hafif patolojik bulgular gözlenmiş, ancak herhangi bir klinik semptom ortaya çıkmamıştır. Diğer hassas türlere bulaşması önlenmelidir.

Yumurtlama döneminde kullanım:
Veteriner tıbbi ürünün güvenliliği yumurtlama döneminde belirlenmemiştir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Tavuklar (broyler, yumurtacı yarkalar)

Püskürtme yoluyla Ocula-nasal uygulama için:

Seyrek (1 ila 10 hayvan / tedavi edilen 10.000 hayvan):	Öksürük, solunum sesi ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları*

İçme suyunda kullanım için:

Yaygın (1 ila 10 hayvan / tedavi edilen 100 hayvan):	Öksürük, nazal akıntı ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları*

*Aşılama, üç güne kadar devam edebilen hafif ve geçici belirtilere neden olabilir. Laboratuvar güvenlik çalışmalarında geçici siliyer aktivite bozukluğu gözlemlenmiştir.

Yan etkilerin özellikleri, aşılama sırasında tavukların (maternal) bağışıklık durumuna bağlı olabilir.
Yan etkilerin raporlanması önemlidir. Bir veteriner tıbbi ürünün tolere edilebilirliğinin sürekli izlenmesini sağlar. Bildirimler tercihen bir veteriner hekim tarafından ulusal bildirim sistemi aracılığıyla ya pazarlama izni sahibine ya da yetkili ulusal makama gönderilmelidir. İlgili iletişim bilgileri ayıca kullanma talimatının "iletişim bilgileri" bölümünde bulunabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürünle birlikte kullanımıyla ilgili güvenlilik ve etkililik bilgisi mevcut değildir. Bu nedenle, bu aşının herhangi bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanımı kararı, her durum için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Başka bir veteriner tıbbi ürünle karıştırmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
"İstenmeyen etkiler" bölümünde belirtilen solunum yolu semptomlarına ek olarak, on kat doz sonrası geçici tam veya yüksek siliyostaz gözlenmiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR
Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz Son kullanma tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
ND virüsü gözle temas ettiğinde konjonktivite neden olabilir. Veteriner tıbbi ürünü kullanırken göz, solunum yolu koruması (yüz maskesi/siperliği) ve eldivenlerden oluşan kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir. Sıçrama veya dökülme yoluyla kontaminasyondan kaçınınız. Kullanımdan sonra eller ve ekipman yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Kazara kendi kendine uygulama durumunda derhal tıbbi yardım alın ve prospektüsü veya etiketi doktora gösteriniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
2°C – 8°C de saklayın ve taşıyınız. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır. Açıldıktan ve talimatlara göre seyreltildikten sonraki raf ömrü 2 saattir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
İlaçlar atık su veya evsel atık yoluyla atılmamalıdır. Kullanılmamış veteriner tıbbi ürünlerin veya bunlardan kaynaklanan atıkların yerel yönetmeliklere ve söz konusu veteriner tıbbi ürün için geçerli ulusal toplama sistemlerine uygun olarak bertaraf edilmesi için geri dönüşüm sistemlerini kullanınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
6 ml ve 10 ml hacimli şişeler tip I camdan (Avr. Far.) yapılmıştır ve tip I kauçuk tıpalıdır. Şişeler koparılabilir aluminyum kapakla kapatılmıştır.

Aşı aşağıdaki ambalaj boyutlarında mevcuttur:
Karton kutuda 2000 dozluk 1 şişe
Karton kutuda 2000 dozluk 10 şişe
Karton kutuda 5000 dozluk 1 şişe
Karton kutuda 5000 dozluk 10 şişe
Tüm ambalaj boyutları piyasada olmayabilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 21.04.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 21.04.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Elanco Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:69A, İç Kapı No:123 Maltepe- İstanbul
Tel No:0216 766 23 37

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Lohmann Animal Health GmbH,
Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Almanya

Şişe etiketi (2000/5000 doz):

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
AviPro ™ IB ND C131
Süspansiyonluk Liyofilizat
Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşit Virüsü ve Newcastle Hastalığı Virüsüne Karşı Canlı Atenüe Aşı

BİLEŞİMİ:
1 doz içerik: $10^{3,4}$-$10^{4,8}$ EID_{50}* Enfeksiyöz Bronşit virüsü, canlı atenüe, Massachusetts H120 suşu, $10^{5,5}$-$10^{7,2}$ EID_{50}* Newcastle Hastalığı virüsü, canlı atenüe, klon 13-1 suşu içerir.
Beyaz-bej pelet.
*EID50 = %50 embriyo enfeksiyöz dozu: virüs ile aşılanan embriyoların %50'sinde enfeksiyona neden olan virüs titresi.

Tavuklarda (Broyler, yumurtacı yarkalar) kullanılır.

MUHAFAZA ŞARTLARI: 2°C – 8°C de saklayın ve taşıyınız. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır. Açıldıktan ve talimatlara göre seyrelttikten sonraki raf ömrü 2 saattir.

GENEL UYARILAR: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Son kullanma tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 21.04.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: Elanco Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.

SERİ NO: **SKT:**

Kutu Etiketi-Tüm Dozlar:

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
AviPro ™ IB ND C131
Süspansiyonluk Liyofilizat
Tavuklarda Enfeksiyöz Bronşit Virüsü ve Newcastle Hastalığı Virüsüne Karşı Canlı Atenüe Aşı

BİLEŞİMİ:

1 doz içerik: $10^{3,4}$-$10^{4,8}$ EID_{50}* Enfeksiyöz Bronşit virüsü, canlı atenüe, Massachusetts H120 suşu, $10^{5,5}$-$10^{7,2}$ EID_{50}* Newcastle Hastalığı virüsü, canlı atenüe, klon 13-1 suşu içerir.
Beyaz-bej pelet.
*EID50 = %50 embriyo enfeksiyöz dozu: virüs ile aşılanan embriyoların %50'sinde enfeksiyona neden olan virüs titresi.

Tavuklarda (Broyler, yumurtacı yarkalar) kullanılır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI: Sıfır (0) gün.

MUHAFAZA ŞARTLARI: 2°C – 8°C de saklayın ve taşıyınız. Güneş ışığından koruyunuz. Dondurmayınız Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır. Açıldıktan ve talimatlara göre seyrelttikten sonraki raf ömrü 2 saattir.

GENEL UYARILAR: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Son kullanma tarihi geçen ürünü kullanmayınız.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:
İlaçlar atık su veya evsel atık yoluyla atılmamalıdır. Kullanılmamış veteriner tıbbi ürünlerin veya bunlardan kaynaklanan atıkların yerel yönetmeliklere ve söz konusu veteriner tıbbi ürün için geçerli ulusal toplama sistemlerine uygun olarak bertaraf edilmesi için geri dönüşüm sistemlerini kullanınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 21.04.2026

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Elanco Hayvan Sağlığı Ltd.Şti.
Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, No:69/A, İç Kapı No:123
Maltepe/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Lohmann Animal HealthGmbH,
Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Almanya

SERİ NO:
SKT:
KDV dahil PSF: