1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
BOVALTO RESPI 3, Enjeksiyonluk Süspansiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her 2 ml dozda şunlar bulunur:

Etkin maddeler:

İnaktive edilmiş sığır sinsityal solunum virüsü, BIO-24 suşu……..	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş sığır parainflüenza 3 virüsü, BIO-23 suşu…….....	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş *Mannheimia haemolytica*, serotip A1, DSM 5283 suşu.	PR * ≥ 1
Adjuvan(lar):	
Alüminyum hidroksit……..	8,00 mg
Quillaia (Quil A) saponinleri …….	0,40 mg

Yardımcı madde:

Tiyomersal……...	0,20 mg
Formaldehid…….	≤ 1,00 mg
Sodyum klorür……..	≤ 1,98 mg
Enjeksiyonluk preparatlar için su……1 doz için yeterli miktarda	

* Hedef türde virülans sınamasını başarıyla geçen bir aşı serisiyle kobayların aşılanmasının ardından elde edilen referans serum ile karşılaştırmalı bağıl potans (PR).

Yardımcı maddelerin tam ve eksiksiz listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk süspansiyon
Görünüş: Bir çökelti bulunan, pembemsi renkte sıvı.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Hedef tür
Sığırlar.

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Sığırlarda:
Anneden gelen antikorların mevcut olmadığı durumlarda aşağıdakilere karşı aktif bağışıklık sağlar:
- Enfeksiyon nedeniyle virüs atılımını azaltmak için parainflüenza 3 virüsü
- Enfeksiyon nedeniyle virüs atılımını azaltmak için sığır sinsityal solunum virüsü
- Klinik belirtileri ve akciğer lezyonlarını azaltmak için *Mannheimia haemolytica* serotip A1

Bağışıklık başlayıncaya kadar geçen süre: 3 hafta
Bağışıklık süresi: 6 ay

4.3 Kontraendikasyonlar
Bulunmamaktadır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar

Yalnızca sağlıklı hayvanları aşılayınız.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Seronegatif buzağılarda güvenlilik ve etkinlik çalışmaları yapıldı. Aşılamanın etkinliği antikor varlığında gösterilmemiştir. Anneden gelen antikorların varlığı, bağışıklık yanıtıyla üretilen antikorun oranını azaltabilir. Anneden gelen antikorların mevcut olması halinde ilk aşının (primovaksinasyon) planlanması buna göre yapılmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

(iii) Diğer uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Aşılamanın ardından enjeksiyon yerinde şişlik oluşması çok sık gözlenmektedir. Bu şişlik ağrı yapabilir ve çapı 10 cm'yi bulabilir. Genellikle aşılamayı izleyen 6 hafta içinde yavaş yavaş küçülür ve ardından kaybolur.
Vücut sıcaklığında geçici bir artış yaşanması da sık karşılaşılan etkilerden biridir, bu artış ikinci enjeksiyondan sonra biraz daha yüksek olmaktadır (maksimum 1,5°C) ve aşılamadan sonra 3 gün devam edebilir. Aşılamadan sonra, anafilaktik türde reaksiyonlar çok nadiren de olsa meydana gelebilir. Bu tür durumlarda, uygun bir semptomatik tedavi uygulanabilir.
Yan etki sıklığının bildirilmesinde aşağıdaki çevrim kullanılır:
- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım
Söz konusu veteriner tıbbi ürünü; gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
Bu veteriner tıbbi ürünün başka bir veteriner tıbbi ürünle birlikte kullanıldığında güvenli ve etkin olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun sonucunda, bu aşıyı başka bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı vaka bazında alınmalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Deri altına (subkütan) uygulama yolu.
2 ml'lik bir doz deri altına uygulanır.
Kullanmadan önce, iyice çalkalayınız ve 15°C ile 25°C arasında bir sıcaklığa getiriniz.
İlk aşılama:
Bağışıklık kazanmamış annelerden doğan buzağılar: 2 haftalıktan itibaren üç hafta arayla 2'şer doz uygulanır.

Bağışıklık kazanmış annelerden doğan veya annenin bağışıklığı hakkında bilgi sahibi olunmayan durumlarda buzağılar için aşılama programı veteriner hekimin takdirine göre belirlenir; veteriner hekim, anneden gelen antikorların aşılama yanıtıyla olan potansiyel etkileşimini hesaba katar.
Hatırlatma (Rapel) Aşılaması:
İlk aşılama protokolünün sona ermesinden 6 ay sonra bir doz uygulanır.
Hatırlatma aşısının etkinliği serolojik yanıtın ölçülmesiyle gösterilmiştir; virüs sınaması yoluyla değerlendirilmemiştir.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Bölüm 4.6'da bahsi geçenler dışında başka herhangi bir istenmeyen etki gözlemlenmemiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Sıfır gün.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Bovidler için immünolojik ürünler, sığırlar için inaktif virüs ve bakteri aşıları.
ATC-vet kodu: QI02AL
Bu aşı, sığır sinsityal solunum virüsü, parainflüenza 3 virüsü ve *Mannheimia haemolytica*'ya karşı aktif bağışıklığı indükler.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Alüminyum hidroksit
Quillaia saponinleri (Quil A)
Tiyomersal
Formaldehit
Sodyum klorür
Enjeksiyonluk preparatlar için su

6.2 Geçimsizlikler
Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırmayınız.

6.3 Raf ömrü
Veteriner tıbbi ürünün satış için hazır ambalajlanmış vaziyetteki raf ömrü: 24 ay.
Birincil ambalajın açılmasından sonraki ömrü: 10 saat.

6.4 Muhafaza şartları
2°C-8°C arasındaki sıcaklıklarda ışıktan koruyarak buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Birincil ambalaj ilk kez açıldıktan sonra, 10 saat süre ile, 2°C - +8°C arasındaki sıcaklıklarda, buzdolabında saklayınız, dondurmayınız.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu
10 ml Tip I cam flakon, 10 ml, 50 ml ve 100 ml Tip II cam flakon ya da 10 ml, 50 ml ve 100 ml ambalaj büyüklüğüne sahip plastik (HDPE) flakonlar, ağzı delinebilir kauçuk klorobütil tıpalar ile kapatılmış ve geçme kapaklı ya da geçme kapaksız alüminyum kapaklarla kapatılmış olarak; 1 x

10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml karton kutularda ya da 10 x 10 ml karton kutuda ya da 10 x 10 ml, 10 oyuklu, kapağı bulunan plastik kutularda sunulmaktadır.
Mevcut ambalaj büyüklüklerinin hepsi piyasaya arz edilmeyebilir.
Özellikle saha koşullarında; kauçuk tıpanın ilk delinmesinden sonra içeriğin kirlenmesi nedeniyle, çoklu doz ambalajların içeriğinin kauçuk tıpanın ilk delinmesinden sonra en geç 10 saat içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Tekrarlanan delme sonrasında, aşı kontaminasyonu riski artar, ancak yine de aşı, tekrarlanan delme simülasyonundan sonra tüm parametrelere uymuştur.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Esentepe Mah. Harman 1 Sokak NidaKule Levent No: 7-9 Kat:15/16 Şişli-İstanbul
Tel. : +90 212 329 11 00
Faks : +90 212 329 11 01

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

-

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:10.03.2025

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanır

BOVALTO RESPI 3

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Sığırlarda Mannheimia haemolytica tip A1 enfeksiyonlarına, Sığır Sinsityal Solunum Virüsüne (BRSV) ve Sığır Parainfluenza 3 Virüsüne (PI3V) (solunum yolu hastalığı etkeni) karşı inaktif aşı.

BİLEŞİMİ

Her 2 ml doz aşının içeriği:

Etkin maddeler:

İnaktive edilmiş sığır sinsityal solunum virüsü, BIO-24 suşu……..	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş sığır parainflüenza 3 virüsü, BIO-23 suşu…….....	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş *Mannheimia haemolytica*, serotip A1, DSM 5283 suşu.	PR * ≥ 1

Adjuvan(lar):

Alüminyum hidroksit……..	8,00 mg
Quillaia (Quil A) saponinleri …….	0,40 mg

* Hedef türde virülans sınamasını başarıyla geçen bir aşı serisiyle kobayların aşılanmasının ardından elde edilen referans serum ile karşılaştırmalı bağıl potans (PR).

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER

Bu aşı, sığır sinsityal solunum virüsü, parainflüenza 3 virüsü ve *Mannheimia haemolytica (serotip A1)* 'ya karşı aktif bağışıklığı indükler.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Sığırlarda:

Anneden gelen antikorların mevcut olmadığı durumlarda aşağıdakilere karşı aktif bağışıklık sağlar:

- Enfeksiyon nedeniyle virüs atılımını azaltmak için parainflüenza 3 virüsü
- Enfeksiyon nedeniyle virüs atılımını azaltmak için sığır sinsityal solunum virüsü
- Klinik belirtileri ve akciğer lezyonlarını azaltmak için *Mannheimia haemolytica* serotip A1

Bağışıklık başlayıncaya kadar geçen süre: 3 hafta

Bağışıklık süresi: 6 ay

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Deri altı (SC) uygulama yolu.

2 ml'lik bir doz deri altına uygulanır.

Kullanmadan önce, iyice çalkalayınız ve 15°C ile 25°C arasında bir sıcaklığa getiriniz.

İlk aşılama:

Bağışıklık kazanmamış annelerden doğan buzağılar: 2 haftalıktan itibaren üç hafta arayla 2'şer doz uygulanır.

Bağışıklık kazanmış annelerden doğan veya annenin bağışıklığı hakkında bilgi sahibi olunmayan durumlarda buzağılar için aşılama programı veteriner hekimin takdirine göre belirlenir; veteriner hekim, anneden gelen antikorların aşılama yanıtıyla olan potansiyel etkileşimini hesaba katar.

Hatırlatma (Rapel) Aşılaması:

İlk aşılama protokolünün sona ermesinden 6 ay sonra bir doz uygulanır.

Hatırlatma aşısının etkinliği serolojik yanıtın ölçülmesiyle gösterilmiştir; virüs sınaması yoluyla değerlendirilmemiştir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Yalnızca sağlıklı hayvanları aşılayınız.
Seronegatif buzağılarda güvenlilik ve etkinlik çalışmaları yapılmıştır. Aşılamanın etkinliği antikor varlığında gösterilmemiştir. Anneden gelen antikorların varlığı, bağışıklık yanıtıyla üretilen antikorun oranını azaltabilir. Anneden gelen antikorların mevcut olması halinde ilk aşının (primovaksinasyon) planlanması buna göre yapılmalıdır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Söz konusu veteriner tıbbi ürün gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşılamanın ardından enjeksiyon yerinde şişlik oluşması çok sık gözlenmektedir. Bu şişlik ağrı yapabilir ve çapı 10 cm'yi bulabilir. Genellikle aşılamayı izleyen 6 hafta içinde yavaş yavaş küçülür ve ardından kaybolur.
Vücut sıcaklığında geçici bir artış yaşanması da sık karşılaşılan etkilerden biridir, bu artış ikinci enjeksiyondan sonra biraz daha yüksek olmaktadır (maksimum 1,5°C) ve aşılamadan sonra 3 gün devam edebilir. Aşılamadan sonra, anafilaktik türde reaksiyonlar çok nadiren de olsa meydana gelebilir. Bu tür durumlarda, uygun bir semptomatik tedavi uygulanabilir.
Yan etki sıklığının bildirilmesinde aşağıdaki çevrim kullanılır:

- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu veteriner tıbbi ürünün başka bir veteriner tıbbi ürünle birlikte kullanıldığında güvenli ve etkin olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun sonucunda, bu aşıyı başka bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı vaka bazında alınmalıdır.
Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırmayınız.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

"İstenmeyen Etkiler" başlığı altında verilenler dışında başka herhangi bir advers reaksiyon gözlemlenmemiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır gün.

KONTRENDİKASYONLAR

Bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Aşıyı kazara kendinize enjekte etmeniz hâlinde derhal tıbbi yardıma başvurun ve ürünün kullanma talimatını veya etiketini doktorunuza gösterin.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
+2°C - +8°C arasındaki sıcaklıklarda ışıktan koruyarak buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanma talimatlarına göre açıldıktan sonra 10 saat içinde kullanılmalıdır ve +2°C - +8°C arasındaki sıcaklıklarda ışıktan koruyarak buzdolabında, dondurmadan saklanmalıdır.
Özellikle saha koşullarında; kauçuk tıpanın ilk delinmesinden sonra içeriğin kirlenmesi nedeniyle, çoklu doz ambalajların içeriğinin kauçuk tıpanın ilk delinmesinden sonra en geç 10 saat içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Tekrarlanan delme sonrasında, aşı kontaminasyonu riski artar, ancak yine de aşı, tekrarlanan delme simülasyonundan sonra tüm parametrelere uymuştur.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Hedef olmayan türler için herhangi bir veri bulunmamaktadır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
10 ml Tip I cam flakon, 10 ml, 50 ml ve 100 ml Tip II cam flakon ya da 10 ml, 50 ml ve 100 ml ambalaj büyüklüğüne sahip plastik (HDPE) flakonlar, ağzı delinebilir kauçuk klorobütil tıpalar ile kapatılmış ve geçme kapaklı ya da geçme kapaksız alüminyum kapaklarla kapatılmış olarak; 1 x 10 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml karton kutularda ya da 10 x 10 ml karton kutuda ya da 10 x 10 ml, 10 oyuklu, kapağı bulunan plastik kutularda sunulmaktadır. Mevcut ambalaj büyüklüklerinin hepsi piyasaya arz edilmeyebilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 10.03.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 10.03.2025

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sokak NidaKule Levent No: 7-9 Kat:15/16 Şişli-İstanbul
Tel. : +90 212 329 11 00 Faks : +90 212 329 11 01

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Bioveta a.s.
Komenského 212/12 Ivanovice na Hané, 683 23 Çek Cumhuriyeti

Asgari iç ambalaj etiketi – Enjeksiyonluk Süspansiyon (5 dozluk 1 flakon / 10 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BOVALTO RESPI 3
Enjeksiyonluk Süspansiyon.
Deri altına
Sığırlar için
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
5 doz
Boehringer Ingelheim
Seri No:
SKT:

Asgari iç ambalaj etiketi – Enjeksiyonluk Süspansiyon (5 dozluk 10 flakon / 10 x 10 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BOVALTO RESPI 3
Enjeksiyonluk Süspansiyon.
Deri altına
Sığırlar için
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
5 doz
Boehringer Ingelheim
Seri No:
SKT:

Asgari iç ambalaj etiketi – Enjeksiyonluk Süspansiyon (25 dozluk 1 flakon / 50 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BOVALTO RESPI 3
Enjeksiyonluk Süspansiyon.
Sığırlarda Mannheimia haemolytica tip A1 enfeksiyonlarına, Sığır Sinsityal Solunum Virüsüne (BRSV) ve Sığır Parainfluenza 3 Virüsüne (PI3V) (solunum yolu hastalığı etkeni) karşı inaktif aşı.

BİLEŞİMİ
Her 2 ml doz aşının içeriği:

Etkin maddeler:	
İnaktive edilmiş sığır sinsityal solunum virüsü, BIO-24 suşu……..	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş sığır parainflüenza 3 virüsü, BIO-23 suşu…….....	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş *Mannheimia haemolytica*, serotip A1, DSM 5283 suşu.	PR * ≥ 1
Adjuvan(lar):	
Alüminyum hidroksit……..	8,00 mg
Quillaia (Quil A) saponinleri …….	0,40 mg

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
2 ml'lik bir doz deri altına uygulanır.
Kullanmadan önce, iyice çalkalayınız ve 15°C ile 25°C arasında bir sıcaklığa getiriniz.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
25 doz
Boehringer Ingelheim Seri No: SKT:

Asgari iç ambalaj etiketi – Enjeksiyonluk Süspansiyon (50 dozluk 1 flakon / 100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
BOVALTO RESPI 3
Enjeksiyonluk Süspansiyon.
Sığırlarda Mannheimia haemolytica tip A1 enfeksiyonlarına, Sığır Sinsityal Solunum Virüsüne (BRSV) ve Sığır Parainfluenza 3 Virüsüne (PI3V) (solunum yolu hastalığı etkeni) karşı inaktif aşı.

BİLEŞİMİ
Her 2 ml doz aşının içeriği:
Etkin maddeler:

İnaktive edilmiş sığır sinsityal solunum virüsü, BIO-24 suşu……..	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş sığır parainflüenza 3 virüsü, BIO-23 suşu…….....	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş *Mannheimia haemolytica*, serotip A1, DSM 5283 suşu.	PR * ≥ 1

Adjuvan(lar):

Alüminyum hidroksit……..	8,00 mg
Quillaia (Quil A) saponinleri …….	0,40 mg

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
2 ml'lik bir doz deri altına uygulanır.
Kullanmadan önce, iyice çalkalayınız ve 15°C ile 25°C arasında bir sıcaklığa getiriniz.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
50 doz
Boehringer Ingelheim
Seri No: SKT:

Dış Ambalaj Etiketi – (5 dozluk 1 flakon / 10 ml, 5 dozluk 10 flakon / 10x10 ml, 25 dozluk 1 flakon / 50 ml, 50 dozluk 1 flakon / 100 ml)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanır

BOVALTO RESPI 3

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Sığırlarda Mannheimia haemolytica tip A1 enfeksiyonlarına, Sığır Sinsityal Solunum Virüsüne (BRSV) ve Sığır Parainfluenza 3 Virüsüne (PI3V) (solunum yolu hastalığı etkeni) karşı inaktif aşı.

BİLEŞİMİ

Her 2 ml doz aşının içeriği:

Etkin maddeler:

İnaktive edilmiş sığır sinsityal solunum virüsü, BIO-24 suşu……..	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş sığır parainflüenza 3 virüsü, BIO-23 suşu…….....	PR * ≥ 1
İnaktive edilmiş *Mannheimia haemolytica*, serotip A1, DSM 5283 suşu.	PR * ≥ 1

Adjuvan(lar):

Alüminyum hidroksit……..	8,00 mg
Quillaia (Quil A) saponinleri …….	0,40 mg

* Hedef türde virülans sınamasını başarıyla geçen bir aşı serisiyle kobayların aşılanmasının ardından elde edilen referans serum ile karşılaştırmalı bağıl potans (PR).

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Sığırlarda:

Anneden gelen antikorların mevcut olmadığı durumlarda aşağıdakilere karşı aktif bağışıklık sağlar:

- Enfeksiyon nedeniyle virüs atılımını azaltmak için parainflüenza 3 virüsü
- Enfeksiyon nedeniyle virüs atılımını azaltmak için sığır sinsityal solunum virüsü
- Klinik belirtileri ve akciğer lezyonlarını azaltmak için *Mannheimia haemolytica* serotip A1

Bağışıklık başlayıncaya kadar geçen süre: 3 hafta

Bağışıklık süresi: 6 ay

KULLANIM ŞEKLİ

Deri altına uygulanır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

+2°C - +8°C arasındaki sıcaklıklarda ışıktan koruyarak buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanma talimatlarına göre açıldıktan sonra 10 saat içinde kullanılmalıdır.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 10.03.2025

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. Esentepe Mah. Harman 1 Sokak NidaKule Levent No: 7-9 Kat:15/16 Şişli-İstanbul

ÜRETİM YERİ VE ADRESİ
Bioveta a.s.
Komenského 212/12 Ivanovice na Hané, 683 23 Çek Cumhuriyeti

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil Sa. Fi.: