# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

## 1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
Bovilis INtranasal RSP Live Burun Spreyi İçin Süspansiyonluk Liyofilizat ve Çözücüsü

## 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her bir doz aşı (2 ml);

| Madde adı | Doz başına miktar | Fonksiyon | Referans |
|---|---|---|---|
| Bovine Respiratuar Sinsityal Virüs (BRSV)<br>Jencine-2013 suşu | 5.0 – 7.0 $\log_{10}$ $TCID_{50}$* | Antijen | 2.C.2.1.a |
| Parainfluenza virüsü Tip 3 (PI3)<br>INT2-2013 suşu | 4.8 – 7.3 $\log_{10}$ $TCID_{50}$* | Antijen | 2.C.2.1.b. |

* %50 Doku kültürü enfektif dozu

## 3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Burun Spreyi İçin Süspansiyonluk Liyofilizat ve Çözücüsü
Liyofilizat: kırık beyaz veya krem renkli küspe
Çözücü: Berrak renksiz çözelti.

## 4. KLİNİK ÖZELLİKLER
### 4.1 Hedef tür
Sığırlar

### 4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
BRSV ve PI3 enfeksiyonundan kaynaklanan solunum yolu hastalığının klinik belirtilerinin ve viral saçılımın azaltılması amacıyla doğduğu günden itibaren buzağıların aktif immünizasyonu için kullanılır.
Bağışıklığın başlangıcı: BRSV: 5 gün, PI3: 1. Hafta
Bağışıklık süresi: 12 hafta

### 4.3 Kontrendikasyonlar
Yoktur.

### 4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
Hayvanlar tercihen bir stres döneminden veya artan enfeksiyon baskısından en azından 5-7 gün önce aşılanmalıdır.
BRSV'ye karşı etkinlik maternal antikorların varlığı sebebiyle azalabilir.

### 4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
**(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar**
Aşılı hayvanlar aşılamadan sonraki 12 güne kadar aşı suşlarını saçabilirler.
Sürüdeki tüm buzağıların aşılanması önerilmektedir.

**(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar**
Bulunmamaktadır.

**(iii) Diğer uyarılar**

---

**4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)**
Aşılamadan sonraki iki gün boyunca hafif ve geçici bir burun akıntısı çok yaygın olarak görülebilir.
Hafif ve geçici spontan öksürük yaygın şekilde görülebilir ve normal olarak üç gün içerisinde iyileşir.
Hafif ve geçici bir göz akıntısı yaygın şekilde görülebilir ve normal olarak üç gün içerisinde iyileşir.
Solunum hızında geçici bir artış görülebilir ve normal olarak dört gün içerisinde iyileşir.
Aşılamayı takiben vücut sıcaklığında geçici ve önemsiz bir artış (çok nadiren 41.1ºC'ye kadar) görülebilir ve normal olarak dört gün içerisinde iyileşir.
Yan etkilerin sıklığı aşağıdaki kural kullanılarak tanımlanmaktadır:
-Çok yaygın (tedavi edilen 10 hayvanın 1'inden fazlasında görülen advers reaksiyonlar)
-Yaygın (tedavi edilen 100 hayvanın 1'inden fazla fakat 10'undan azında görülür)
-Yaygın olmayan (tedavi edilen 1000 hayvanın 1'inden fazla fakat 10'undan azında görülür)
-Seyrek (tedavi edilen 10,000 hayvanın 1'inden fazla fakat 10'undan azında görülür)
-Çok seyrek (izole vakalar da dahil olmak üzere, tedavi edilen 10,000 hayvanın 1'inden azında görülür)

**4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım**
Gebelik ve emzirme sırasında kullanmayın.

**4.8 Diğer ilaçlarla etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri**
Herhangi başka bir veteriner tıbbi ürünü ile birlikte kullanıldığı zaman güvenliliği ve etkililiğine dair hiç bir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla, bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürününden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında alınmalıdır.

**4.9 Dozaj ve kullanım yolu**
Buzağılar doğum gününden itibaren aşılanabilir.
Aşağıda tanımlanan şekilde liyofilizatı çözücü ile hazırlayın. Kullanım öncesinde liyofilizatın tamamen hazırlanmış olduğundan emin olun. Hazırlanan aşı kirli pembe ila pembe renkli bir süspansiyondur. Her hayvan için, her burun deliğinden 1 ml olmak üzere 2 ml sulandırılmış aşıdan oluşan tek bir doz uygulayın.
Sulandırma Talimatları:
Liyofilizatı uygun şekilde hazırlamak için, çözücüyü bir iğne ve şırınga kullanarak liyofilizatın olduğu flakona aktarın (1 doz için 2 ml, 5 doz için 10 ml ve 10 doz için 20 ml; ayrıca aşağıdaki tabloya da bakın). Aşı flakonundaki vakum sayesinde şırınganın çok hızlı şekilde boşalması mümkün olur. Daha sonra çalkalayarak tekrar süspanse edin. Aşı süspansiyonu temiz uçlu bir şırıngaya çekilebilir. Şırıngada bulunan aşı artık, doğrudan doğruya şırınganın ucundan, uygulanmaya hazırdır. Bir püskürtme cihazına gerek yoktur. Hayvanlar aşılanırken patojenlerin bulaşmasını önlemek amacıyla şırınganın veya çok dozlu bir şırınganın uçlarının her hayvan için değiştirilmesi önerilir.

| Her flakondaki doz sayısı | Gerekli çözücü hacmi | Doz hacmi |
|---|---|---|
| 1 | 2 ml | 2 ml |
| 5 | 10 ml | 2 ml |
| 10 | 20 ml | 2 ml |

**4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar**
10 kat doz aşımında istenmeyen etkiler bölümünde tanımlanmış olanların dışında başka hiçbir etki gözlemlenmemiştir. Çok yüksek aşı dozajlarına (maksimum dozun 150 katı) maruz kalmış bazı buzağılarda orta derecede ila şiddetli solunum hastalığı belirtileri görülmüştür.

**4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dâhil)**
Sıfır gün.

## 5. İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Sığırlar için immünolojikler, canlı viral aşılar ATC-vet kodu: QI02AD07
Aşı BRSV ve PI3 virüsüne karşı aktif bağışıklığı uyarır.
Aşı anti-viral doğal bağışıklık yanıtlarında rol oynayan reseptörler ve sitokinleri uyarır.

## 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
**6.1 Yardımcı maddeler**
Liyofilizat:
Bazal B8 besiyeri
Hidrolize jelatin
Pankreatik kazein özütü
Sorbitol
Disodyum hidrojen fosfat dihidrat

Çözücü:
Sükroz
Potasyum dihidrojen fostat
Disodyum fosfat dihidrat
Sodyum klorür
Enjeksiyonluk su

**6.2 Geçimsizlikler**
Veteriner tıbbi ürünü ile kullanım için önerilen çözücü dışındaki başka hiçbir veteriner tıbbi ürünü ile karıştırmayınız.

**6.3 Raf ömrü**
Satışa sunulmuş haliyle liyofilizatın raf ömrü: 24 ay
Satış için ambalajlanmış (10 ml, 20 ml) çözücünün raf ömrü: 5 yıl.
Satış için ambalajlanmış (2 ml) çözücünün raf ömrü: 3 yıl.
Talimatlara göre sulandırma sonrası raf ömrü: 6 saat

**6.4 Muhafaza şartları**
Liyofilizat
Buzdolabında 2°C-8°C'de saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

Çözücü:
25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, liyofilizattan bağımsız olarak saklayınız. Dondurmayınız.

Ürün sulandırıldıktan sonra 22 ± 2°C'de saklanmalıdır.

**6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu**
Liyofilizat:
Halojenobütil lastik bir tıpa ve alüminyum bir kapakla kapatılmış, 1 (3 ml), 5 (10 ml) veya 10(20 ml) dozluk tip I cam flakon.

Çözücü:
Halojenobütil lastik bir tıpa ve alüminyum bir kapakla kapatılmış 2 ml'lik Tip I cam flakon, 10 ml veya 20 ml'lik Tip II cam flakon.

Paket büyüklükleri:
Aşağıdakileri içeren karton kutu:
- 1 doz liyofilizat + 2 ml çözücü
- 5 doz liyofilizat + 10 ml çözücü
- 10 doz liyofilizat + 20 ml çözücü
- 5 x 1 doz liyofilizat + 5 x 2 ml çözücü
- 5 x 5 doz liyofilizat + 5 x 10 ml çözücü
- 5 x 10 doz liyofilizat + 5 x 20 ml çözücü

Tüm ambalaj büyüklükleri piyasaya verilmeyebilir.

**6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler**
Kullanılmış olan veteriner tıbbi ürün ya da bu tür veteriner tıbbi ürünlerden kaynaklanan atık materyaller, yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

## 7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
İntervet Vet. İlaçları Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:199, Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394, Şişli, İstanbul

## 8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI
…….

## 9. PAZARLAMA İZNİ TARİHİ, GÜNCELLEME VE YENİLEME TARİHİ
17.04.2025

## 10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ
…….

**Prospektüs**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**
**Bovilis® INtranasal RSP Live**
BRSV ve PI3 Enfeksiyonlarına Karşı Canlı Aşı
*Burun Spreyi İçin Süspansiyonluk Liyofilizat ve Çözücüsü*

## BİLEŞİMİ
Her bir doz aşı (2 ml);
Canlı Bovine Respiratuar Sinsityal Virüs (BRSV), Jencine 2013 suşu: 5.0 – 7.0 $\log_{10}$ $TCID_{50}$*
Canlı Bovine Parainfluenza Virüs tip 3 (PI3), INT2-2013 suşu: 4.8 – 7.3 $\log_{10}$ $TCID_{50}$*
içermektedir.

* %50 Doku kültürü enfektif dozu

## İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: Sığırlar için immünolojikler, canlı viral aşılar ATC-vet kodu: QI02AD07
Aşı BRSV ve PI3 virüsüne karşı aktif bağışıklığı uyarır.
Aşı anti-viral doğal bağışıklık yanıtlarında rol oynayan reseptörler ve sitokinleri uyarır.

## KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
BRSV ve PI3 enfeksiyonundan kaynaklanan solunum yolu hastalığının klinik belirtilerinin ve viral saçılımın azaltılması amacıyla doğduğu günden itibaren buzağıların aktif immünizasyonu için kullanılır.
Bağışıklığın başlangıcı: BRSV: 5 gün, PI3: 1. Hafta
Bağışıklık süresi: 12 hafta

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İntranasal uygulanır.
Buzağılar doğum gününden itibaren aşılanabilir.
Aşağıda tanımlanan şekilde liyofilizatı çözücü ile hazırlayın. Kullanım öncesinde liyofilizatın tamamen hazırlanmış olduğundan emin olun. Hazırlanan aşı kirli pembe ila pembe renkli bir süspansiyondur. Her hayvan için, her burun deliğinden 1 ml olmak üzere 2 ml sulandırılmış aşıdan oluşan tek bir doz uygulayın.
Sulandırma Talimatları:
Liyofilizatı uygun şekilde hazırlamak için, çözücüyü bir iğne ve şırınga kullanarak liyofilizatın olduğu flakona aktarın (1 doz için 2 ml, 5 doz için 10 ml ve 10 doz için 20 ml; ayrıca aşağıdaki tabloya da bakın). Aşı flakonundaki vakum sayesinde şırınganın çok hızlı şekilde boşalması mümkün olur. Daha sonra çalkalayarak tekrar süspanse edin. Aşı süspansiyonu temiz uçlu bir şırıngaya çekilebilir. Şırıngada bulunan aşı artık, doğrudan doğruya şırınganın ucundan, uygulanmaya hazırdır. Bir püskürtme cihazına gerek yoktur.
Hayvanlar aşılanırken patojenlerin bulaşmasını önlemek amacıyla şırınganın veya çok dozlu bir şırınganın uçlarının her hayvan için değiştirilmesi önerilir.

| Her flakondaki doz sayısı | Gerekli çözücü hacmi | Doz hacmi |
|---|---|---|
| 1 | 2 ml | 2 ml |
| 5 | 10 ml | 2 ml |
| 10 | 20 ml | 2 ml |

## ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Aşılı hayvanlar aşılamadan sonraki 12 güne kadar aşı suşlarını saçabilirler.
Sürüdeki tüm buzağıların aşılanması önerilmektedir.
**Gebelik Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanımı:** Gebelik ve emzirme sırasında kullanmayın.

## İSTENMEYEN ETKİLER
Aşılamadan sonraki iki gün boyunca hafif ve geçici bir burun akıntısı çok yaygın olarak görülebilir.
Hafif ve geçici spontan öksürük yaygın şekilde görülebilir ve normal olarak üç gün içerisinde iyileşir.
Hafif ve geçici bir göz akıntısı yaygın şekilde görülebilir ve normal olarak üç gün içerisinde iyileşir.
Solunum hızında geçici bir artış görülebilir ve normal olarak dört gün içerisinde iyileşir.
Aşılamayı takiben vücut sıcaklığında geçici ve önemsiz bir artış (çok nadiren 41.1ºC'ye kadar) görülebilir ve normal olarak dört gün içerisinde iyileşir.
Yan etkilerin sıklığı aşağıdaki kural kullanılarak tanımlanmaktadır:
-Çok yaygın (tedavi edilen 10 hayvanın 1'inden fazlasında görülen advers reaksiyonlar)
-Yaygın (tedavi edilen 100 hayvanın 1'inden fazla fakat 10'undan azında görülür)
-Yaygın olmayan (tedavi edilen 1000 hayvanın 1'inden fazla fakat 10'undan azında görülür)
-Seyrek (tedavi edilen 10,000 hayvanın 1'inden fazla fakat 10'undan azında görülür)
-Çok seyrek (izole vakalar da dahil olmak üzere, tedavi edilen 10,000 hayvanın 1'inden azında görülür)

## İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Herhangi başka bir veteriner tıbbi ürünü ile birlikte kullanıldığı zaman güvenliliği ve etkililiğine dair hiç bir bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla, bu aşının başka bir veteriner tıbbi ürününden önce veya sonra kullanılması kararı vaka bazında alınmalıdır.

## DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
10 kat doz aşımında istenmeyen etkiler bölümünde tanımlanmış olanların dışında başka hiçbir etki gözlemlenmemiştir. Çok yüksek aşı dozajlarına (maksimum dozun 150 katı) maruz kalmış bazı buzağılarda orta derecede ila şiddetli solunum hastalığı belirtileri görülmüştür.

## GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
**İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Sıfır (0) gün.**

## KONTRENDİKASYONLAR
Yoktur.

## GENEL UYARILAR
**Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.**
**Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.**
**Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.**

## UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Bulunmamaktadır.

## MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Liyofilizat

Buzdolabında 2°C-8°C'de saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay

Çözücü:

25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, liyofilizattan bağımsız olarak saklayın. Dondurmayınız.
Satış için ambalajlanmış (10 ml, 20 ml) çözücünün raf ömrü: 5 yıl.
Satış için ambalajlanmış (2 ml) çözücünün raf ömrü: 3 yıl.
Talimatlara göre sulandırma sonrası raf ömrü: 6 saat
Ürün sulandırıldıktan sonra 22 ± 2°C'de saklanmalıdır.

## KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış olan veteriner tıbbi ürün ya da bu tür veteriner tıbbi ürünlerden kaynaklanan atık materyaller, yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir.

## TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Liyofilizat:
Halojenobütil lastik bir tıpa ve alüminyum bir kapakla kapatılmış, 1 (2 ml), 5 (10 ml) veya 10 (20 ml) dozluk tip I cam flakon.

Çözücü (Unisolve):
Halojenobütil lastik bir tıpa ve alüminyum bir kapakla kapatılmış 2 ml'lik Tip I cam flakon, 10 ml veya 20 ml'lik Tip II cam flakon.

Paket büyüklükleri:
Aşağıdakileri içeren karton kutu:
- 1 doz liyofilizat + 2 ml çözücü
- 5 doz liyofilizat + 10 ml çözücü
- 10 doz liyofilizat + 20 ml çözücü
- 5 x 1 doz liyofilizat + 5 x 2 ml çözücü
- 5 x 5 doz liyofilizat + 5 x 10 ml çözücü
- 5 x 10 doz liyofilizat + 5 x 20 ml çözücü

Tüm ambalaj büyüklükleri piyasaya verilmeyebilir.

## PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 17.04.2025

## T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:----

## PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 Şişli/ İstanbul

## ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, Boxmeer, 5831AN, Hollanda

**Dış Ambalaj Metni**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**
**Bovilis® INtranasal RSP Live**
BRSV ve PI3 Enfeksiyonlarına Karşı Canlı Aşı
*Burun Spreyi İçin Süspansiyonluk Liyofilizat ve Çözücüsü*

## BİLEŞİMİ
Her bir doz aşı (2 ml);
Canlı Bovine Respiratuar Sinsityal Virüs (BRSV), Jencine 2013 suşu: 5.0 – 7.0 $\log_{10}$ $TCID_{50}$*
Canlı Bovine Parainfluenza Virüs tip 3 (PI3), INT2-2013 suşu: 4.8 – 7.3 $\log_{10}$ $TCID_{50}$* içermektedir.
* %50 Doku kültürü enfektif dozu

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İntranasal yolla 2 ml olarak uygulanır.

**Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.**
**Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.**

## MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Liyofilizat
Buzdolabında 2°C-8°C'de saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.
Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 24 ay
Çözücü:
25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, liyofilizattan bağımsız olarak saklayın. Dondurmayınız.
Satış için ambalajlanmış (10 ml, 20 ml) çözücünün raf ömrü: 5 yıl.
Satış için ambalajlanmış (2 ml) çözücünün raf ömrü: 3 yıl.
Talimatlara göre sulandırma sonrası raf ömrü: 6 saat
Ürün sulandırıldıktan sonra 22 ± 2°C'de saklanmalıdır.

## GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
**İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Sıfır (0) gün.**

## T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 17.04.2025

## PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Intervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe mah. Büyükdere cad. No: 199 Levent 199 Ofis bloğu Kat:13-14-15 Şişli/ İstanbul

## ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ
Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, Boxmeer, 5831AN, Hollanda

Seri No:
Üretim Ta.:
Son Kul. Ta.:
KDV Dahil Fiyat:

**İç Ambalaj Metni**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**
**Bovilis® INtranasal RSP Live**
BRSV ve PI3 Enfeksiyonlarına Karşı Canlı Aşı
*Burun Spreyi İçin Süspansiyonluk Liyofilizat*

**Bileşimi:** Her bir doz aşı, BRSV, Jencine 2013 suşu: 5.0-7.0 $\log_{10}$ $TCID_{50}$* ve PI3 virüsü, INT2-2013 suşu: 4.8 – 7.3 $\log_{10}$ $TCID_{50}$* içermektedir.
* %50 Doku kültürü enfektif dozu

**Kullanım Şekli ve Dozu:** İntranasal yolla 2 ml olarak uygulanır.

Seri no:
Üretim ta.:
Son kul. ta.:

**Dilüent Etiketi (2 ml)**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**
**Unisolve®**
*Liyofilize Aşı İçin Çözücü*

**BİLEŞİMİ**
Sükroz
Potasyum dihidrojen fostat
Disodyum fosfat dihidrat
Sodyum klorür
Enjeksiyonluk su

**Raf Ömrü:** 3 yıl.
25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, liyofilizattan bağımsız olarak saklayınız.
Dondurmayınız.
**Kullanmadan önce ürüne ait prospektüsü okuyunuz.**

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**
İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Şişli/İstanbul

**ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ**
Intervet International B.V.
Boxmeer, Hollanda

Seri no:
Son kul. ta.:

**Dilüent Etiketi (10 ml, 20 ml)**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**

**Unisolve®**

*Liyofilize Aşı İçin Çözücü*

**BİLEŞİMİ**

Sükroz
Potasyum dihidrojen fostat
Disodyum fosfat dihidrat
Sodyum klorür
Enjeksiyonluk su

**Raf Ömrü:** 5 yıl.
25°C'nin altında, buzdolabına konulmadan, liyofilizattan bağımsız olarak saklayınız.
Dondurmayınız.
**Kullanmadan önce ürüne ait prospektüsü okuyunuz.**

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**

İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd. Şti
Şişli/İstanbul

**ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ**

Intervet International B.V.
Boxmeer, Hollanda

Seri no:
Son kul. ta.: