ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBI ÜRÜNÜN İSMİ

Bovilis Rotavec Corona Enjeksiyonluk Emülsiyon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

2 ml içeriği:

Etkin madde:

Bovine Rotavirus, UK-Compton suşu, serotip G6 P5 (inaktif)	≥ 874 U[1]
Bovine Coronavirus, Mebus suşu (inaktif)	≥ 340 U[2]
E. coli F5 (K99) + F41 adhezin	≥ 560 U[3]

[1] BRV potens ELISA'da belirlenen birimler
[2] BCV potens ELISA'da belirlenen birimler
[3] *E. coli* F5 (K99) potens ELISA'da belirlenen birimler

Adjuvanlar:

Hafif mineral yağ/emülsifiyer	1.40 ml
Alüminyum hidroksit	2.45 – 3.32 mg

Yardımcı madde(ler):

Koruyucu madde

Tiyomersal.....	0.032 – 0.069 mg
Formaldehit	≤ 0.34 mg

Yardımcı maddelerin tam listesi için 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL

Enjeksiyonluk Emülsiyon
Kırık beyaz emülsiyon.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 **Hedef tür**

Sığır (gebe inekler ve düveler)

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı

Gebe inek ve düvelerde *E. coli* adhezinleri F5 (K99) ve F41, rotavirüs ve koronavirüs etkenlerine karşı antikor titrelerini yükselterek aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılır. Buzağılar, yaşamın ilk iki ila dördüncü haftasında aşılanmış kolostrum ile beslenirken, bu antikorların şunları sağladığı gösterilmiştir:

- E. coli F5 (K99) ve F41'in neden olduğu ishalin şiddetini azaltmak,
- Rotavirüsün neden olduğu bulaşma insidansını azaltmak,
- Rotavirüs veya koronavirüs ile enfekte buzağıların virüs saçılımını azaltmak.

Bağışıklığın Başlaması: Tüm aktif maddelere karşı pasif koruma, kolostrum beslemesinin başlangıcından itibaren başlayacaktır.
Bağışıklık Süresi: Yapay olarak havuzlanmış kolostrum ile beslenen buzağılarda, kolostrum beslemesi sona erene kadar koruma devam edecektir. Doğal olarak emzirilen buzağılarda rotavirüse karşı koruma en az 7 gün, koronavirüse karşı ise en az 14 gün devam edecektir.

4.3 Kontraendikasyonlar
Bilinmemektedir.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

4.5 Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar

(i) Hayvanlarda Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar
Geçerli değildir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Kullanıcının dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Kazara insana enjeksiyon şiddetli ağrı ve şişliğe neden olabilir, özellikle enjeksiyon eklem içine veya parmağa yapılmışsa acilen medikal tedavi uygulanmayanlarda nadiren de olsa etkilenen parmağın kaybı söz konusu olabilir. Kazara insana enjeksiyon durumunda, enjeksiyon miktarı çok az olsa bile, ürünün etiketi ve prospektüsü ile birlikte acilen medikal tedavi alınması önerilir. Medikal tedaviden 12 saat sonra bile ağrı geçmemişse tekrar tedavi alınmalıdır."
Doktorun dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Küçük miktarlarda enjekte edilse bile kazara insana yapılan enjeksiyonlar şiddetli şişmeye ve bunun sonucunda iskemik nekroza ve parmağın kaybına neden olabilir. Acilen cerrahi bakım gereklidir ve özellikle parmak pulpası veya tendona yayılım varsa enjeksiyon bölgesinin acilen ensizyonu ve irrigasyonu gerekebilir.

(iii) Diğer uyarılar
Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Güvenlik ve klinik çalışmalar sırasında enjeksiyon bölgesinde çok yaygın olarak 1 cm'ye kadar kabarık yumuşak bir şişlik gözlenmiştir. Bu şişlikler genellikle 14 ila 21 gün içinde emilir.
Çok nadir durumlarda spontan farmakovijilans raporlarında aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda adrenalin gibi uygun tedavi gecikmeden uygulanmalıdır.
Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki kural kullanılarak tanımlanır:

- Çok yaygın (10 hayvanda 1'den fazla)
- Yaygın (100 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Yaygın olmayan (1.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Seyrek (10.000 hayvanda 1'den fazla fakat 10'dan az)
- Çok seyrek (10,000 hayvanda 1'den az)

4.7 Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı

Bu aşı gebelik sırasında kullanılabilir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

Bu aşının diğer herhangi bir veteriner tıbbi ürün ile kullanım güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu aşıyı diğer her tür veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı her bir vaka için bağımsız olarak değerlendirilerek alınmalıdır.

4.9 Dozaj ve Kullanım yolu

Kas içi kullanım.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Şırıngalar ve iğneler kullanımdan önce sterilize edilmeli ve enjeksiyon kontaminasyona karşı önlem alınarak temiz, kuru bir cilt alanından yapılmalıdır. Aşının kontaminasyonuna karşı sıkı önlemler alınmalıdır. Tıpanın aşırı delinmesini önlemek için çok dozlu bir şırınga kullanılması önerilir. Bir şişe ilk kez açıldıktan sonra, sonraki 28 gün boyunca bir kez daha kullanılabilir ve bu kullanımdan hemen sonra imha edilebilir.

<u>Uygulama:</u>

Hayvan başına 2 ml'lik tek bir doz uygulayın. Önerilen enjeksiyon bölgesi boynun yan tarafıdır. Her hamilelikte buzağılama beklenmeden 12 ila 3 hafta önce tek bir enjeksiyon yapılmalıdır.

<u>Kolostrum beslemesi:</u>

Buzağıların korunması, buzağılar kendi bağışıklıklarını geliştirene kadar yaşamın ilk 2-3 haftası boyunca bağırsakta kolostrum antikorlarının (aşılanmış) fiziksel varlığına bağlıdır. Bu nedenle, aşılamanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için bu sürenin tamamı boyunca yeterli kolostrum beslemesinin sağlanması esastır. Tüm buzağılar doğumdan sonraki 6 saat içinde annelerinden yeterli kolostrum almalıdır. Emzirilen buzağılar, aşılanmış ineklerden doğal olarak yeterli kolostrum almaya devam edecektir.

Süt sürüsünde, aşılanmış ilk 6 - 8 sağımından elde edilen kolostrum/süt havuzlanmalıdır. Kolostrum 20 °C'nin altında saklanabilir, ancak 28 gün saklandıktan sonra immünoglobulin seviyeleri %50'ye kadar düşebileceğinden mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Mümkünse 4 °C'de saklanması önerilir. Buzağılar, yaşamın ilk iki haftası boyunca günde 2½ ila 3½ litre (vücut büyüklüğüne göre) oranında bu havuzdan beslenmelidir.

Bütün bir sürü aşılama politikası benimsenirse optimal sonuçlar elde edilecektir. Bu, buzağılarda enfeksiyon seviyesinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan virüs atılımının minimumda tutulmasını ve sonuç olarak çiftlikteki genel hastalık tehdidi seviyesinin en aza indirilmesini sağlayacaktır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)

Önerilen dozun iki katından fazla olmayan bir kas içi enjeksiyonun uygulanmasında, tek bir dozun uygulanmasından daha şiddetli olmayan bir reaksiyon meydana gelebilir.

4.11 Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Kalıntı Uyarıları

Sıfır gün.

5 İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Sığırlar için inaktive viral ve inaktive bakteriyel aşılar.
ATCvet kodu: QI02AL01
Aşı, A grubundan bir rotavirüs (serotip G6 P5), bir koronavirüs ve *Escherichia coli* F5(K99)-F41 pilus antijenleri içerir. Bu bileşenler inaktive edilir ve mineral yağ ve alüminyum hidroksit ile adjuvanlaştırılır.
Aşı, döllere aktif maddelere karşı pasif bağışıklık sağlamak için aktif bağışıklığı uyarmayı amaçlamaktadır.
Tüm aktif maddelere karşı pasif koruma, kolostrum beslemesinin başlangıcından itibaren başlayacaktır. Yapay olarak havuzlanmış kolostrum ile beslenen buzağılarda, kolostrum beslemesi sona erene kadar koruma devam edecektir. Doğal olarak emzirilen buzağılarda rotavirüse karşı koruma en az 7 gün, koronavirüse karşı ise en az 14 gün devam edecektir.

6 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler

Hafif mineral yağ (Emülsifiyer)
Alüminyum hidroksit
Tiyomersal
Formaldehit
Sodyum tiyosülfat
Sodyum klorid

6.2 Geçimsizlikler

Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü

Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.
İlk açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün.
Şişenin içeriği, tıpanın ilk delinmesinden sonra 28 günden fazla kullanılmamalıdır.

6.4 Muhafaza Şartları

Buzdolabında 2-8 ºC'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Işıktan korunmalı ve dondurulmamalıdır. Tıpa delindikten ve ilk kullanımdan sonra, bir sonraki aşılamaya kadar dik olarak ve buzdolabında (2-8 ºC) muhafaza edilmelidir.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

2 ml (1 doz), 10 ml (5 doz), 40 ml (20 doz) ve 100 ml (50 doz) içeren halobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılan tip I cam şişeler ve 10 ml (5 doz), 40 ml (20 doz) ve 100 ml (50 doz) içeren halobütil ya da nitril klorobütil kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılan PET şişelerde sunulmaktadır.
Ambalaj boyutları:
10 x 2 ml'lik karton kutu (10 x 1 doz)
1 x 10 ml'lik karton kutu (5 doz)
1 x 40 ml'lik karton kutu (20 doz)

1 x 100 ml’lik karton kutu (50 doz)

Tüm ambalaj boyutları pazara sunulmamış olabilir.

6.6 Kullanılmamış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI ve ADRESİ

INTERVET Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd.Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394 Şişli/İSTANBUL

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI

03.06.2009

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ 22.01.2026

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Bovilis Rotavec Corona
Gebe inek ve düvelerde *E. coli* adhezinleri F5 (K99) ve F41, rotavirüs ve koronavirüs etkenlerine karşı aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılan inaktif aşı
Enjeksiyonluk Emülsiyon

BİLEŞİMİ

Alüminyum hidroksite adsorbe edilmiş, Bovine Rotavirus, UK-Compton suşu, serotip G6 P5, Bovine Coronavirus, Mebus suşu ve *E. coli* F5 (K99) + F41 adhezin içeren kırık beyaz inaktif enjeksiyonluk emülsiyon aşı. Koruyucu madde olarak her 2 ml'de 0.032-0.069 mg tiyomersal ve ≤ 0.34 mg formadehit içermektedir.

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakoterapötik grup: Sığırlar için inaktive viral ve inaktive bakteriyel aşılar.
ATCvet kodu: QI02AL01
Aşı, A grubundan bir rotavirüs (serotip G6 P5), bir koronavirüs ve *Escherichia coli* F5 (K99) + F41 pilus antijenleri içerir. Bu bileşenler inaktive edilir ve mineral yağ ve alüminyum hidroksit ile adjuvanlaştırılır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Gebe inek ve düvelerde *E. coli* adhezinleri F5 (K99) ve F41, rotavirüs ve koronavirüs etkenlerine karşı antikor titrelerini yükselterek aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılır. Buzağılar, yaşamın ilk iki ila dördüncü haftasında aşılanmış kolostrum ile beslenirken, bu antikorların şunları sağladığı gösterilmiştir:
- E. coli F5 (K99) ve F41'in neden olduğu ishalin şiddetini azaltmak,
- Rotavirüsün neden olduğu bulaşma insidansını azaltmak,
- Rotavirüs veya koronavirüs ile enfekte buzağıların virüs saçılımını azaltmak.

Bağışıklığın Başlaması: Tüm aktif maddelere karşı pasif koruma, kolostrum beslemesinin başlangıcından itibaren başlayacaktır.
Bağışıklık Süresi: Yapay olarak havuzlanmış kolostrum ile beslenen buzağılarda, kolostrum beslemesi sona erene kadar koruma devam edecektir. Doğal olarak emzirilen buzağılarda rotavirüse karşı koruma en az 7 gün, koronavirüse karşı ise en az 14 gün devam edecektir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi kullanım.
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Şırıngalar ve iğneler kullanımdan önce sterilize edilmeli ve enjeksiyon kontaminasyona karşı önlem alınarak temiz, kuru bir cilt alanından yapılmalıdır. Aşının kontaminasyonuna karşı sıkı önlemler alınmalıdır. Tıpanın aşırı delinmesini önlemek için çok dozlu bir şırınga kullanılması önerilir. Bir şişe ilk kez açıldıktan sonra, sonraki 28 gün boyunca bir kez daha kullanılabilir ve bu kullanımdan hemen sonra imha edilebilir.
Uygulama:
Hayvan başına 2 ml'lik tek bir doz uygulayın. Önerilen enjeksiyon bölgesi boynun yan tarafıdır. Her hamilelikte buzağılama beklenmeden 12 ila 3 hafta önce tek bir enjeksiyon yapılmalıdır.

Kolostrum beslemesi:

Buzağıların korunması, buzağılar kendi bağışıklıklarını geliştirene kadar yaşamın ilk 2-3 haftası boyunca bağırsakta kolostrum antikorlarının (aşılanmış) fiziksel varlığına bağlıdır. Bu nedenle, aşılamanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için bu sürenin tamamı boyunca yeterli kolostrum beslemesinin sağlanması esastır. Tüm buzağılar doğumdan sonraki 6 saat içinde annelerinden yeterli kolostrum almalıdır. Emzirilen buzağılar, aşılanmış ineklerden doğal olarak yeterli kolostrum almaya devam edecektir.

Süt sürüsünde, aşılanmış ilk 6 - 8 sağımından elde edilen kolostrum/süt havuzlanmalıdır. Kolostrum 20 °C'nin altında saklanabilir, ancak 28 gün saklandıktan sonra immünoglobulin seviyeleri %50'ye kadar düşebileceğinden mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Mümkünse 4 °C'de saklanması önerilir. Buzağılar, yaşamın ilk iki haftası boyunca günde 2½ ila 3½ litre (vücut büyüklüğüne göre) oranında bu havuzdan beslenmelidir.

Bütün bir sürü aşılama politikası benimsenirse optimal sonuçlar elde edilecektir. Bu, buzağılarda enfeksiyon seviyesinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan virüs atılımının minimumda tutulmasını ve sonuç olarak çiftlikteki genel hastalık tehdidi seviyesinin en aza indirilmesini sağlayacaktır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım: Bu aşı gebelik sırasında kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Güvenlik ve klinik çalışmalar sırasında enjeksiyon bölgesinde çok yaygın olarak 1 cm'ye kadar kabarık yumuşak bir şişlik gözlenmiştir. Bu şişlikler genellikle 14 ila 21 gün içinde emilir.

Çok nadir durumlarda spontan farmakovijilans raporlarında aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenmiştir. Bu gibi durumlarda adrenalin gibi uygun tedavi gecikmeden uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğer herhangi bir veteriner tıbbi ürün ile kullanım güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu aşıyı diğer her tür veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı her bir vaka için bağımsız olarak değerlendirilerek alınmalıdır.

Diğer veteriner tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Önerilen dozun iki katından fazla olmayan bir kas içi enjeksiyonun uygulanmasında, tek bir dozun uygulanmasından daha şiddetli olmayan bir reaksiyon meydana gelebilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Bilinmemektedir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Sıfır gün.

GENEL UYARILAR:
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Kullanıcının dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Kazara insana enjeksiyon şiddetli ağrı ve şişliğe neden olabilir, özellikle enjeksiyon eklem içine veya parmağa yapılmışsa acilen medikal tedavi uygulanmayanlarda nadiren de olsa etkilenen parmağın kaybı söz konusu olabilir. Kazara insana enjeksiyon durumunda, enjeksiyon miktarı çok az olsa bile, ürünün etiketi ve prospektüsü ile birlikte acilen medikal tedavi alınması önerilir. Medikal tedaviden 12 saat sonra bile ağrı geçmemişse tekrar tedavi alınmalıdır.
Doktorun dikkatine: Bu ürün mineral yağ içerir. Küçük miktarlarda enjekte edilse bile kazara insana yapılan enjeksiyonlar şiddetli şişmeye ve bunun sonucunda iskemik nekroza ve parmağın kaybına neden olabilir. Acilen cerrahi bakım gereklidir ve özellikle parmak pulpası veya tendona yayılım varsa enjeksiyon bölgesinin acilen ensizyonu ve irrigasyonu gerekebilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında 2-8 ºC'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Işıktan korunmalı ve dondurulmamalıdır.
Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.
İlk açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün.
Şişenin içeriği, tıpanın ilk delinmesinden sonra 28 günden fazla kullanılmamalıdır. Tıpa delindikten ve ilk kullanımdan sonra, bir sonraki aşılamaya kadar dik olarak ve buzdolabında (2-8 ºC) muhafaza edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ
2 ml (1 doz), 10 ml (5 doz), 40 ml (20 doz) ve 100 ml (50 doz) içeren halobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılan tip I cam şişeler ve 10 ml (5 doz), 40 ml (20 doz) ve 100 ml (50 doz) içeren halobütil ya da nitril klorobütil kauçuk tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılan PET şişelerde sunulmaktadır.
Ambalaj boyutları:
10 x 2 ml'lik karton kutu (10 x 1 doz)
1 x 10 ml'lik karton kutu (5 doz)
1 x 40 ml'lik karton kutu (20 doz)
1 x 100 ml'lik karton kutu (50 doz)

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmamış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 22.01.2026

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 03.06.2009

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

INTERVET Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd.Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

MSD Animal Health Danube Biotech GmbH
Brennaustraße 1 3500 Krems Avusturya
Serbest bırakma: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer, Hollanda

Dış Etiket (Kutu-tüm takdim şekilleri için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Bovilis Rotavec Corona

Gebe inek ve düvelerde *E. coli* adhezinleri F5 (K99) ve F41, rotavirüs ve koronavirüs etkenlerine karşı aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılan inaktif aşı

Enjeksiyonluk Emülsiyon

Alüminyum hidroksite adsorbe edilmiş, Bovine Rotavirus, UK-Compton suşu, serotip G6 P5, Bovine Coronavirus, Mebus suşu ve *E. coli* CN7985 suşu, serotip O101:K99:F41 içeren kırık beyaz inaktif enjeksiyonluk emülsiyon aşı. Koruyucu madde olarak her 2 ml'de 0.032-0.069 mg tiyomersal ve ≤ 0.34 mg formadehit içermektedir.

Gebe inek ve düvelerde *E. coli* adhezinleri F5 (K99) ve F41, rotavirüs ve koronavirüs etkenlerine karşı antikor titrelerini yükselterek aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılır.

Hayvan başına 2 ml'lik tek bir doz uygulayın. Önerilen enjeksiyon bölgesi boynun yan tarafıdır.

Her hamilelikte buzağılama beklenmeden 12 ila 3 hafta önce tek bir enjeksiyon yapılmalıdır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

KALINTI ARINMA SÜRESİ (i.k.a.s): Sıfır gün

Buzdolabında 2-8 ºC'de saklanmalı ve taşınmalıdır. Işıktan korunmalı ve dondurulmamalıdır.

Satış için ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 2 yıl.

İlk açıldıktan sonraki raf ömrü: 28 gün.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ - NO: 03.06.2009

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

INTERVET Veteriner İlaçları Paz. ve Tic. Ltd.Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Levent 199 Ofis Bloğu Kat:13, 34394 Şişli/İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

MSD Animal Health Danube Biotech GmbH

Brennaustraße 1 3500 Krems Avusturya

Serbest bırakma: Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer, Hollanda

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

PSF (KDV DAHİL):

İç Etiket (tüm takdim şekilleri için)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Bovilis Rotavec Corona
Gebe inek ve düvelerde *E. coli* adhezinleri F5 (K99) ve F41, rotavirüs ve koronavirüs etkenlerine karşı aktif bağışıklığı sağlamak için kullanılan inaktif aşı
Enjeksiyonluk Emülsiyon

2 ml içeriği:

Bovine Rotavirus, UK-Compton suşu, serotip G6 P5 (inaktif)	≥ 874 U
Bovine Coronavirus, Mebus suşu (inaktif)	≥ 340 U
E. coli CN7985 suşu, serotip O101:K99:F41	≥ 560 U

Adjuvanlar:

Hafif mineral yağ/emülsifiyer	1.40 ml
Alüminyum hidroksit	2.45 – 3.32 mg

Yardımcı madde(ler):

Koruyucu madde

Tiyomersal.....	0.032 – 0.069 mg
Formaldehit	≤ 0.34 mg

Uygulama: Kas içi kullanım.

SERİ NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ: