ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜNÜN İSMİ
CEVAC® IBD L – Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Her bir doz aşı içeriği:
Aktif maddeler:
Canlı, infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)
Patent Mavisi (El31) (Renklendirici)……..Max 5.5 µg
Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakın.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Oral süspansiyon için liyofilizat.
İçme suyunda sulandırılmaya yönelik mavi liyofilize toz.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Hedef tür
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Çok virülan infeksiyöz bursal hastalık virüsünün neden olduğu mortaliteyi, klinik belirtileri, kilo kaybını ve bursa Fabriciusdaki akut lezyonlarını azaltmak için kanatlı infeksiyöz bursal hastalığına (IBD, Gumboro hastalığı) karşı maternal kaynaklı antikorları bulunan etlik tavukların aktif bağışıklığı için kullanılır.
Bağışıklık başlangıcı: Aşılama sonrası 14 gün.
Bağışıklık süresi: Aşılama sonrası 27 gün.

4.3 Kontrendikasyonlar
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanabilir.
Klinik belirtileri olan infekte sürülerde kullanılmamalıdır.
Maternal kaynaklı antikorları (MDA) olmayan sürülerin aşılanması için kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Aşı, belirli koşullar altında immünosupresyona ve bursal hasara neden olduğu bilinen bir "intermediate-plus' virüs suşu içerir (KÜB'ün 4.5, 4.6 ve 5. bölümlerine bakınız). Sonuç olarak, aşı yalnızca maternal antikorlara sahip olan ve çok virülan IBD virüs suşlarına maruz kalan tavukların aşılanması için endikedir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bakılmaksızın 10 günlükten küçük kanatlıların aşılanması tavsiye edilmemektedir (bkz. bölüm 4.9).
Aşı, MDA'sı olmayan kanatlılara uygulandığında önemli ölçüde immünosupresyona ve bursal hasara neden olan 'intermediate-plus' bir virüs suşu içerir. Aşılanan kanatlılar aşı virüsünü salgılayabilir ve bu virüs daha sonra duyarlı kanatlılara yayılabilir. Aşı virüsünün yayılmasını önlemek için, sürüler arasında aşılama ekipmanları ve kümesler dezenfekte edilmelidir.

Ürün ancak çok virülan IBDV suşlarının aşılama alanında epidemiyolojik olarak ilgili olduğu kanıtlandıktan sonra kullanılmalıdır.
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Sürüdeki tüm kanatlılar aynı anda aşılanmalıdır.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar
Aşılama yapan personel, uygulamadan sonra ellerini ve ekipmanı yıkamalı ve dezenfekte etmelidir.
(iii) Diğer uyarılar
-

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)
Hedef türe (IBD virüsüne karşı maternal kaynaklı antikorları bulunan 10 günlükten büyük tavuklar) tek bir dozun uygulanmasını kapsayan güvenlilik çalışmalarına ilişkin veri bulunmamaktadır.

4.7 Gebelik, laktasyon veya yumurtlama döneminde kullanım
Yumurtacı veya damızlık tavuklarda kullanılmamalıdır.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri
Bu aşının diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanımının etkinliği ve güvenliği konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu aşıyı başka bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı vaka bazında verilmelidir.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).
Aşılamadan önceki 48 saat içerisinde ve aşılamadan sonraki 24 saat içerisinde içme suyunda dezenfektan bulunmamalıdır. Ayrıca bu dönemde içme suyunun klorlanmasından da kaçınılmalıdır.
Aşının hazırlanması ve uygulanması için kullanılan aletlerde dezenfektan kalıntısı bulunmamalıdır.

Suluklar aşılamadan önce iyice temizlenmelidir. Aşılama için kullanılan sulama sisteminin temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır.
Hayvanların yaşlarına ve kümes sıcaklığına bağlı olarak, aşılamadan önce 2 ila 4 saat boyunca hayvanlara içme suyu verilmemelidir.
Virüs aktivitesini korumak için, aşıyı çözdürmeden önce, hesaplanan içme suyunun her bir litresi için 2,5 g yağsız süt tozunun çözdürülmesi tavsiye edilir.
Aşı flakonu su altında açılır ve çözündükten sonra iyice durulanır. Aşının çözünmesi için karıştırılır, sulama sistemine orantılı olarak dağıtılır ve tavuklara verilir. Aşılama sırasında suluk sayısının artırılması tavsiye edilir.
Tüm kanatlıların aşılanmış suya erişimini sağlamak için, aşılamanın ilk birkaç dakikasında kanatlıların sulukların etrafında dolaştırılması tavsiye edilir. Kanatlılara taze içme suyu, ancak aşılı su tamamen tüketildikten sonra verilebilir.
Aşı, sulandırıldıktan hemen sonra kanatlılara uygulanmalıdır.
Aşı günün en soğuk saatinde uygulanmalıdır.
Sulandırılmış aşı doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
Aşılanacak kanatlılar stres koşullarından korunmalıdır.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
Maternal kaynaklı antikorları bulunmayan 1 günlük ve 7 günlük yaştaki tavuklara (yani SPF tavukları) uygulanan Winterfield 2512 G61 aşı suşunun 10 kat doz aşımını içeren çalışmalarda aşağıdakiler kaydedilmiştir:
1 günlük SPF tavuklarda: aşılamadan 28 gün sonra Fabricius bursada 2,2 skorluk lezyonlar ve üç haftalık olana dek daha yavaş bir büyüme hızı gözlenmiştir. 7 günlük SPF tavuklarda: infeksiyöz bursal hastalığın klinik belirtileri tespit edilmemiştir. Hiçbir tavuğun bursasında 21 günlük gözlem döneminin sonunda ödem, kanama veya nekroz tespit edilmemiştir.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Sıfır “0” gündür.

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: kanatlı infeksiyöz bursal hastalık (Gumboro hastalığı) virüsü aşısı
Kanatlı Infeksiyöz bursal hastalık (Gumboro hastalığı, IBD) virüsüne karşı aktif aşılama için.
Aşı, IBD virüsünün canlı, zayıflatılmış, intermediate-plus, Winterfield 2512, G61 suşunu içerir.
ATCvet kodu: QI01AD09

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Laktalbümin hidrolizatı
Sakaroz
Monosodyum glutamat
Potasyum dihidrojen fosfat
Dipotasyum fosfat
Patent mavisi (El31)

6.2 Geçimsizlikler
İçme suyundaki klorürler ve metal iyonları aşı virüsü ile etkileşime girebilir. Aşının hazırlanması ve uygulanması için kullanılacak aletlerin yüzeyindeki dezenfektan kalıntıları canlı virüsle etkileşime girebilir ve aşı etkililiğini azaltabilir.

6.3 Raf ömrü

Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.

6.4. Muhafaza şartları

Soğutucu içinde (2°C -8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

Liyofilize aşı: 1000 dozluk (3 ml-2R ve 10ml-8R hacimli), 2500 dozluk (3 ml-2R ve 10 ml-8R hacimli) ve 5000 dozluk (3 ml-2R ve 10 ml-8R hacimli), bromobutil gri kauçuk tıpa ve alüminyum – plastik flip off kapşonla kapatılmış hidrolitik tip I renksiz cam flakonlarda, karton kutu içerisinde 20 adet olarak piyasaya sunulmaktadır.

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir. Tıbbi ürünler atık su veya evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

23.02.2011

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:

23.02.2011

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ : 28.07.2025

Prospektüs

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Her bir doz aşı içeriği:
Canlı, infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)
Patent Mavisi (El31) (Renklendirici)……..Max 5.5 µg

İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grup: kanatlı infeksiyöz bursal hastalık (Gumboro hastalığı) virüsü aşısı
Kanatlı Infeksiyöz bursal hastalık (Gumboro hastalığı, IBD) virüsüne karşı aktif aşılama için.
Aşı, IBD virüsünün canlı, zayıflatılmış, intermediate-plus, Winterfield 2512, G61 suşunu içerir.
ATCvet kodu: QI01AD09

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR
Hedef tür: Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)
Çok virülan infeksiyöz bursal hastalık virüsünün neden olduğu mortaliteyi, klinik belirtileri, kilo kaybını ve bursa Fabriciusdaki akut lezyonlarını azaltmak için kanatlı infeksiyöz bursal hastalığına (IBD, Gumboro hastalığı) karşı maternal kaynaklı antikorları bulunan etlik tavukların aktif bağışıklığı için kullanılır.
Bağışıklık başlangıcı: Aşılama sonrası 14 gün.
Bağışıklık süresi: Aşılama sonrası 27 gün.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).
Aşılamadan önceki 48 saat içerisinde ve aşılamadan sonraki 24 saat içerisinde içme suyunda dezenfektan bulunmamalıdır. Ayrıca bu dönemde içme suyunun klorlanmasından da kaçınılmalıdır.
Aşının hazırlanması ve uygulanması için kullanılan aletlerde dezenfektan kalıntısı bulunmamalıdır.
Suluklar aşılamadan önce iyice temizlenmelidir. Aşılama için kullanılan sulama sisteminin temizliğinde dezenfektan kullanılmamalıdır.
Hayvanların yaşlarına ve kümes sıcaklığına bağlı olarak, aşılamadan önce 2 ila 4 saat boyunca hayvanlara içme suyu verilmemelidir.
Virüs aktivitesini korumak için, aşıyı çözdürmeden önce, hesaplanan içme suyunun her bir litresi için 2,5 g yağsız süt tozunun çözdürülmesi tavsiye edilir.
Aşı flakonu su altında açılır ve çözündükten sonra iyice durulanır. Aşının çözünmesi için karıştırılır, sulama sistemine orantılı olarak dağıtılır ve tavuklara verilir. Aşılama sırasında suluk sayısının artırılması tavsiye edilir.
Tüm kanatlıların aşılanmış suya erişimini sağlamak için, aşılamanın ilk birkaç dakikasında kanatlıların sulukların etrafında dolaştırılması tavsiye edilir. Kanatlılara taze içme suyu, ancak aşılı su tamamen tüketildikten sonra verilebilir.
Aşı, sulandırıldıktan hemen sonra kanatlılara uygulanmalıdır.
Aşı günün en soğuk saatinde uygulanmalıdır.
Sulandırılmış aşı doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
Aşılanacak kanatlılar stres koşullarından korunmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşı, belirli koşullar altında immünosupresyona ve bursal hasara neden olduğu bilinen bir "intermediate - plus' virüs suşu içerir (İmmünolojik özelliklere bakınız). Sonuç olarak, aşı yalnızca maternal antikorlara sahip olan ve çok virülan IBD virüs suşlarına maruz kalan tavukların aşılanması için endikedir.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bakılmaksızın 10 günlükten küçük kanatlıların aşılanması tavsiye edilmemektedir.
Aşı, MDA'sı olmayan kanatlılara uygulandığında önemli ölçüde immünosupresyona ve bursal hasara neden olan 'intermediate-plus' bir virüs suşu içerir. Aşılanan kanatlılar aşı virüsünü salgılayabilir ve bu virüs daha sonra duyarlı kanatlılara yayılabilir. Aşı virüsünün yayılmasını önlemek için, sürüler arasında aşılama ekipmanları ve kümesler dezenfekte edilmelidir.
Ürün ancak çok virülan IBDV suşlarının aşılama alanında epidemiyolojik olarak ilgili olduğu kanıtlandıktan sonra kullanılmalıdır.
Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Sürüdeki tüm kanatlılar aynı anda aşılanmalıdır.
Aşılama yapan personel, uygulamadan sonra ellerini ve ekipmanı yıkamalı ve dezenfekte etmelidir.
<u>Yumurtlama döneminde kullanım</u>
Yumurtacı veya damızlık tavuklarda kullanılmamalıdır

İSTENMEYEN ETKİLER

Hedef türe (IBD virüsüne karşı maternal kaynaklı antikorları bulunan 10 günlükten büyük tavuklar) tek bir dozun uygulanmasını kapsayan güvenlilik çalışmalarına ilişkin veri bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanımının etkinliği ve güvenliği konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, bu aşıyı başka bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanma kararı vaka bazında verilmelidir.
İçme suyundaki klorürler ve metal iyonları aşı virüsü ile etkileşime girebilir. Aşının hazırlanması ve uygulanması için kullanılacak aletlerin yüzeyindeki dezenfektan kalıntıları canlı virüsle etkileşime girebilir ve aşı etkililiğini azaltabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Maternal kaynaklı antikorları bulunmayan 1 günlük ve 7 günlük yaştaki tavuklara (yani SPF tavukları) uygulanan Winterfield 2512 G61 aşı suşunun 10 kat doz aşımını içeren çalışmalarda aşağıdakiler kaydedilmiştir:
1 günlük SPF tavuklarda: aşılamadan 28 gün sonra Fabricius bursada 2,2 skorluk lezyonlar ve üç haftalık olana dek daha yavaş bir büyüme hızı gözlenmiştir. 7 günlük SPF tavuklarda: infeksiyöz bursal hastalığın klinik belirtileri tespit edilmemiştir. Hiçbir tavuğun bursasında 21 günlük gözlem döneminin sonunda ödem, kanama veya nekroz tespit edilmemiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Yalnızca sağlıklı hayvanlar aşılanabilir.
Klinik belirtileri olan infekte sürülerde kullanılmamalıdır.
Maternal kaynaklı antikorları (MDA) olmayan sürülerin aşılanması için kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Aşılama yapan personel, uygulamadan sonra ellerini ve ekipmanı yıkamalı ve dezenfekte etmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir. Tıbbi ürünler atık su veya evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Liyofilize aşı: 1000 dozluk (3 ml-2R ve 10ml-8R hacimli), 2500 dozluk (3 ml-2R ve 10 ml-8R hacimli) ve 5000 dozluk (3 ml-2R ve 10 ml-8R hacimli), bromobutil gri kauçuk tıpa ve alüminyum – plastik flip off kapşonla kapatılmış hidrolitik tip I renksiz cam flakonlarda, karton kutu içerisinde 20 adet olarak piyasaya sunulmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 28.07.2025

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 23.02.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte-Macaristan

İç Ambalaj Etiketi (1000 doz ambalaj formları için – 3 ml):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı
1000 DOZ – 3 ml

BİLEŞİMİ
Canlı infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Üretim Tarihi:
Seri No:
Son Kullanma Tarihi:

İç Ambalaj Etiketi (1000 doz ambalaj formları için – 10 ml):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı
1000 DOZ – 10 ml

BİLEŞİMİ
Canlı infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Üretim Tarihi:
Seri No:
Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi (1000 doz ambalaj formları için – 3 ml):

20x1000 doz aşı

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
20x1000 DOZ – 3ml
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Canlı İnfeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü, Winterfield 2512, G-61 suşu: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo İnfeksiyöz doz)

HEDEF TÜRLER
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşının raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 23.02.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza, No:9, İç Kapı No: 73, Sarıyer, İstanbul- Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte - Macaristan

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF:

Dış Ambalaj Etiketi (1000 doz ambalaj formları için – 10 ml):

20x1000 doz aşı

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
20x1000 DOZ 10 ml
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Canlı İnfeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü, Winterfield 2512, G-61 suşu: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo İnfeksiyöz doz)

HEDEF TÜRLER
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşının raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 23.02.2011
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza, No:9, İç Kapı No: 73, Sarıyer, İstanbul- Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte - Macaristan

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF:

İç Ambalaj Etiketi (2500 doz ambalaj formları için – 3 ml):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

2500 DOZ – 3 ml

BİLEŞİMİ
Canlı infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Üretim Tarihi:
Seri No:
Son Kullanma Tarihi:

İç Ambalaj Etiketi (2500 doz ambalaj formları için – 10 ml):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

2500 DOZ – 10 ml

BİLEŞİMİ
Canlı infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Üretim Tarihi:
Seri No:
Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi (2500 doz ambalaj formları için – 3 ml):

20x2500 doz aşı

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
20X2500 DOZ – 3 ml
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Canlı İnfeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü, Winterfield 2512, G-61 suşu: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo İnfeksiyöz doz)

HEDEF TÜRLER
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşının raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 23.02.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza, No:9, İç Kapı No: 73, Sarıyer, İstanbul- Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte - Macaristan

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF:

Dış Ambalaj Etiketi (2500 doz ambalaj formları için – 10 ml):

20x2500 doz aşı

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
20X2500 DOZ – 10 ml
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Canlı İnfeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü, Winterfield 2512, G-61 suşu: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo İnfeksiyöz doz)

HEDEF TÜRLER
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşının raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 23.02.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza, No:9, İç Kapı No: 73, Sarıyer, İstanbul- Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte - Macaristan

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF:

İç Ambalaj Etiketi (5000 doz ambalaj formları için – 3 ml):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

5000 DOZ – 3 ml

BİLEŞİMİ
Canlı infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Üretim Tarihi:
Seri No:
Son Kullanma Tarihi:

İç Ambalaj Etiketi (5000 doz ambalaj formları için – 10 ml):

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

5000 DOZ – 10 ml

BİLEŞİMİ
Canlı infeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü suşu, Winterfield 2512, G-61: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo infeksiyöz doz)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Üretim Tarihi:
Seri No:
Son Kullanma Tarihi:

Dış Ambalaj Etiketi (5000 doz ambalaj formları için – 3ml):

20x5000 doz aşı

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
20X5000 DOZ – 3 ml
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Canlı İnfeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü, Winterfield 2512, G-61 suşu: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo İnfeksiyöz doz)

HEDEF TÜRLER
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşının raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 23.02.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza, No:9, İç Kapı No: 73, Sarıyer, İstanbul- Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte - Macaristan

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF:

Dış Ambalaj Etiketi (5000 doz ambalaj formları için – 10 ml):

20x5000 doz aşı

SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR
CEVAC® IBD L
20X5000 DOZ – 10 ml
Oral Süspansiyon İçin Liyofilizat
İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı canlı liyofilize aşı

BİLEŞİMİ
Canlı İnfeksiyöz bursal hastalık (IBD) virüsü, Winterfield 2512, G-61 suşu: 2 log10 – 3,2 log10 EID50*/doz
*EID50 (%50 embriyo İnfeksiyöz doz)

HEDEF TÜRLER
Tavuklar (10 günlükten itibaren etlik tavuklar)

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doz: 1 doz/tavuk.
Oral uygulama için içme suyunda sulandırılarak kullanılır.
Maternal kaynaklı antikorların seviyesine bağlı olarak, etlik tavukların minimum 10 günlük yaştan yaklaşık 18 günlük yaşa kadar aşılanması için kullanılır.
Aşılamanın en uygun zamanlaması, 1 ila 7 günlük tavuklarda ölçülen virüs nötralizasyon (VN) titreleri esas alınarak belirlenmelidir. Aşılanacak sürünün aşılama sırasında geometrik ortalama VN titresi ≤ 1:450 olmalıdır.
Aşılanacak sürünün MDA seviyesini hesaplamak için: tercihen aynı damızlık sürüdeki 1 günlük (maksimum 7 günlük) 20 civcivden IBD virüsüne karşı serolojik durumlarını VN ile ölçmek için örnek alınmalıdır. Bu örneklemenin sonuçlarına göre IBD virüsü MDA için 3 günlük yarı ömrüne dayanarak, en uygun aşılama zamanı belirlenebilir.
Aşının hazırlanması ve uygulanması:
Aşı dozlarının sayısı, aşılanacak kanatlıların su tüketimine göre hesaplanan içme suyu miktarında çözdürülmelidir.

Yaş	10 - 12 günlük	14 – 18 günlük
1000 doz aşı için minimum su miktarı (1000 kanatlının tedavisi için)	10 litre	15 litre

Daha küçük sürüler için hesaplanan doz yuvarlanmalı ve buna göre çözdürülmelidir (örneğin 19.450 kanatlının tedavisi için 20.000 doz çözdürülmelidir).

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır "0" gündür.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Aşının raf ömrü: 2 yıl
Kullanma talimatına uygun olarak yapılan sulandırmadan sonra kullanım süresi: 2 saat.
Soğutucu içerisinde (2°C-8°C) saklayınız ve naklediniz. Dondurmayınız. Işıktan koruyunuz.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir. Eritilen flakonlar tekrar dondurulmamalı ve imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ: 23.02.2011

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza, No:9, İç Kapı No: 73, Sarıyer, İstanbul- Türkiye
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: CEVA-PHYLAXIA VETERINARY BIOLOGICALS CO. LTD, Szallas utca 5-1107 Budapeşte - Macaristan

Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
KDV Dahil PSF: