ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜNÜN İSMİ
CEVAC® SALMOVAC

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
1 doz aşı :
Aktif maddeler:
Çift atenüe (adenin ve histidin oksotrofik) Salmonella Enteritidis mutant, 441/014 suşu 1- 8 x 10^8 CFU ve sakaroz, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve asetik asit ihtiva eder.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakın.

3. FARMASÖTİK ŞEKİL
İçme suyuyla kullanılacak liyofilize aşı
Açık bej ila kahverengimsi açık gri liyofilizat.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Hedef tür
Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

4.2 Her bir hedef tür için kullanım alanı
Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium'un intestinal kanal ve iç organlarda neden olduğu kolonileşmenin, kalıcılığın ve invazyonların azaltılması için civcivlerde aktif bağışıklık oluşturmada kullanılır.
İlk aşılamadan sonra 6 gün içinde bağışıklık başlar.
Önerilen aşılama programına göre kullanıldığında Salmonella enteritidis'in bağışıklık süresi ikinci aşılamadan sonra 35 hafta ve üçüncü aşılamadan sonra 63 haftadır.
Önerilen aşılama programına göre kullanıldığında Salmonella Typhimurium'un bağışıklık süresi üçüncü aşılamadan sonra 60 haftadır.

4.3 Kontrendikasyonlar
Sağlıksız veya ağır stres koşulları altında bulunan tavuklar aşılanmamalıdır.
Broilerlerde kullanılmamalıdır.

4.4 Her bir hedef tür için özel uyarılar
Aşılı tavuklar, aşı suşunu aşılamadan sonra altı haftaya kadar dışarı atarlar. Bu nedenle, aşı aşılı tavuklar veya gübreleriyle temas eden duyarlı tavuklara yayılabilir.

4.5 Kullanıma ilişkin özel uyarılar
(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar
- Aşının süs cinslerinde kullanımı çalışılmamıştır.
- Aşı suşunun adenin-histidin oksotrofisi nedeniyle, aşı ve saha suşları arasında uygun bir büyüme testi ile ayırım yapılabilir.
- Aşı suşu, diğerlerinin yanı sıra ampisilin, sefotaksim,kloramfenikol, siprofloksasin, gentamisin, kanamisin, oksitetrasiklin, streptomisine karşı duyarlıdır.
- Aşı suşu tek başına sulfamerazine karşı dirençlidir. Ancak, sulfamerazin ve trimetoprime karşı duyarlıdır.
- Aşı suşu, pulse gel elektroforezi (PFGE) içinde restriction fragment polymorphism (RFLP) gibi moleküler biyoloji yöntemleriyle de saha suşundan ayırt edilebilir.
- Aşı suşunun buzağı ve domuz gibi hedef olmayan türlerde yayıldığı gösterilmiştir. Bu suş söz konusu hayvanlarda kalıcı olmuş ve buzağılarda 9 güne ve domuzlarda 22 güne kadar saçıldığı ve vücut ısısında geçici bir artışa neden olduğu gösterilmiştir.

(ii) Ürünü uygulayana ilişkin özel uyarılar

- Aşı hazırlanırken tek kullanımlık eldiven giyilmelidir. Aşıyı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayın ve dezenfekte edin.
- Aşı yutulmamalıdır. Aşı yutulduğu taktirde doktora başvurulmalıdır. Aşı suşu sulfamerazin hariç antibiyotiklere karşı duyarlıdır.
- Bağışıklığı zayıflamış kişiler aşıyı ellememeli veya aşı suşunun saçıldığı dönemde aşılanmış piliçlerle temas etmemelidir.
- Aşı suşu aşılamadan sonra 13. güne kadar tavuk altlığından izole edilmiştir ve aşılı tavuklardan aşılama sonrası 19 güne kadar saçılır. Yapılan çalışmalarda, aşı suşu çevrede 2. aşılamadan sonra 8 haftaya kadar ve üçüncü aşılamadan sonra 5 haftaya kadar bulunabilir. Ender vakalarda, aşı suşu yukarıda belirtilen sürelerin ötesinde çevreden izole edilebilir.
- Aşılı sürülerle ilgilenen personel genel hijyen prensiplerini uygulamalı (giysi değiştirme, eldiven giyme, botların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi) ve yeni aşılanmış tavukların altlığını temizlerken dikkatli olmalıdır. Aşılı sürülerde çalıştıktan sonra eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
- Duyarlı türlere yayılmasını önlemek için uygun veterinerlik ve yetiştiricilik önlemleri alınmalıdır.

(iii)Diğer uyarılar

Bulunmamaktadır.

4.6 İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)

Bilinen yoktur.

4.7 Gebelik, laktasyon veya yumurtlama döneminde kullanım

Yumurtlama

- Yumurtlamanın başlangıcından önceki 3 hafta (üçüncü aşılamadan sonra) veya 6 hafta (ikinci aşıl a an sonra) ve yumurtlama döneminde kullanılmamalıdır.
- Yumurtlama için amaçlanan aşısız tavuklar, aşılı tavuklarla temas ettirilmemelidir.

4.8 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi ve diğer etkileşim şekilleri

-Aşı ile bağışıklamadan 3 gün önce ve 3 gün sonra anti-infektif maddeler kullanılmamalıdır. Zorunlu uygulamalarda ilgili tavukların aşısı tekrarlanmalıdır.

-Bu aşının diğer veterinerlik ürünleri ile birlikte kullanılması durumunda aşının etkinliği ve güvenliliğiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu aşının diğer herhangi bir veterinerlik ürününden önce veya sonra kullanılmasına ilişkin kararın vaka bazında verilmesi gerekir.

- Rekabet edecek mikroflora preparatları bu ürünle birlikte uygulanmamalıdır.

4.9 Dozaj ve kullanım yolu

İçme suyuyla kullanımı.

- Tüm uygulama prosedürlerinde olağan aseptik önlemler alınmalıdır.
- Tüm tavukları aşılamak için gerekli olan flakon sayısı hesaplanır.
- Yalnızca temiz, antiseptik ve dezenfektan içermeyen içme suyu kullanılmalıdır.
- Aşı flakona konulacak küçük bir miktar su ile hazırlanmalıdır. Liyofilize aşının tamamen çözünmesi sağlanmalıdır. Daha sonra hazırlanan aşı 4 saat içinde tüketilecek yeterli miktarda suya eklenmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Hazırlanan aşıdan gerekli doz sayısı 4 saat içinde tüketilecek yeterli miktarda suya eklenmelidir.

Aşı uygulamadan 1-2 saat önce tavuklara su verilmesi kesilebilir.

Kılavuz olarak, ilk aşılama için uygulanacak aşı her 1.000 tavuk başına en az 2 litre hacimde içme suyu içinde uygulanmalıdır.

İki hafta sonra ikinci aşılamada her 1.000 tavuk için 5 litre içme suyu ile uygulanmalıdır.

Üçüncü doz uygulanacaksa, 1.000 tavuk için en az 10-20 litre içme suyu kullanılmalıdır. Bu üçüncü doz yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce uygulanmalıdır.

***Salmonella* Enteritidis'e karşı bağışıklama**
Salmonella durumu bilinmeyen veya Salmonella enteritidis pozitif olarak saptanan çiftliklerdeki piliçlere uygulanacak aşılama programı:

Bir günlük yaşta bir doz, iki hafta sonra ikinci doz ve yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce üçüncü doz uygulanır. İkinci ve üçüncü uygulamalar arasındaki süre iki haftadan fazla olmalıdır.

Salmonella Enteritidis durumu bilinen ve Salmonella Enteritidis bulunmayan çiftliklerdeki piliçlere rutin bakteriyolojik izlemeye göre uygulanması önerilen aşılama programı:
Bir günlük yaşta bir doz ve ardından iki hafta sonra ikinci doz uygulanır. Bağışıklık süresiyle ilgili olarak 3 dozlu rejimle daha yüksek düzeyde koruma sağlanır.

***Salmonella* Enteritidis ve *Salmonella* Typhimurium'a karşı bağışıklama (Salmonella durumu ne olursa olsun)**
Bir günlük yaşta bir doz, altı hafta sonra ikinci doz ve 13. Haftalık yaş civarında üçüncü doz.

4.10 Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)
- Dozaşımı (10 doz) uygulaması bazen yumuşak dışkı ve geçici ağırlık kaybı ile sonuçlanabilir. Bu durum nihai performans üzerinde herhangi bir sonuç doğurmaz.

4.11 Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)
Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta
Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta
Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
Canlı aşı suşu, tavuklarda *Salmonella* Enteritidis ve *Salmonella* Typhimurium'a karşı hücre aracılı immünolojik mekanizmaları (farelerde kanıtlandığı gibi) ve antikor oluşumunu simüle eder. Antikor oluşumu, *Salmonella* Gallinarum için serolojik testi (hızlı serum aglütinasyonu) etkilemez. Aşı suşu sulfamerazine dirençlidir. Suşun genetik olarak stabil olduğu kanıtlanmıştır.
Farmakoterapötik grup: Tavukların *Salmonella* Enteritidis ve *Salmonella* Typhimuriuma karşı aktif immünizasyonu için.
ATC-vet kodu: QI01AE01

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddeler
Sakaroz, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve asetik asit

6.2 Geçimsizlikler
Bu ürünü, herhangi başka bir veteriner tıbbi ürünü ile karıştırmayın.

6.3 Raf ömrü
Satılmak üzere ambalajlanmış veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 18 ay
Talimatlara uygun şekilde sulandırılmasının ardından raf ömrü: 4 saat

6.4. Muhafaza şartları
Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2°C- 8 °C). Işıktan korunmalıdır ve dondurulmamalıdır.

6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu

1000 doz x 1 şişe liyofilize aşı içeren kutu (10 ml.lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve kırmızı kapaklı)
1000 doz x 10 şişe liyofilize aşı içeren kutu (10 ml.lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve kırmızı kapaklı)
2500 doz x 1 şişe liyofilize aşı içeren kutu (25 ml'lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve mavi kapaklı)
2500 doz x 10 şişe liyofilize aşı içeren kutu (25 ml'lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve mavi kapaklı)
5000 doz x l şişe liyofilize aşı içeren kutu (100 ml.lik renksiz Tip II cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve yeşil kapaklı)
5000 doz x 12 şişe liyofilize aşı içeren kutu (100 ml.lik renksiz Tip II cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve yeşil kapaklı)

6.6 Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.
Orijinal aşı kapları (açılmış ve boşaltılmış) ve aşılama işleminde kullanılan tüm ekipman kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir (dezenfektanlar- kuatemer amonyum bazları hariç- normal çalışma konsantrasyonunda).

7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:

9. PAZARLAMA İZNİNİN İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ: 20.09.2017

10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ: 01.09.2026

PROSPEKTÜS

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CEVAC® SALMOVAC
İçme suyuyla kullanılacak liyofilize
Salmonella infeksiyonlarına karşı canlı atenüe oral aşı

Bileşimi:
Bir doz aşı, çift atenüe (adenin ve histidin oksotrofik) Salmonella Enteritidis mutant, 441/014 suşu 1- 8 x 10^8 CFU ve sakaroz, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve asetik asit ihtiva eder.

ENDİKASYON(LAR)
Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium'un intestinal kanal ve iç organlarda neden olduğu kolonileşmenin, kalıcılığın ve invazyonların azaltılması için civcivlerde aktif bağışıklık oluşturmada kullanılır.
İlk aşılamadan sonra 6 gün içinde bağışıklık başlar.
Önerilen aşılama programına göre kullanıldığında *Salmonella* enteritidis'in bağışıklık süresi ikinci aşılamadan sonra 35 hafta ve üçüncü aşılamadan sonra 63 haftadır.
Önerilen aşılama programına göre kullanıldığında *Salmonella* Typhimurium'un bağışıklık süresi üçüncü aşılamadan sonra 60 haftadır.

KONTRENDİKASYONLAR
Sağlıksız veya ağır stres koşulları altında bulunan tavuklar aşılanmamalıdır.
Broilerlerde kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER
Bilinmemektedir.
Bu prospektüste belirtilmemiş herhangi bir ciddi etki veya başka etkiler fark edildiğinde veteriner
hekime bildirilmelidir.

HEDEF TÜRLER
Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

HER BİR TÜR İÇİN DOZ, UYGULAMA METODU VE YOLU
İçme suyuyla kullanımı.
- Tüm uygulama prosedürlerinde olağan aseptik önlemler alınmalıdır.
- Tüm tavukları aşılamak için gerekli olan flakon sayısı hesaplanır.
- Yalnızca temiz, antiseptik ve dezenfektan içermeyen içme suyu kullanılmalıdır.
- Aşı flakona konulacak küçük bir miktar su ile hazırlanmalıdır. Liyofilize aşının tamamen çözünmesi sağlanmalıdır. Daha sonra hazırlanan aşı 4 saat içinde tüketilecek yeterli miktarda suya eklenmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Hazırlanan aşıdan gerekli doz sayısı 4 saat içinde tüketilecek yeterli miktarda suya eklenmelidir.
Aşı uygulamadan 1-2 saat önce tavuklara su verilmesi kesilebilir.
Kılavuz olarak, ilk aşılama için uygulanacak aşı her 1.000 tavuk başına en az 2 litre hacimde içme suyu içinde uygulanmalıdır.
İki hafta sonra ikinci aşılamada her 1.000 tavuk için 5 litre içme suyu ile uygulanmalıdır.
Üçüncü doz uygulanacaksa, 1.000 tavuk için en az 10-20 litre içme suyu kullanılmalıdır. Bu üçüncü doz yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce uygulanmalıdır.

***Salmonella* Enteritidis'e karşı bağışıklama**
Salmonella durumu bilinmeyen veya Salmonella enteritidis pozitif olarak saptanan çiftliklerdeki piliçlere uygulanacak aşılama programı:

Bir günlük yaşta bir doz, iki hafta sonra ikinci doz ve yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce üçüncü doz uygulanır. İkinci ve üçüncü uygulamalar arasındaki süre iki haftadan fazla olmalıdır.

Salmonella Enteritidis durumu bilinen ve Salmonella Enteritidis bulunmayan çiftliklerdeki piliçlere rutin bakteriyolojik izlemeye göre uygulanması önerilen aşılama programı:
Bir günlük yaşta bir doz ve ardından iki hafta sonra ikinci doz uygulanır. Bağışıklık süresiyle ilgili olarak 3 dozlu rejimle daha yüksek düzeyde koruma sağlanır.

***Salmonella* Enteritidis ve *Salmonella* Typhimurium'a karşı bağışıklama (Salmonella durumu ne olursa olsun)**
Bir günlük yaşta bir doz, altı hafta sonra ikinci doz ve 13. Haftalık yaş civarında üçüncü doz.

YASAL ARINMA SÜRESİ
Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta
Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta
Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

TİCARİ AMBALAJ ŞEKİLLERİ
1000 doz x 1 şişe liyofilize aşı içeren kutu (10 ml'lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve kırmızı kapaklı)
1000 doz x 10 şişe liyofilize aşı içeren kutu (10 ml'lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve kırmızı kapaklı)
2500 doz x 1 şişe liyofilize aşı içeren kutu (25 ml'lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve mavi kapaklı)
2500 doz x 10 şişe liyofilize aşı içeren kutu (25 ml'lik renksiz Tip I cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve mavi kapaklı)
5000 doz x l şişe liyofilize aşı içeren kutu (100 ml'lik renksiz Tip II cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve yeşil kapaklı)
5000 doz x 12 şişe liyofilize aşı içeren kutu (100 ml'lik renksiz Tip II cam şişelerde, gri kauçuk tıpalı ve yeşil kapaklı)

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2°C- 8 °C). Işıktan korunmalıdır ve dondurulmamalıdır.
Raf ömrü: 18 ay. Sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 4 saat.

UYARILAR
Aşılı tavuklar, aşı suşunu aşılamadan sonra altı haftaya kadar dışarı atarlar. Bu nedenle, aşı aşılı tavuklar veya gübreleriyle temas eden duyarlı tavuklara yayılabilir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE VETERİNER HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Hayvanlarda kullanımla ilgili özel önlemler:
- Aşının süs cinslerinde kullanımı çalışılmamıştır.
- Aşı suşunun adenin-histidin oksotrofisi nedeniyle, aşı ve saha suşları arasında uygun bir büyüme testi ile ayırım yapılabilir.
- Aşı suşu, diğerlerinin yanı sıra ampisilin, sefotaksim, kloramfenikol, siprofloksasin, gentamisin, kanamisin, oksitetrasiklin, streptomisine karşı duyarlıdır.
- Aşı suşu tek başına sulfamerazine karşı dirençlidir. Ancak, sulfamerazin ve trimetoprime karşı duyarlıdır.
- Aşı suşu, pulse gel elektroforezi (PFGE) içinde restriction fragment polymorphism (RFLP) gibi moleküler biyoloji yöntemleriyle de saha suşundan ayırt edilebilir.

- Aşı suşunun buzağı ve domuz gibi hedef olmayan türlerde yayıldığı gösterilmiştir. Bu suş söz konusu hayvanlarda kalıcı olmuş ve buzağılarda 9 güne ve domuzlarda 22 güne kadar saçıldığı ve vücut ısısında geçici bir artışa neden olduğu gösterilmiştir.

Ürünü uygulayan kisinin alacağı özel önlemler
- Aşı hazırlanırken tek kullanımlık eldiven giyilmelidir. Aşıyı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayın ve dezenfekte edin.
- Aşı yutulmamalıdır. Aşı yutulduğu taktirde doktora başvurulmalıdır. Aşı suşu sulfamerazin hariç antibiyotiklere karşı duyarlıdır.
- Bağışıklığı zayıflamış kişiler aşıyı ellememeli veya aşı suşunun saçıldığı dönemde aşılanmış piliçlerle temas etmemelidir.
- Aşı suşu aşılamadan sonra 13. güne kadar tavuk altlığından izole edilmiştir ve aşılı tavuklardan aşılama sonrası 19 güne kadar saçılır. Yapılan çalışmalarda, aşı suşu çevrede 2. aşılamadan sonra 8 haftaya kadar ve üçüncü aşılamadan sonra 5 haftaya kadar bulunabilir. Ender vakalarda, aşı suşu yukarıda belirtilen sürelerin ötesinde çevreden izole edilebilir.
- Aşılı sürülerle ilgilenen personel genel hijyen prensiplerini uygulamalı (giysi değiştirme, eldiven giyme, botların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi) ve yeni aşılanmış tavukların altlığını temizlerken dikkatli olmalıdır. Aşılı sürülerde çalıştıktan sonra eller yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
- Duyarlı türlere yayılmasını önlemek için uygun veterinerlik ve yetiştiricilik önlemleri alınmalıdır.

Yumurtlama
- Yumurtlamanın başlangıcından önceki 3 hafta (üçüncü aşılamadan sonra) veya 6 hafta (ikinci aşı
lamadan sonra) ve yumurtlama döneminde kullanılmamalıdır.
- Yumurtlama için amaçlanan aşısız tavuklar, aşılı tavuklarla temas ettirilmemelidir.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri
-Aşı ile bağışıklamadan 3 gün önce ve 3 gün sonra anti-infektif maddeler kullanılmamalıdır. Zorunlu uygulamalarda ilgili tavukların aşısı tekrarlanmalıdır.
-Bu aşının diğer veterinerlik ürünleri ile birlikte kullanılması durumunda aşının etkinliği ve güvenliliğiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu aşının diğer herhangi bir veterinerlik ürününden önce veya sonra kullanılmasına ilişkin kararın vaka bazında verilmesi gerekir.
- Rekabet edecek mikroflora preparatları bu ürünle birlikte uygulanmamalıdır.

Dozasımı (semptomlar, acil durum prosedürleri, antidotlar):
- Dozaşımı (10 doz) uygulaması bazen yumuşak dışkı ve geçici ağırlık kaybı ile sonuçlanabilir. Bu durum nihai performans üzerinde herhangi bir sonuç doğurmaz.

Geçimsizlikler:
- Başka herhangi bir veterinerlik ürünü ile karıştırılmamalıdır.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI
Kullanılma yan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. Orijinal aşı kapları (açılmış ve boşaltılmış) ve aşılama işleminde kullanılan tüm ekipman kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir (dezenfektanlar- kuatemer amonyum bazları hariç- normal çalışma konsantrasyonunda).

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI, ADRESİ
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

ÜRETİM YERİNİN ADI, ADRESİ
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5-1107 Budapeşte- Macaristan

PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI: 20.09.2017
PROSPEKTÜSÜN SON ONAYLANDIGI TARİH: 01.09.2026

DIŞ AMBALAJ
(1000 dozluk 10 şişe içeren kutu 10X1000 DOZ – 1000 dozluk 1 şişe içeren kutu 1X1000 DOZ)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CEVAC® SALMOVAC
İçme suyuyla kullanılacak liyofilize
Salmonella infeksiyonlarına karşı canlı atenüe oral aşı

BİLEŞİMİ
Bir doz aşı, çift atenüe (adenin ve histidin oksotrofik) Salmonella Enteritidis mutant, 441/014 suşu 1- 8 x 10^8 CFU ve sakaroz, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve asetik asit ihtiva eder.

HEDEF TÜRLER
Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

UYGULAMA YÖNTEMİ VE YOLU/YOLLARI
İçme suyuyla kullanılır.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Kılavuz olarak, ilk aşılama için uygulanacak aşı her 1.000 tavuk başına en az 2 litre hacimde içme suyu içinde uygulanmalıdır. İki hafta sonra ikinci aşılamada her 1.000 tavuk için 5 litre içme suyu ile uygulanmalıdır.
Üçüncü doz uygulanacaksa, 1.000 tavuk için en az 10-20 litre içme suyu kullanılmalıdır. Bu üçüncü doz yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce uygulanmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ
Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta
Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta
Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

ÖZEL UYARILAR
Ürünü kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2°C- 8 °C). Işıktan korunmalıdır ve dondurulmamalıdır.
Raf ömrü: 18 ay.
Sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 4 saat.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI
Kullanılma yan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI, ADRESİ
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

ÜRETİM YERİNİN ADI, ADRESİ
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5-1107 Budapeşte- Macaristan

PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI: 20.09.2017
SERİ NUMARASI

ÜRETİM TARİHİ:
SON.KUL.TARİHİ:
KDV DAHİL PARAKENDE SATIŞ FİYATI:

DIŞ AMBALAJ
(2500 dozluk 1 şişe içeren kutu – 1X2500 ve 2500 dozluk 10 şişe içeren kutu – 10X2500)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CEVAC® SALMOVAC
İçme suyuyla kullanılacak liyofilize
Salmonella infeksiyonlarına karşı canlı atenüe oral aşı

BİLEŞİMİ
Bir doz aşı, çift atenüe (adenin ve histidin oksotrofik) Salmonella Enteritidis mutant, 441/014 suşu 1- 8 x 10^8 CFU ve sakaroz, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve asetik asit ihtiva eder.

HEDEF TÜRLER
Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

UYGULAMA YÖNTEMİ VE YOLU/YOLLARI
İçme suyuyla kullanılır.
Kullamadan önce prospektüsü okuyunuz.
Kılavuz olarak, ilk aşılama için uygulanacak aşı her 1.000 tavuk başına en az 2 litre hacimde içme suyu içinde uygulanmalıdır. İki hafta sonra ikinci aşılamada her 1.000 tavuk için 5 litre içme suyu ile uygulanmalıdır.
Üçüncü doz uygulanacaksa, 1.000 tavuk için en az 10-20 litre içme suyu kullanılmalıdır. Bu üçüncü doz yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce uygulanmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ
Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta
Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta
Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

ÖZEL UYARILAR
Ürünü kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2°C- 8 °C). Işıktan korunmalıdır ve dondurulmamalıdır.
Raf ömrü: 18 ay.
Sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 4 saat.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI
Kullanılma yan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI, ADRESİ
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

ÜRETİM YERİNİN ADI, ADRESİ
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5-1107 Budapeşte- Macaristan

PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI: 20.09.2017

SERİ NUMARASI

ÜRETİM TARİHİ:
SON.KUL.TARİHİ:
KDV DAHİL PARAKENDE SATIŞ FİYATI:

DIŞ AMBALAJ
(5000 dozluk 1 şişe içeren kutu – 1X5000 ve 5000 dozluk 12 şişe içeren kutu – 12X5000)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
CEVAC® SALMOVAC
İçme suyuyla kullanılacak liyofilize
Salmonella infeksiyonlarına karşı canlı atenüe oral aşı

BİLEŞİMİ
Bir doz aşı, çift atenüe (adenin ve histidin oksotrofik) Salmonella Enteritidis mutant, 441/014 suşu 1- 8 x 10^8 CFU ve sakaroz, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve asetik asit ihtiva eder.

HEDEF TÜRLER
Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

UYGULAMA YÖNTEMİ VE YOLU/YOLLARI
İçme suyuyla kullanılır.
Kullamadan önce prospektüsü okuyunuz.
Kılavuz olarak, ilk aşılama için uygulanacak aşı her 1.000 tavuk başına en az 2 litre hacimde içme suyu içinde uygulanmalıdır. İki hafta sonra ikinci aşılamada her 1.000 tavuk için 5 litre içme suyu ile uygulanmalıdır.
Üçüncü doz uygulanacaksa, 1.000 tavuk için en az 10-20 litre içme suyu kullanılmalıdır. Bu üçüncü doz yumurtlama döneminden en geç üç hafta önce uygulanmalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ
Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta
Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta
Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

ÖZEL UYARILAR
Ürünü kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ
Buzdolabında muhafaza edilmelidir (2°C- 8 °C). Işıktan korunmalıdır ve dondurulmamalıdır.
Raf ömrü: 18 ay.
Sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 4 saat.

ATIK VE KULLANILMAYAN ÜRÜNLERİN İMHASI
Kullanılma yan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI, ADRESİ
Ceva Hayvan Sağlığı A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No:9 İç Kapı No:73 Sarıyer / İstanbul – Türkiye

ÜRETİM YERİNİN ADI, ADRESİ
Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd, Szallas utca 5-1107 Budapeşte- Macaristan

PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI: 20.09.2017

SERİ NUMARASI

ÜRETİM TARİHİ:
SON.KUL.TARİHİ:
KDV DAHİL PARAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇ AMBALAJ (1000 dozluk şişe)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

CEVAC® SALMOVAC

İçme suyuyla kullanılacak liyofilize

Salmonella infeksiyonlarına karşı

BİLEŞİMİ

Bir doz aşı için; Salmonella Enteritidis 1- 8 x 10^8 CFU*

HEDEF TÜRLER

Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

UYGULAMA YOLU

İçme suyuyla kullanılır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta

Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta

Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

İÇ AMBALAJ (2500 dozluk şişe)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

CEVAC® SALMOVAC

İçme suyuyla kullanılacak liyofilize

Salmonella infeksiyonlarına karşı

BİLEŞİMİ

Bir doz aşı için; Salmonella Enteritidis 1- 8 x 10^8 CFU*

HEDEF TÜRLER

Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

UYGULAMA YOLU

İçme suyuyla kullanılır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta

Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta

Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ:

İÇ AMBALAJ (5000 dozluk şişe)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

CEVAC® SALMOVAC

İçme suyuyla kullanılacak liyofilize

Salmonella infeksiyonlarına karşı

BİLEŞİMİ

Bir doz aşı için; Salmonella Enteritidis 1- 8 x 10^8 CFU*

HEDEF TÜRLER

Bir günlük civcivler (ileride damızlık ve yumurtacı olacaklar)

UYGULAMA YOLU

İçme suyuyla kullanılır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Et: Son aşılamadan itibaren 6 hafta

Yumurta: İlk iki aşılamadan sonra: 6 hafta

Üçüncü aşılamadan sonra: 3 hafta

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: