# ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ÖZETİ

## 1. VETERİNER TIBBİ ÜRÜNÜN İSMİ
DIVENCE RESPI
Enjeksiyonluk Emülsiyon İçin Liyofilizat ve Çözücü

## 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM
Doz başına (2 ml):

**Aktif Madde:**
Canlı atenüe Bovine Respiratorik Sinsityal Virüs (BRSV), Lyme-56 suşu.. …….. $10^{5.2\text{-}6.5}$ $CCID_{50}$ *
Canlı $gE^-$ $tk^-$ çift gen delesyonlu Bovine Herpes Virüs Tip 1 (BoHV-1), CEDDEL suşu.. $10^{6.3} – 10^{7.6}$ $CCID_{50}$*
İnaktif Parainfluenza-3 Virüsü (PI-3), SF4 suşu. ..... ≥ 206.2 EU**
$gE^-$: delesyona uğramış glikoprotein E; $tk^-$: delesyona uğramış timidin kinaz
*Hücre kültürü enfektif doz 50%
**ELISA üniteleri
**Adjuvan:**
Montanide IMS…….…….1.010 g

**Yardımcı maddeler:**
Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

## 3. FARMASÖTİK ŞEKİL
Enjeksiyonluk emülsiyon için liyofilizat ve çözücü
Liyofilizat: beyaz – sarı renkli
Çözücü:beyaz yarı şeffaf emülsiyon

## 4. KLİNİK ÖZELLİKLER

### 4.1. Hedef tür
Sığırlar

### 4.2. Her bir hedef tür için kullanım alanı
Sığırların 10 haftalıktan itibaren aktif immünizasyonu:
BRSV ve PI-3: virüs saçılımı, hipertermi, klinik belirtilerin önlenmesi ve akciğer lezyonlarının azaltılması için.
BoHV-1: virüs saçılımı, hipertermi ve IBR (İnfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis) kaynaklı klinik belirtilerin azaltılması için.
Bağışıklık başlangıcı: Temel aşılama programından sonra 3 haftada.
Bağışıklık süresi: Temel aşılama programından sonra 6 ay.
Tekrar (güçlendirici) aşılama programından sonra 1 yıl.

### 4.3. Kontrendikasyonlar
Yok.

### 4.4. Her bir hedef tür için özel uyarılar
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.

**4.5. Kullanıma ilişkin özel uyarılar**

(i) Hayvanlarda kullanıma ilişkin özel uyarılar

Uygulamada sadece steril enjektör kullanınız.

Sulandırma ve kullanım sırasında kontaminasyondan kaçınınız.

(ii) Ürünü Uygulayana İlişkin Özel Uyarılar

Kullanıcı için:

Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içerir. Kazara insana enjeksiyon şiddetli ağrı ve şişliğe neden olabilir, özellikle eklem veya parmağa enjekte edildi ise, nadiren de olsa acilen tıbbi yardım alınmaması durumunda etkilenen parmağın kaybı ile sonuçlanabilir. Çok az miktarda dahi olsa, bu veteriner tıbbi ürün ile enjeksiyon durumunda acil tıbbi yardım alınız ve ürün prospektüs veya etiketini doktorunuza gösterin. Tıbbi müdahaleden 12 saat sonra ağrı halen devam ediyorsa tekrar tıbbi destek alınız.

Doktorlar için: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içerir. Düşük miktarda bile enjekte edilse, şiddetli şişmeye ve bunun sonucunda iskemik nekroz ve uzvun kaybına neden olabilir. ACİL cerrahi müdahale gerekir, özellikle parmak pulpası veya tendona yayılım var ise enjeksiyon bölgesinin insizyon ve irrigasyonu gerekebilir.

**4.6. İstenmeyen etkiler (sıklık ve şiddet)**

| | |
|---|---|
| Çok yaygın<br>(>1 hayvan / tedavi edilen 10 hayvanda): | Enjeksiyon alanında yangı[1], vücut ısısında artış[2] |
| Nadiren<br>(1 ila 10 hayvan / tedavi edilen 1.000 hayvanda): | Anaflaktik tip reaksiyon[3] |

[1]Enjeksiyon bölgesinde hafif ila orta şiddette geçici bir yangı (14 cm çapa kadar) görülebilir, bu yangının çapı 2 gün içinde hızla azalır ve tedavi olmaksızın 2 hafta içinde kaybolur.

[2]Aşılamadan sonra vücut ısısında artış (ortalama 1,7 ºC, bireysel olarak 2,4 ºC'ye kadar artış) görülebilir. Bu artış 3 gün içerisinde kendiliğinden geçer.

[3]Anafilaktik tip reaksiyonlarda, uygun semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

**4.7. Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım**

Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

**4.8. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri**

Bu aşının herhangi bir veteriner tıbbi ürünle beraber kullanımında güvenlik ve etkinliğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle aşının herhangi veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanımının kararı vakaya göre verilmelidir.

**4.9. Dozaj ve kullanım yolu**

Sığırlarda, 10 haftalık yaştan itibaren kas içi yolla uygulanır.

Temel aşılama programı: 3 hafta aralıkla iki doz (her biri 2 ml) doz uygulayınız.

Tekrar (güçlendirici doz) aşılama programı: temel aşılama programından sonra 6 ayı geçmeden 2 ml'lik bir tekrar dozu uygulanmalıdır.

Takip eden yeniden aşılama programı: 12 ay arayla 2 ml'lik bir tekrar dozu uygulanmalıdır.

Enjeksiyonluk emülsiyon elde etmek için, liyofilize kısmı çözücünün tamamını kullanarak sulandırınız ve emülsiyon haline gelene kadar çalkalayınız. Sulandırılan aşı, beyaz ila sarı renkli bir emülsiyondur.

Uygulamadan önce aşının +15 ila +25°C 'ye ulaşmasını bekleyiniz.

BVDV'ye karşı koruma ihtiyacının ortadan kalkması durumunda, DIVENCE PENTA ile aşılamanın ardından tekrar aşılamalar için DIVENCE RESPI kullanılabilir.
PI-3 ve BRSV'ye karşı koruma ihtiyacının ortadan kalkması durumunda, DIVENCE RESPI ile aşılamanın ardından tekrar aşılamalar için DIVENCE IBR MARKER LIVE kullanılabilir.

**4.10. Doz aşımı, varsa semptomlar, acil prosedürler, antidotlar (gerekli ise)**
Bölüm 4.6'da belirtilenler dışında herhangi bir istenmeyen etki görüşmemiştir.

**4.11. Kalıntı arınma süreleri (sıfır gün olanlar da dahil)**
Sıfır gün.

## 5. İMMÜNOLOJİK ÖZELLİKLER
ATCvet kodu: QI02AH
Bovine respiratorik sinsityal virüs (BRSV), bovine herpesvirüs tip 1 (BoHV-1) ve bovine parainfluenza 3 virüs (PI-3)'ye karşı aktif bağışıklığı uyarmak.
Bovine herpes virüsü tip 1'e karşı aşılanmış hayvanlar gE- marker delesyonu sayesinde ticari teşhis kitleri ile doğal enfekte hayvanlardan ayırt edilebilirler.

## 6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

### 6.1. Yardımcı maddeler

**Liyofilizat:**
Dipotasyum fosfat
Jelatin
Glisin
Potasyum dihidrojen fosfat
Sorbitol
Sukroz

**Çözücü:**
Disodyum fosfat dodekahidrat
Potasyum klorür
Potasyum dihidrojen fosfat
Sodyum klorür
Enjeksiyonluk su

### 6.2. Geçimsizlikler
Veteriner tıbbi ürünü birlikte kullanım için tedarik edilen çözücüsü dışında herhangi bir veteriner tıbbi ürünle karıştırmayınız.

### 6.3. Raf ömrü
Ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 30 ay
Ambalajlı çözücünün raf ömrü: 3 yıl
Talimatlara göre sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 2 saat

### 6.4. Muhafaza şartları
2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.

**6.5 Birincil ambalajın niteliği ve kompozisyonu**
Liyofilizat: 5 doz, 10 doz veya 20 doz içeren 10 veya 50 ml'lik tip I cam şişeler, Tip 1 bromobutil kauçuk tıpalarla ve alüminyum kapaklarla kapatılmıştır.

Çözücü: Bromobutil kauçuk tıpalarla ve alüminyum kapaklarla kapatılmış 10 ml, 20 ml veya 50 ml'lik (40 ml çözücü içeren) polietilen (PET) şişeler.

Ambalaj boyutları:
-Karton kutu içerisinde 1 adet 5 dozluk liyofilizat ve 1 adet 10 ml çözücü.
-Karton kutu içerisinde 1 adet 10 dozluk liyofilizat ve 1 adet 20 ml çözücü.
-Karton kutu içerisinde 1 adet 20 dozluk liyofilizat ve 1 adet 40 ml çözücü.

Tüm ticari takdim şekilleri satışa sunulmayabilir.

**6.6. Kullanılmış veya arta kalan ürünün imhasına ilişkin özel önlemler**
Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

**7. PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ**
HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL
Tel: (216) 526 60 00
Web adresi: www.hipra.com

**8. PAZARLAMA İZNİ NUMARASI:**
---

**9. PAZARLAMA İZNİ İLK VERİLME VEYA YENİLEME TARİHİ:**
10.11.2026

**10. METİN DEĞİŞİKLİK TARİHİ:**
---

**PROSPEKTÜS**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır**
**DIVENCE RESPI**
Enjeksiyonluk Emülsiyon İçin Liyofilizat ve Çözücü
BRSV, IBR ve PI-3'e Karşı Kombine Aşı

## BİLEŞİMİ
Doz başına (2 ml):

### Aktif Madde:
Canlı atenüe Bovine Respiratorik Sinsityal Virüs (BRSV), Lyme-56 suşu.....……$10^{5.2-6.5}$ $CCID_{50}$ *
Canlı $gE^-$ $tk^-$ çift gen delesyonlu Bovine Herpes Virüs Tip 1 (BoHV-1), CEDDEL suşu……..
$10^{6.3} – 10^{7.6}$ $CCID_{50}$*
İnaktif Parainfluenza-3 Virüsü (PI-3), SF4 suşu……..≥ 206.2 EU**
$gE^-$: delesyona uğramış glikoprotein E; $tk^-$: delesyona uğramış timidin kinaz
*Hücre kültürü enfektif doz 50%
**ELISA üniteleri

### Adjuvan:
Montanide IMS…….…….1.010 g

## KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Sığırların 10 haftalıktan itibaren aktif immünizasyonu:
BRSV ve PI-3: virüs saçılımı, hipertermi, klinik belirtilerin önlenmesi ve akciğer lezyonlarının azaltılması için.
BoHV-1: virüs saçılımı, hipertermi ve IBR (İnfeksiyöz Bovine Rhinotracheitis) kaynaklı klinik belirtilerin azaltılması için.
Bağışıklığın başlangıcı:Temel aşılama programından sonra 3 haftada.
Bağışıklık süresi: Temel aşılama programından sonra 6 ay. Tekrar (güçlendirici) aşılama programından sonra 1 yıl.

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Sığırlarda, 10 haftalık yaştan itibaren kas içi olarak uygulanır.
Temel aşılama programı: 3 hafta aralıkla iki doz (her biri 2 ml) uygulayınız.
Tekrar (güçlendirici doz) aşılama programı: temel aşılama programından sonra 6 ayı geçmeden 2 ml'lik bir tekrar dozu uygulanmalıdır.
Takip eden yeniden aşılama programı: 12 ay arayla 2 ml'lik bir tekrar dozu uygulanmalıdır.
Enjeksiyonluk emülsiyon elde etmek için, liyofilize kısmı çözücünün tamamını kullanarak sulandırınız ve emülsiyon haline gelene kadar çalkalayınız. Sulandırılan aşı, beyaz ila sarı renkli bir emülsiyondur.
Uygulamadan önce aşının +15 ila +25°C 'ye ulaşmasını bekleyiniz.
BVDV'ye karşı koruma ihtiyacının ortadan kalkması durumunda, DIVENCE PENTA ile aşılamanın ardından tekrar aşılamalar için DIVENCE RESPI kullanılabilir.
PI-3 ve BRSV'ye karşı koruma ihtiyacının ortadan kalkması durumunda, DIVENCE RESPI ile aşılamanın ardından tekrar aşılamalar için DIVENCE IBR MARKER LIVE kullanılabilir.

## ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Sadece sağlıklı hayvanları aşılayınız.
Uygulamada sadece steril enjektör kullanınız.
Sulandırma ve kullanım sırasında kontaminasyondan kaçınınız.
Bovine herpes virüsü tip 1'e karşı aşılanmış hayvanlar gE- marker delesyonu sayesinde ticari teşhis kitleri ile doğal enfekte hayvanlardan ayırt edilebilirler.

**Gebelik ve laktasyon döneminde kullanım**
Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilir.

## İSTENMEYEN ETKİLER

| | |
|---|---|
| Çok yaygın<br>(>1 hayvan / tedavi edilen 10 hayvanda): | Enjeksiyon alanında yangı[1], vücut ısısında artış[2] |
| Nadiren<br>(1 ila 10 hayvan / tedavi edilen 1.000 hayvanda): | Anaflaktik tip reaksiyon[3] |

[1]Enjeksiyon bölgesinde hafif ila orta şiddette geçici bir yangı (14 cm çapa kadar) görülebilir, bu yangının çapı 2 gün içinde hızla azalır ve tedavi olmaksızın 2 hafta içinde kaybolur.
[2]Aşılamadan sonra vücut ısısında artış (ortalama 1,7 ºC, bireysel olarak 2,4 ºC'ye kadar artış) görülebilir. Bu artış 3 gün içerisinde kendiliğinden geçer.
[3]Anafilaktik tip reaksiyonlarda, uygun semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

## İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bu aşının diğer veteriner tıbbi ürünler ile kullanıldığındaki güvenlik ve etkinliğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu aşının herhangi bir veteriner tıbbi üründen önce veya sonra kullanılmasının kararı vakaya göre verilmelidir. Veteriner tıbbi ürünü birlikte kullanım için tedarik edilen çözücüsü dışında herhangi bir veteriner tıbbi ürünle karıştırmayınız.

## DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz aşımında istenmeyen etkiler bölümünde belirtilenler dışında herhangi etki görülmemiştir.

## GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI
Sıfır gün.

## KONTRENDİKASYONLAR
Yoktur.

## GENEL UYARILAR
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

## UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER
Uygulayıcı için: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içerir. Kazara insana enjeksiyon şiddetli ağrı ve şişliğe neden olabilir, özellikle eklem veya parmağa enjekte edildi ise, nadiren de olsa acilen tıbbi yardım alınmaması durumunda etkilenen parmağın kaybı ile sonuçlanabilir. Çok az miktarda dahi olsa, bu veteriner tıbbi ürün ile enjeksiyon durumunda acil tıbbi yardım alınız ve ürün prospektüs veya etiketini doktorunuza gösterin. Tıbbi müdahaleden 12 saat sonra ağrı halen devam ediyorsa tekrar tıbbi destek alınız.

Doktorlar için: Bu veteriner tıbbi ürün mineral yağ içerir. Düşük miktarda bile enjekte edilse, şiddetli şişmeye ve bunun sonucunda iskemik nekroz ve uzvun kaybına neden olabilir. ACİL cerrahi müdahale gerekir, özellikle parmak pulpası veya tendona yayılım var ise enjeksiyon bölgesinin insizyon ve irrigasyonu gerekebilir.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.
Ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 30 ay
Ambalajlı çözücünün raf ömrü: 3 yıl
Talimatlara göre sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 2 saat

**KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR**

Kullanılmış veya arta kalan ürünler ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

**TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ**

Karton kutu içerisinde 1 adet 5 dozluk liyofilizat içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı tip I cam şişe ile 1 adet 10 ml çözücü içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı PET şişe.
Karton kutu içerisinde 1 adet 10 dozluk liyofilizat içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı tip I cam şişe ve 1 adet 20 ml çözücü içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı PET şişe.
Karton kutu içerisinde 1 adet 20 dozluk liyofilizat içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı tip I cam şişe ve 1 adet 40 ml çözücü içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı PET şişe.

Tüm ticari takdim şekilleri satışa sunulmayabilir.

**PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:** 10.11.2026

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:** 10.11.2026

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:** HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ. Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00

**ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:** LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) İSPANYA

**KUTU:**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.**
**DIVENCE RESPI**
Enjeksiyonluk Emülsiyon İçin Liyofilizat ve Çözücü
BRSV, IBR ve PI-3'e Karşı Kombine Aşı

## BİLEŞİMİ

Doz başına (2 ml):

**Aktif Madde:**

Canlı atenüe Bovine Respiratorik Sinsityal Virüs (BRSV), Lyme-56 suşu.. …….. $10^{5.2-6.5}$ $CCID_{50}$ *

Canlı $gE^-$ $tk^-$ çift gen delesyonlu Bovine Herpes Virüs Tip 1 (BoHV-1), CEDDEL suşu.. $10^{6.3} – 10^{7.6}$ $CCID_{50}$*

İnaktif Parainfluenza-3 Virüsü (PI-3), SF4 suşu. ..... ≥ 206.2 EU**

$gE^-$: delesyona uğramış glikoprotein E; $tk^-$: delesyona uğramış timidin kinaz

*Hücre kültürü enfektif doz 50%

**ELISA üniteleri

## KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda 10 haftalık yaştan itibaren kas içi olarak uygulanır.

## GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır gün.

## GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

## MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.
Ambalajlı veteriner tıbbi ürünün raf ömrü: 30 ay
Ambalajlı çözücünün raf ömrü: 3 yıl
Talimatlara göre sulandırıldıktan sonra raf ömrü: 2 saat

## KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

## TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutu içerisinde 1 adet 5 dozluk liyofilizat içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı tip I cam şişe ile 1 adet 10 ml çözücü içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı PET şişe.
Karton kutu içerisinde 1 adet 10 dozluk liyofilizat içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı tip I cam şişe ile 1 adet 20 ml çözücü içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı PET şişe.
Karton kutu içerisinde 1 adet 20 dozluk liyofilizat içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı tip I cam şişe ile 1 adet 40 ml çözücü içeren bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum kapaklı PET şişe.

Tüm ticari takdim şekilleri satışa sunulmayabilir.

**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:** 10.11.2026

**PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:** HIPRA VETERİNER MÜSTAHZARLARI TİC. LTD. ŞTİ. Y. Dudullu Mh. Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı Sit. B 2 Blok, No:44/29 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 526 60 00

**ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ:** LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) İSPANYA.

**SERİ NO:**
**SKT:**
**PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL): ….**

**ETİKET:**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.**

**DIVENCE RESPI**

Enjeksiyonluk Emülsiyon İçin Liyofilizat

**BİLEŞİMİ**

Doz başına (2 ml):

Canlı atenüe Bovine Respiratorik Sinsityal Virüs (BRSV), Lyme-56 suşu.. …….. $10^{5.2\text{-}6.5}$ $CCID_{50}$ *

Canlı $gE^-$ $tk^-$ çift gen delesyonlu Bovine Herpes Virüs Tip 1 (BoHV-1), CEDDEL suşu.. $10^{6.3} – 10^{7.6}$ $CCID_{50}$*

İnaktif Parainfluenza-3 Virüs (PI-3), SF4 suşu. ..... ≥ 206.2 $EU^{**}$

**KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU**

Kas içi yolla uygulanır.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.

**SERİ NO:**

**SKT:**

**ÇÖZÜCÜ ETİKET:**

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.**
**ÇÖZÜCÜ**
**DIVENCE RESPI**
Enjeksiyonluk Emülsiyon İçin Çözücü

**KULLANIM ŞEKLİ**
Liyofilize aşıyı sulandırmak için süspansiyon çözücü.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

2 ºC – 8 °C'de muhafaza ediniz. Dondurmayınız. Güneş ışığından koruyunuz.

**SERİ NO:**
**SKT:**